

2025 年河南省中职技能大赛

护理技能赛项题库

一、内科护理

单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1. 患者，女性，78 岁。因突发心前区疼痛，伴有胸闷憋气，来医院就诊。经检查医生诊断为广泛前壁心肌梗死。入院后有心律失常，以下预示室颤发生的心律失常是（ ）
 - A. 窦性心动过速
 - B. 窦性心律不齐
 - C. I 度房室传导阻滞
 - D. 偶发室早
 - E. 室性心动过速
2. 患者，女性，66 岁。慢性阻塞性肺气肿 10 年，慢性肺源性心脏病 5 年，本次因慢性呼吸衰竭入院，护士查房时发现患者兴奋、多汗、颜面发红、球结膜水肿。考虑该患者发生了（ ）
 - A. I 型呼吸衰竭
 - B. 二氧化碳潴留
 - C. 电解质紊乱
 - D. 呼吸兴奋药过量
 - E. 并发心力衰竭
3. 患者，男性，65 岁，慢性阻塞性肺疾病，患者询问氧气是否能再调大一点，护士为其解释，下列正确的是（ ）
 - A. 氧流量高低一样
 - B. 高流量氧抑制呼吸中枢，使通气不足加剧
 - C. 高流量氧会使痰液干燥
 - D. 高流量氧引起支气管痉挛
 - E. 高流量氧对肺实质有毒性作用
4. 患者，男性，71 岁，慢性阻塞性肺疾病急性发作期，长期卧床，咳嗽无力，为促进排痰，护士给予胸部叩击，叩击方法中，错误的是（ ）
 - A. 患者取侧卧位
 - B. 叩击顺序由外向内
 - C. 叩击顺序由下向上
 - D. 叩击者的手扇形张开
 - E. 叩击者手指向掌心微弯曲
5. 患者男，69 岁。以“肺心病”而入院治疗。护士对患者进行身体评估发现下列症状，其中提示其右心功能不全的是（ ）
 - A. 口唇紫绀
 - B. 呼吸急促
 - C. 表情痛苦
 - D. 肝颈静脉回流征阳性
 - E. 双肺底可闻及散在湿罗音
6. 患者，女性，20 岁，护士为其进行结核菌素试验，观察结核菌素试验结果的时间是在注射后（ ）
 - A. 20~30 分钟
 - B. 0.5~1 小时
 - C. 1~2 小时
 - D. 12~24 小时
 - E. 48~72 小时
7. 患者女，43 岁。患肺结核 2 年。现使用链霉素抗结核治疗，用药期间应注意监测（ ）
 - A. 肝功能
 - B. 肾功能
 - C. 心功能
 - D. 肺功能
 - E. 胃肠功能
8. 男性，50 岁，有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿病史多年，于阵咳后突然出现呼吸困难、左胸刺痛，逐渐加重。查体示：左肺叩诊鼓音，呼吸音消失。该患者最可能的诊断（ ）
 - A. 急性心肌梗死
 - B. 慢性支气管炎急性发作

- C. 自发性气胸
D. 支气管哮喘
E. 肋骨骨折
9. 患者女性，50岁，肺癌晚期。胸闷、气促伴 Horner 综合征。此综合征是由于肿瘤压迫了下列哪一结构所致（ ）
A. 膈神经
B. 副交感神经
C. 喉返神经
D. 臂丛交感神经
E. 颈交感神经
10. 患者，男，3岁，因“寒战，高热伴咳嗽，声音嘶哑”入院，查体：咽部明显充血，扁桃体肿大，诊断为急性上呼吸道感染（急性扁桃体炎）。正确的护理措施是（ ）
A. 进温度适宜的饮食或流质饮食，多饮水
B. 每6小时测量体温1次
C. 并发细菌感染时只给予对症治疗即可
D. 允许经常探视
E. 为增进食欲，可吃辛辣刺激的食物
11. 患者，男，70岁。慢性咳嗽、咳痰20余年。2周前因发热，痰多，气急加剧，嗜睡， PaCO_2 70mmHg， PaO_2 48mmHg，诊断为II型呼吸衰竭入院，经治疗好转，患者的出院健康教育，不正确的是（ ）
A. 家庭氧疗时给予4~6L/分氧气吸入
B. 心肺功能失代偿期应卧床休息
C. 睡眠不好时慎用镇静剂
D. 少吃多餐
E. 预防上呼吸道感染
12. 患者，男，65岁。诊断为慢性呼吸衰竭，经过积极治疗，病情好转。护士给其进行呼吸功能锻炼前，应该评估的是（ ）
A. 体温
B. 脉搏
C. 营养
D. 尿量
E. 活动能力
13. 患者，男，30岁。儿童时曾患麻疹肺炎，被诊断为支气管扩张已10余年。近3天来咳嗽、咳痰加重，痰呈脓性，首选护理措施是（ ）
A. 指导有效咳嗽
B. 导管吸痰
C. 给予营养饮食
D. 体位引流
E. 保持清洁口腔
14. 患者，男性，72岁，慢性阻塞性肺疾病10余年，护士给予出院宣教建议进行长期家庭氧疗，每日吸氧的时间不少于（ ）
A. 5小时
B. 8小时
C. 10小时
D. 12小时
E. 15小时
15. 患者，男，32岁，慢性支气管炎12年，近1周来咳嗽、咳痰加重，痰呈脓性，每日约500ml，伴低热。目前最主要的护理问题是（ ）
A. 体温过高
B. 清理呼吸道无效
C. 气体交换受损
D. 潜在并发症：咯血
E. 潜在并发症：窒息
16. 患者，男，52岁，支气管扩张10余年，近2周来咳嗽、咳痰加重，痰呈血性，每日约200ml，若患者发生大咯血窒息应采取的体位是（ ）
A. 平卧位
B. 端坐位
C. 半卧位
D. 头低脚高俯卧位
E. 患侧卧位
17. 患者，男性，58岁，淋雨后寒战高热，咳嗽咳痰，胸闷，肺部闻及湿啰音，以肺炎收入院治疗。对该患者的护理措施内容错误的是（ ）
A. 鼓励患者多饮水

- B. 高热时给予阿司匹林迅速降温
 C. 注意观察生命体征
 D. 卧床休息，做好口腔护理
 E. 提供足够高热量、高蛋白、高维生素的流质或半流质
18. 患者，男，70岁。慢性咳嗽咳痰20余年，活动后气促5年。护士为患者示范缩唇腹式呼吸后，要求患者独立练习，当护士发现患者的操作中出现下列哪种情况，说明护士还需再次示范（ ）
 A. 放松体位，半卧位，情绪稳定
 B. 鼻吸口呼
 C. 每分钟10次左右
 D. 吸气与呼气比为2:1~3:1
 E. 每次训练时间为10~15分钟
19. 患者，男，35岁，春游后，畏寒高热，咳嗽咳痰，咳大量黄色脓痰，诊断肺炎，其最有可能提示感染的（ ）
 A. 肺炎链球菌
 B. 金黄色葡萄球菌
 C. 冠状病毒
 D. 白色念珠菌
 E. 肺炎支原体
20. 患者，男，22岁，患肺炎球菌肺炎，入院时一直无家属探视，近两天来咳嗽、胸痛加重，患者情绪激动，入睡困难，坐立不安，对待医生、护士态度不耐烦，患者目前最主要的心理问题是（ ）
 A. 紧张
 B. 恐惧
 C. 依赖
 D. 焦虑
 E. 悲观
21. 患者，男性，70岁，患肺心病5年，近10天来出现咳嗽、咳痰，今晨起呼吸困难加重，神志恍惚，烦躁不安。考虑该患者并发了（ ）
 A. 肺性脑病
 B. 心力衰竭
 C. 呼吸衰竭
 D. 肺水肿
 E. 脑出血
22. 患者，男，75岁，慢性阻塞性肺疾病急性发作期。痰多黏稠，翻身时突然出现面色发绀，烦躁不安，护士首先应采取的措施是（ ）
 A. 给患者吸氧
 B. 给患者吸痰
 C. 协助患者取坐位
 D. 指导患者有效咳嗽
 E. 湿化气道
23. 患者，男，68岁，慢性阻塞性肺疾病稳定期患者。护士指导其加强腹式呼吸的主要原因是（ ）
 A. 有利于痰液排出
 B. 增加肺泡张力
 C. 使呼吸幅度扩大，增加肺泡通气量
 D. 借助腹肌改善呼吸功能
 E. 间接增加肋间肌活动
24. 患者，李某，慢性呼吸衰竭，痰多，在使用哪种药物后，可能因为痰液黏稠度增加而使排痰困难加重（ ）
 A. 泼尼松
 B. 沙丁胺醇
 C. 呋塞米
 D. 氨茶碱
 E. 盐酸氨溴索
25. 患者，男，82岁，支气管扩张，咳嗽、咳痰加重，痰呈血性，每日约200ml，入院后，护士予患者进行口腔护理是为了（ ）
 A. 去除口臭
 B. 促进唾液分泌
 C. 减少感染机会
 D. 减少咳血
 E. 减少痰量
26. 患者，男性，77岁，因慢性阻塞性肺气肿入院。患者气短、喘憋、不能平卧，护士在患者哮喘时给予最佳体位是（ ）
 A. 平卧位
 B. 端坐位

- C. 半卧位
D. 俯卧位
E. 头高足低位
27. 患儿，女，3岁，因上呼吸道感染入院，目前出现高热、声音嘶哑，犬吠样咳嗽，吸气性喉鸣，闻及哮鸣音，为迅速缓解症状，首选的处理方法是（ ）
A. 地塞米松雾化吸入
B. 静滴抗生素
C. 静滴强的松
D. 口服化痰药
E. 以呼吸机行机械通气
28. 患者，男，10岁，因低热、咽痛、咳嗽逐渐加剧，呈阵发性刺激呛咳1周，诊断为支原体肺炎，治疗首选的抗生素是（ ）
A. 大环内酯类
B. β -内酰胺类
C. 氨基糖苷类
D. 喹诺酮类
E. 磺胺类
29. 患者，男性，77岁，因慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭入院。查动脉血氧分压 32mmHg，二氧化碳分压 79mmHg，患者呼吸中枢兴奋性下降应使用的药物是（ ）
A. 沙丁胺醇
B. 酚妥拉明
C. 头孢曲松
D. 可拉明
E. 卡托普利
30. 患者，男75岁，患慢性肺源性心脏病入院治疗两周，病情好转，出院前告知有关肺心病的预防不包括（ ）
A. 提倡戒烟
B. 增强免疫力
C. 减少有害物质的吸入
D. 预防感染
E. 多睡少动
31. 患者，男65岁，慢性肺源性心脏病病史10年，两周前出现双下肢水肿，自行每日三次服用氢氯噻嗪，近日来住院，全身乏力，心跳不规则，最可能的原因是该药物导致了（ ）
A. 心肌缺血
B. 低血糖
C. 低血钾
D. 周围神经炎
E. 高血钾
32. 患者，男性，18岁，咳嗽、咳痰伴喘息1天，在肺部可闻及广泛哮鸣音，诊断为支气管哮喘入院，经沙丁胺醇等药物后，患者症状无明显缓解，呈端坐呼吸、大汗淋漓，讲话仅可说单字，此时可判断患者病情为（ ）
A. 混合性哮喘
B. 中度哮喘
C. 重度哮喘
D. 合并左心衰
E. 合并右心衰
33. 患者，女，50岁。患有支气管哮喘史20余年。护士评估时发现一旦症状消失患者便会停止服药，发作后又开始服用药物。针对该患者，护士应当首先告知的是（ ）
A. 需认识到要长期规范治疗哮喘，不得自行停药
B. 合理锻炼，减少用药
C. 应每天定时口服支气管扩张剂
D. 避免接触粉尘等诱发因素
E. 病情发生变化的时候及时就医
34. 男性，27岁，于篮球比赛后突然阵咳并呼吸困难、左胸刺痛，逐渐加重。查体示：左肺叩诊鼓音，呼吸音消失。行胸腔闭式引流管治疗，以下护理不正确的是（ ）
A. 严密观察引流管内水柱是否波动
B. 观察和记录引流液的量、色和性状
C. 引流瓶液平面低于引流管胸腔出口 30cm
D. 更换伤口敷料每日一次
E. 每 2h 鼓励患者做深呼吸
35. 患者，男性，23岁，近日来出现不明原因面部眼睑水肿，晨起明显，伴有蛋白尿（++++），检查：尿素氮显著升高，以慢性肾小球肾炎入院，以下哪一项是慢性肾小球疾病的始发机制（ ）
A. 感染机制
B. 非炎性机制

- C. 免疫机制
D. 炎性机制
E. 遗传机制
36. 患者，女性，患慢性肾小球肾炎两年余，近一月出现双下肢水肿、尿少，查尿蛋白（+++）。对该患者的护理不妥的是（ ）
- A. 定时测量血压并注意观察有无发热
B. 给予优质低蛋白，低磷、低钠饮食
C. 减少人员探视，防止交叉感染
D. 记录出、入水量
E. 立即给予抗生素滴注
37. 患者，男性，30岁，患急性肾小球肾炎。尿检查出现：蛋白尿、血尿，此类患者蛋白尿一般是指每日尿蛋白量持续超过（ ）
- A. 150mg
B. 450mg
C. 750mg
D. 1000mg
E. 3500mg
38. 男，34岁。血压持续增高1年以上，中度浮肿，尿蛋白常“++~+++”，管型“+”，最大可能诊断为（ ）
- A. 急性肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 慢性肾盂肾炎
D. 输尿管结石
E. 肾结核
39. 患者，女性，33岁，以慢性肾小球肾炎收入院，入院后医生建议给予患者优质低蛋白、低磷饮食治疗，此治疗饮食的目的是（ ）
- A. 减轻肾性水肿
B. 降低肾性高血压
C. 延缓肾小球硬化和肾功能减退
D. 预防低钾血症
E. 控制高磷血症
40. 患者，女性，26岁，确诊肾病综合征1年，近日出现右下肢水肿明显，右腿较左腿明显肿胀，血清胆固醇3.84mmol/L，该患者可能出现了（ ）
- A. 右下肢感染
B. 右下肢静脉血栓
C. 右下肢水肿加重
D. 药物的副作用
E. 治疗无效
41. 患儿男，5岁。因“肾病综合征”以糖皮质激素治疗5个月，出现浮肿减轻、食欲增加、双下肢疼痛，最应关注的药物副作用是（ ）
- A. 高血压
B. 骨质疏松
C. 白细胞减少
D. 消化道溃疡
E. 库欣综合征
42. 患者，女性，分娩中大出血，血压下降，并发急性肾功能衰竭，急性肾衰竭少尿期患者最常见的水电解质紊乱是（ ）
- A. 低血钾
B. 高血钾
C. 低血钠
D. 高血钠
E. 低血镁
43. 患者，男性，50岁，半个月前出现明显的全身水肿，晨起面部水肿最突出，以肾病综合征入院治疗，护士给患者做健康指导，不妥的是（ ）
- A. 应与优质蛋白，低脂，低盐和高纤维饮食
B. 绝对卧床休息
C. 保持肢体适度活动
D. 防止受凉及感染
E. 高血压患者要动作缓慢，防止直立性低血压
44. 患者，女性，34岁，一个月前出现水肿明显，伴有少量胸水，入院治疗，应用利尿剂后未见好转，一周来，浮肿加重，体温38.7℃，呼吸24次/分，请问导致原发性肾病综合征疗效不佳的最主要的原因是（ ）
- A. 感染
B. 肾功能不全
C. 肾静脉血栓形成

- D. 动脉粥样硬化
E. 下肢静脉血栓形成
45. 患者，女，46岁。急性肾衰竭，入院第一周尿量350ml/d。应密切观察的电解质是（ ）
A. 钙
B. 钠
C. 钾
D. 磷
E. 氯
46. 患者，男性，14岁，急进性肾小球肾炎病史多年，入院后患者出现尿量减少，血BUN升高，肾功能衰竭表现，请问护理肾衰竭少尿期患者，下列叙述正确的是（ ）
A. 大量补液
B. 摄入含钾食物
C. 禁用库存血
D. 坚持每日锻炼
E. 加强蛋白质摄入
47. 患者，男性，34岁。血压持续增高1年以上，中度水肿，尿蛋白常(++~+++)，管型(+)，临床诊断为慢性肾炎，请问应给予慢性肾炎患者下列哪一种饮食（ ）
A. 高维生素、低蛋白质、低磷、低盐
B. 高维生素、高蛋白质、低磷、低盐
C. 高维生素、高蛋白质、高磷、低盐
D. 高维生素、低蛋白质、高磷、低盐
E. 低维生素、低蛋白质、低磷、低盐
48. 患者，男性，16岁，两周前突发化脓性扁桃体炎，近两天出现血尿，晨起颜面部明显水肿，检查：内生肌酐清除率明显下降，以急性肾炎收入院，请问与急性肾炎发病有关的细菌常见的是（ ）
A. 金黄色葡萄球菌
B. 大肠杆菌
C. 链球菌
D. 肺炎双球菌
E. 流感嗜血杆菌
49. 患者男性，18岁，慢性肾小球肾炎患者，农民，文盲，入院治疗，护理慢性肾小球肾炎患者应注意的内容不包括（ ）
A. 有无尿毒症早期征象，如头痛、嗜睡等
B. 准确记录尿量 C. 注意观察血压的变化
D. 注意有无电解质紊乱和发生高、低血钾等
E. 补充大量蛋白质，供给足够热量
50. 男孩，4岁。因全身水肿明显到医院就诊，经医生检查诊断为原发性肾病综合征，应用药物治疗。治疗小儿原发性肾病综合征主要药物是（ ）
A. 磺胺类
B. 呋喃类
C. 氨苄青霉素
D. 环磷酰胺
E. 糖皮质激素
51. 男孩，6岁。2年前患原发性肾病综合征经药物治疗病情稳定，症状好转。近半年内复发2次，医生建议应用细胞毒药物治疗。肾病综合征最常用的细胞毒药物是（ ）
A. 甲氨蝶呤
B. 苯丁酸氮芥
C. 6-巯基嘌呤
D. 三尖杉酯碱
E. 环磷酰胺
52. 患者女，44岁，清洁工，患尿毒症入院，入院后家人一直陪伴身边，当得知需要长期透析治疗后，患者经常独自流泪，默默发呆，不愿与人交流，最可能的原因是（ ）
A. 尿毒症引起的精神症状
B. 害怕透析带来后遗症
C. 无力承受高额费用
D. 家属感情支持不足
E. 担心疾病影响工作
53. 患者男性，56岁，诊断为急性肾功能衰竭，该患者少尿期的饮食护理，错误的是（ ）
A. 避免含钾丰富的食物
B. 高糖
C. 高维生素
D. 适宜的脂肪
E. 高蛋白
54. 患者女性，22岁，患急性尿路梗阻治疗效果不佳，近一周出现双下肢浮肿、尿少，查尿蛋白++。检查：

内生肌酐清除率 31ml/min，以急性肾衰竭入院治疗。请问治疗急性肾衰竭患者的基础补液量为（ ）

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

55. 患者，男性，炎热天气在室外作业，大量出汗未能及时补充液体，出现急性少尿，尿成洗肉水色，血压升高，以急性肾衰竭入院治疗，请问急性肾衰患者的饮食护理中错误的是（ ）

- A. 高蛋白
- B. 高热量
- C. 充足维生素
- D. 忌含钾丰富的食物
- E. 控制入水量

56. 患者，男性，39岁，因车祸造成出血性休克，经手术止血并补充血容量纠正休克，伤后24小时一直无尿，使用速尿无效。以后补液方案应是（ ）

- A. 随意口服液体
- B. 每天经静脉途径给予2000~2500ml液体
- C. 2天内不补充液体
- D. 不补液，仅口服山梨醇导泻
- E. 按“显性失水+不显性失水-内生水”公式补液

57. 患者，女性，30岁。患急性肾盂肾炎，服用磺胺类药物时，加服碳酸氢钠的作用是（ ）

- A. 抗炎
- B. 增加尿量
- C. 碱化尿液
- D. 保护尿路黏膜
- E. 增加肾血流量

58. 患者，女性，60岁，因尿频，尿急，尿痛，高热收入院治疗。应给予以下护理，但除外（ ）

- A. 鼓励尽量多饮水
- B. 可下腹部热敷
- C. 增加会阴清洗次数
- D. 按医嘱给予抗菌素
- E. 保持每日尿量500ml以上

59. 患者，女，68岁，肝硬化腹水6年，近2周出现发热，少尿，氮质血症等，口服抗生素应选（ ）

- A. 新霉素
- B. 卡那霉素
- C. 氨苄西林
- D. 庆大霉素
- E. 甲硝唑

60. 患者，男，46岁。慢性肾炎。近2天尿少，昼夜尿量为350~400ml；测血压190/110mmHg，血钾6.3mmol/L。根据病情护士给患者的饮食建议是（ ）

- A. 吃榨菜
- B. 喝鸡蛋汤
- C. 吃橘子
- D. 吃香蕉
- E. 喝骨头汤

61. 患者，女，24岁，咳嗽、高烧1周后出现尿量减少，300ml~400ml/天，血清钾6.5mmol/L，血肌酐762umol/L，如该患者血钾持续>6.5mmol/L，可诱发（ ）

- A. 急性心衰
- B. 心律失常
- C. 急性脑水肿
- D. 急性肺水肿
- E. 代谢性酸中毒

62. 患儿男，8岁，以急性肾小球肾炎收入院。入院后，患儿眼睑水肿，尿为洗肉水样，疲乏无力。此关于急性肾小球肾炎的叙述正确的是（ ）

- A. 女性多见
- B. 大量蛋白尿多见
- C. 镜下血尿少见
- D. 血压明显上升
- E. 常发生于感染后2月

63. 患者，女，24岁。持续咳嗽、高烧2周后出现尿量减少，300ml~400ml/天，血清钾6.5mmol/L，血肌酐762umol/L，此时患者可选择的抗生素应是（ ）

- A. 磺胺类药物
- B. 卡那霉素

- C. 链霉素
D. 青霉素
E. 阿米卡星
64. 患者，男，55岁。慢性肾小球肾炎10年，1周前受凉后出现食欲减退、恶心、呕吐，晨起最明显，夜尿增多，入院后须行内生肌酐清除率检查，以下告知项目不妥的是（ ）
- A. 禁饮咖啡、茶等饮料
B. 避免剧烈运动
C. 连续3天优质蛋白鱼肉饮食
D. 收集24小时尿液
E. 连续3天低蛋白饮食
65. 某肾病综合征患者入院治疗，查体双下肢水肿，实验室检查尿蛋白4.5g/d，血浆白蛋白20g/L，该患者水肿的主要原因是（ ）
- A. 醛固酮增多
B. 球-管失衡
C. 饮水过多
D. 肾小球过滤下降
E. 血浆胶体渗透压下降
66. 某患者既往曾有肾小球肾炎时，因病情稳定上班工作，近日在单位体检时发现血压180/120mmHg，来医院复查，证实为慢性肾小球肾炎急性发作，为迅速而有效的缓解症状，应考虑下列哪项措施（ ）
- A. 绝对卧床休息
B. 低盐饮食
C. 利尿降压
D. 激素疗法
E. 中医疗法
67. 患者，男，58岁，有高血压病史，某日，头痛头晕，左侧肢体活动障碍，诊断为脑出血入院。第3天患者剧烈头痛、呕吐，反应迟钝、脉搏细弱、呼吸减慢，该患者最可能出现了（ ）
- A. 颅内压增高
B. 颅内压过低
C. 低血糖
D. 颅内感染
E. 癫痫
68. 患者，女，60岁，急诊以“脑栓塞”收入院。入院后护士判断该患者可经口进食，但吞咽困难。为防止因进食所致的窒息，护士应采取的措施，但除外（ ）
- A. 营造安静、舒适的进餐环境
B. 进食前应注意休息，避免疲劳
C. 嘱患者使用吸管喝汤
D. 食物应从流食逐渐过渡到普食
E. 进行空吞咽运动的训练
69. 早产儿，32周，出现神经系统症状，诊断为新生儿颅内出血，护理措施正确的是（ ）
- A. 保持头低脚高位
B. 惊厥时晃动患儿
C. 每小时测一次体温
D. 每2小时喂奶一次
E. 避免搬动患儿
70. 患者，男性，诊断为急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，患者的脑脊液改变为（ ）
- A. 细胞数降低，蛋白质降低
B. 氯化物降低
C. 细胞数正常，蛋白质增高
D. 葡萄糖降低
E. 淋巴细胞增多
71. 患者，女，38岁。朋友聚会后，突然头痛、呕吐3小时入院，血压100/70mmHg，头颅CT提示蛛网膜下腔出血，护士告知患者要保持大便通畅，勿用力排便，其主要目的是（ ）
- A. 防血压升高
B. 缓解头痛
C. 防止再出血
D. 预防心梗
E. 预防痔疮
72. 患儿，男，2岁，发热一天，体温38.5度，伴有轻咳来诊，既往有癫痫病史，门诊就诊过程中突然发生惊厥，即刻给予输氧，镇静，此时首选药物是（ ）
- A. 苯巴比妥
B. 地西洋
C. 水合氯醛
D. 氯丙嗪

- E. 肾上腺皮质激素
73. 患者，男，20岁。发作性意识丧失2年，每次发作均伴有全身不自主抽搐，尿失禁，口吐白沫，持续约2分钟。意识逐渐恢复后，对抽搐全无记忆。发作时对该患者的护理措施中不妥的是（ ）
- 迅速扶患者就地躺下
 - 保持患者侧卧位
 - 放松患者领扣、裤带
 - 用纱布包裹的压舌板塞入患者上下臼齿间
 - 发作完全控制后尽快停药，以减轻药物副作用
74. 患者，女，60岁。急诊以“脑梗塞”收入院。护士采取的措施不妥的是（ ）
- 不能吞咽时给予鼻饲高蛋白饮食
 - 头部禁止放置冰袋
 - 严密观察患者的意识状态
 - 患者取头高足低位
 - 颅内压增高时给予甘露醇
75. 患者，女性，56岁。帕金森病。患者在进行康复训练时，护士要求其关节活动要达到最大范围，其主要目的是（ ）
- 减轻不自主震颤
 - 防止肌肉萎缩
 - 促进血液循环
 - 提高平衡能力
 - 防止关节强直
76. 患者，男性，60岁，有高血压病史30年，在家做家务劳动时突发头晕，随即倒地，急送医院。患者呈昏迷状态，颈软而无抵抗，左侧肢体偏瘫；头颅CT示右侧基底节区高密度阴影。最可能的诊断是（ ）
- 蛛网膜下腔出血
 - 脑血栓形成
 - 脑栓塞
 - 脑出血
 - 短暂性脑缺血发作
77. 患者男，53岁。饮酒时发生言语不清、呕吐，随即昏迷，右侧肢体瘫痪；血压230/120mmHg，诊断为“脑出血”。为防止出血加重，应首先采取的措施是（ ）
- 控制血压
 - 保护性约束
 - 降低颅内压
 - 止血处理
 - 肢体制动
78. 患者，女，68岁。“急性心肌梗死”入院，护士在CCU抢救患者时，执行医生的口头医嘱，正确的做法是（ ）
- 口头医嘱在抢救完毕后12小时内请医生补写医嘱和处方
 - 无需复述，立即执行
 - 向医生复述一遍，双方确认无误后方可执行
 - 口头医嘱无需医生补写医嘱和处方
 - 边执行，边向医生复述
79. 患者，女，66岁。因“急性心肌梗死”入院，行经皮冠状动脉介入治疗术后。为预防穿刺动脉栓塞，护士主要观察的项目是（ ）
- 血压
 - 脉搏
 - 体温
 - 呼吸
 - 足背动脉搏动
80. 患者，女性，48岁。感染性心内膜炎住院期间，突发胸痛、气促，随后出现口唇青紫、咯血，患者可能发生了（ ）
- 外周动脉栓塞
 - 肾栓塞
 - 肺栓塞
 - 脑栓塞
 - 肠系膜动脉栓塞
81. 患者，女，49岁。上坡或平地快走时常有气促两月余，门诊就医，X线检查结果为：心影呈梨形。该患者可能的医疗诊断是（ ）
- 主动脉瓣狭窄
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 肥厚型心肌病

82. 患者，女，61岁。夏天中午在送孙子去暑期学习班的路上，突然出现头痛、头晕、恶心，继而出现口渴、胸闷、脉搏细速、血压下降，后晕倒在地。该患者可能发生了（ ）
- 缺血性休克
 - 急性心肌梗死
 - 脑血管意外
 - 中暑
 - 低血糖休克
83. 患者，女，48岁。自觉头痛、头晕，伴颈部僵硬2周，门诊就诊，测呼吸20次/分，心率89次/分，血压170/105mmHg。护士向患者解释高血压的高危因素，不正确的是（ ）
- 遗传因素
 - 肥胖
 - 吸烟
 - 长期运动
 - 精神紧张
84. 患者，女性，58岁。诊断为急性心肌梗死，经治疗后疼痛缓解。现突然出现烦躁不安、大汗，皮肤湿冷，测血压80/50mmHg，心率115次/分，尿量20ml/h。应考虑患者出现了
- 急性心力衰竭
 - 心源性休克
 - 心肌梗死
 - 心律失常
 - 心脏破裂
85. 患者，女性，68岁。因慢性心力衰竭收入院，遵医嘱服用地高辛每日0.125mg，某日患者将白墙看成黄墙，提示患者出现（ ）
- 青光眼
 - 视网膜病变
 - 血钾过低
 - 血钠过高
 - 洋地黄药物中毒
86. 患者，男性，62岁，持续性胸前区疼痛2小时入院，心电图检查示II、III、aVF导联ST段抬高，考虑急性心肌梗死，此时抽血化验，指标特异性最高的是（ ）
- 血白细胞
 - 血红细胞
 - 红细胞压积
 - 血肌酸激酶同工酶
 - 血沉
87. 患者，女性，77岁。住院心电图监测时发生室性心动过速，心率172次/分，血压120/80mmHg，意识清楚，双肺呼吸音清晰，无湿啰音。首选的治疗药物是（ ）
- 阿托品
 - 地高辛
 - 利多卡因
 - 硝酸甘油
 - 呋塞米
88. 患者，男性，67岁。既往有高血压病史25年，2个月前出现疲乏，近1周出现劳力性呼吸困难，经休息后缓解，患者最可能出现（ ）
- 慢性左心衰竭
 - 慢性右心衰竭
 - 全心衰竭
 - 急性肺水肿
 - 高血压危象
89. 患者，女性，69岁。风心病二尖瓣狭窄26年，伴心房颤动5年，无明显原因突然出现意识障碍，最可能的原因是（ ）
- 脑出血
 - 发生室颤
 - 心排出量减少，脑供血不足
 - 心房血栓脱落，脑栓塞
 - 高凝状态，脑血栓形成
90. 患者，男性，69岁。治疗过程中患者突然意识丧失，血压测不清，颈动脉搏动消失。住院心电图监测为心室颤动，此时应采用最有效的治疗是（ ）
- 心脏按压
 - 人工呼吸
 - 心腔内注射肾上腺素
 - 静注利多卡因
 - 非同步直流电复律

91. 患者，男性，68岁。胸痛2小时，诊断为“急性心肌梗死”，给予急诊溶栓治疗，下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是（ ）
- 胸痛2小时内基本消失
 - 出现再灌注性心律失常
 - 心电图抬高ST段回降 $>50\%$
 - 血清心肌酶峰值提前
 - 冠脉造影示闭塞动脉再通
92. 患者，女性，32岁。风心病，心功能III级。长期服用地高辛，0.25mg，1次/天，自觉情况尚可，复诊时查心电图示，心率80次/分，PR间期0.18秒。对此患者的处理应为（ ）
- 停用地高辛，观察
 - 改用利多卡因
 - 加大地高辛用量
 - 加服利尿剂
 - 继续用原剂量维持
93. 某患者患高血压病3年，入院后给予降压药等治疗，在用药护理中指导患者改变体位时动作宜缓慢，其目的为（ ）
- 避免发生高血压脑病
 - 避免发生高血压危象
 - 避免发生急进性高血压
 - 避免发生体位性低血压
 - 避免血压增高
94. 患者，男性，33岁。阵发性心慌4年，每次发作突然，持续数分钟至1小时不等。本次发作时心率190次/分，律齐，QRS波形态正常，P波不易辨认。考虑该患者的医疗诊断为（ ）
- 窦性心动过速
 - 室上性心动过速
 - 室性心动过速
 - 心房颤动
 - 心房扑动
95. 患者，男性，69岁。突发持续性胸骨后疼痛6小时，含服硝酸甘油无效。心电图示“急性前壁心肌梗死”，室性期前收缩8次/分，呈二联律。除立即止痛外应迅速给予（ ）
- 普罗帕酮静脉给药
 - 利多卡因静脉给药
 - 普鲁卡因胺口服
 - 阿托品口服
 - 维拉帕米口服
96. 患者，男性，38岁。近5个月来血压升高较快，伴心悸、头痛、烦躁等，出现耳鸣、眼花3天，查体：血压185/115mmHg。该患者的医疗诊断可能是（ ）
- 高血压I级
 - 高血压II级
 - 高血压III级
 - 高血压危象
 - 高血压脑病
97. 患者，男性，62岁，因做家务时突发心前区疼痛，伴胸闷、气短来我院就诊，诊断为“急性心肌梗死”收入院治疗。进行心电监护，以防突发心律失常。急性心肌梗死患者预示室颤发生的心律失常是（ ）
- 室上性心动过速
 - 室性心动过速
 - 心房颤动
 - 窦性心动过缓
 - 一度房室传导阻滞
98. 患者，男性，46岁。体检发现心尖部舒张期隆隆样杂音，胸片提示左房、右室增大，诊断为风心病二尖瓣狭窄。该患者处于（ ）
- 左房代偿期
 - 左房失代偿期
 - 左室代偿期
 - 肺动脉高压期
 - 右心受累期
99. 患者，女性，62岁。有高血压病史12年。最近骑车上班时感胸闷、乏力、气急，休息后缓解。该患者的心功能为（ ）
- 一级
 - 二级
 - 三级
 - 四级
 - 五级

100. 患者，女性，80岁。风湿性心脏病、心力衰竭，用地高辛、氢氯噻嗪治疗过程中出现气促加重，心电图示：室性期前收缩二联律。下列治疗错误的是（ ）
- 停用地高辛
 - 补钾
 - 停用氢氯噻嗪
 - 加用呋塞米
 - 加用利多卡因
101. 患者女，32岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄10年。近2个月常于夜间憋醒，呼吸深快，伴有哮鸣音，端坐后可稍解，对夜间易发生喘憋的机制，正确叙述是（ ）
- 膈肌下降
 - 平卧回心血量增加
 - 交感神经张力增加
 - 小支气管舒张
 - 全身小动脉痉挛
102. 患者，男性，62岁。因突发心前区疼痛，疼痛难忍，并伴有胸闷憋气，来院就诊，患者既往有糖尿病史11年、胃溃疡18年。经检查医生诊断为“急性前间壁心肌梗死”，特征性心电图变化出现在（ ）
- $V_1 \sim V_5$ 导联
 - $V_1 \sim V_3$ 导联
 - $V_3 \sim V_5$ 导联
 - V_6 、I、aVL导联
 - $V_1 \sim V_6$ 及I、aVL导联
103. 患者，女性，53岁。因突发急性心肌梗死急诊入院，接受尿激酶溶栓治疗，一天后患者出现缓慢性心律失常，可用的药物是（ ）
- 硝酸异山梨酯
 - 硝酸甘油
 - 呋塞米
 - 美托洛尔
 - 阿托品
104. 患者女，25岁。诉心慌不适来诊，医嘱行心电图检查。护士在给该患者做心电图检查时单极胸导联 V_2 电极应放在（ ）
- 胸骨右缘第四肋间
 - 胸骨左缘第四肋间
 - 左腋前线第四肋间
 - 左腋中线第五肋间
 - 左锁骨中线与第五肋间相交点
105. 患者，女性，35岁，患有风湿热11年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为“慢性风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄”，二尖瓣狭窄最早出现的症状是（ ）
- 腹胀
 - 下肢水肿
 - 劳力性呼吸困难
 - 肝区疼痛
 - 咯血
106. 患者，女性，38岁。因患慢性风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄收入院。患者近来症状严重，护士严密观察心律变化，及时发现心律失常的发生。风心病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是（ ）
- 室性期前收缩
 - 窦性心动过速
 - 窦性心动过缓
 - 心房颤动
 - 房室传导阻滞
107. 患者，女性，31岁，诊断为风湿热8年，医生考虑此患者病变已侵犯到心脏，风湿性心脏瓣膜病最常见的并发症是（ ）
- 充血性心力衰竭
 - 室性心律失常
 - 下肢静脉血栓
 - 贫血
 - 心源性休克
108. 患者，男性，55岁。主诉自感心悸、胸闷不适，既往有冠心病。住院后心电监护示阵发性室性心动过速，应首选的处理是（ ）
- 给予镇静剂
 - 立即静脉注射利多卡因
 - 开放静脉通路
 - 安慰患者并予吸氧
 - 电除颤

109. 患者，男性，18岁，学生。自诉心慌，胸闷不适。ECG示：提前出现形态异常的QRS波群，时限0.12s，T波与QRS波主波方向相反，其前无相关P波。该患者的诊断为（ ）
- A. 房性期前收缩
 - B. 室性期前收缩
 - C. 心房颤动
 - D. 交界性期前收缩
 - E. 预激综合征
110. 患者，男性，25岁。因心悸来医院检查，下列可明确诊断心律失常的检查是（ ）
- A. 心音图
 - B. 心电图
 - C. 超声心动图
 - D. 放射性核素检查
 - E. 心脏X线
111. 患者男，64岁。高血压10年，今晨服用降压药物后出现头晕、恶心、乏力，查体：血压100/70mmHg，脉搏102次/分。目前最主要的处理措施是（ ）
- A. 吸氧
 - B. 吸氧
 - C. 心电监护
 - D. 加服降压药物
 - E. 安置平卧头低足高位
112. 患者，女性，58岁，主诉胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难、尿少一月余，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。考虑患者出现了心力衰竭，诱发心力衰竭最常见的因素是（ ）
- A. 劳累过度
 - B. 呼吸道感染
 - C. 摄入高钠食物
 - D. 严重脱水
 - E. 各种缓慢型心律失常
113. 患者，女性，50岁。既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄，近半年来出现胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难、尿少。考虑患者出现了心力衰竭，在饮食护理上要求低盐饮食，其原因是（ ）
- A. 减轻肾脏负担
 - B. 避免心脏受损
 - C. 减轻脑水肿
 - D. 减少液体潴留
 - E. 提高心肌收缩力
114. 患者，女性，75岁。有风湿性心脏病二尖瓣狭窄，反复住院治疗，此次住院治疗效果不佳，病情不稳定而死亡。风湿性心瓣膜病最主要的致死原因是（ ）
- A. 急性肺水肿
 - B. 心律失常
 - C. 亚急性感染性心内膜炎
 - D. 肺栓塞
 - E. 充血性心力衰竭
115. 患者，男性，65岁。间断性胸闷5天，昨天夜间突然呼吸困难，被迫坐起，频繁咳嗽，严重气急，咳大量粉红色泡沫痰，既往患冠心病10年。考虑该患者发生了急性肺水肿，给氧方式应采用（ ）
- A. 高流量，10%~20%乙醇湿化
 - B. 低流量，10%~20%乙醇湿化
 - C. 高流量，20%~30%乙醇湿化
 - D. 低流量，30%~50%乙醇湿化
 - E. 持续低流量给氧
116. 患者，女性，50岁。有风湿性心脏病二尖瓣狭窄，与此病发病有密切关系的细菌是（ ）
- A. 乙型溶血性链球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 幽门螺旋杆菌
 - D. 革兰阴性杆菌
117. 患者，男性，50岁。因胸痛就诊，诊断为心绞痛。发生心绞痛的主要病因是（ ）
- A. 主动脉瓣狭窄
 - B. 二尖瓣狭窄
 - C. 主动脉瓣关闭不全
 - D. 二尖瓣关闭不全
 - E. 冠脉管腔狭窄和痉挛
118. 患者，女性，50岁。因咳嗽、咳痰、尿少、呼吸困难加重，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心力衰竭。医生考虑患者有急性左心衰，其咳嗽、咳痰的性质是（ ）
- A. 白色浆液样痰
 - B. 白色粘液性痰

- C. 频频咳嗽，咳粉红色泡沫样痰
 D. 偶尔咳嗽，咳粉红色泡沫样痰
 E. 痰中带血丝
119. 患者，男性，62岁。因胸痛就诊，既往有心绞痛十年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛症状的主要区别是（ ）
 A. 引起诱因不同
 B. 疼痛部位不同
 C. 疼痛表现不同
 D. 疼痛性质不同
 E. 疼痛持续时间不同
120. 患者，女性，50岁，慢性心力衰竭，进行输液治疗时输液速度一般宜控制在（ ）
 A. 10~20滴/分钟
 B. 20~30滴/分钟
 C. 30~40滴/分钟
 D. 40~50滴/分钟
 E. 50~60滴/分钟
121. 患者，男性，69岁，诊断为急性心肌梗死而收入院治疗，发生室性期前收缩应首选的药物是（ ）
 A. 吗啡
 B. 阿托品
 C. 利多卡因
 D. 普鲁卡因胺
 E. 胺碘酮
122. 患者，女性，51岁，因咳嗽、咳痰、尿少、呼吸困难加重，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。医生考虑患者有急性左心衰，进行强心、利尿、扩血管治疗，利尿剂的最佳使用时间是（ ）
 A. 早餐后
 B. 午餐后
 C. 晚饭后
 D. 傍晚
 E. 夜间
123. 患者，男性，62岁。突然出现心前区疼痛伴大汗3小时，急诊就医，心电图示： $V_1 \sim V_5$ 导联出现异常Q波，且ST段弓背向上抬高，诊断为急性心肌梗死。应用尿激酶治疗，其作用在于（ ）
 A. 促进心肌能量代谢
 B. 增强心肌收缩力
 C. 溶解冠脉内血栓
 D. 疏通心肌微循环
 E. 减轻心脏前负荷
124. 患者，男性，54岁。有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心力衰竭，医嘱进行强心、利尿、扩血管治疗，以下药物不属于增强心肌收缩力类药物的是（ ）
 A. 地高辛
 B. 氨茶碱
 C. 氨力农
 D. 多巴酚丁胺
 E. 毒毛花苷K
125. 患者，女性，68岁。突然出现心前区疼痛伴大汗3小时，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。此患者首要的护理问题是（ ）
 A. 自理缺陷
 B. 恐惧
 C. 气体交换受损
 D. 疼痛
 E. 知识缺乏
126. 患者男性，67岁，因胸痛就诊，既往有心绞痛12年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛，心电图的主要区别是（ ）
 A. ST段抬高
 B. ST段压低
 C. T波倒置
 D. T波低平
 E. 出现异常深而宽的Q波
127. 患者，女性，52岁。有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心力衰竭，进行强心、利尿、扩血管治疗，使用前需测心率的药物是（ ）
 A. 利多卡因
 B. 地高辛
 C. 肠溶阿司匹林
 D. 维拉帕米

- E. 普萘洛尔
128. 某心脏病患者坚持自测脉搏并随时记录,但最近其在做过心电图后发现自己的心率与脉率不一致,心率90次/分,脉率为75次/分,出现该现象最可能的原因是
- 患者颅内压过高
 - 患者发生了三度房室传导阻滞
 - 患者自测脉搏方法有误
 - 患者发生了心房颤动
 - 患者出现了洋地黄中毒
129. 患者,男性,59岁,高血压性心脏病10年,近来体力活动时感到心慌、气短,坐下休息后可缓解,看书时无不适,护士指导安排患者的活动与休息,正确的是()
- 绝对卧床休息
 - 能起床活动,增加休息
 - 限制活动,增加卧床时间
 - 增加活动量
 - 不必限制活动
130. 患者,女性,71岁,患有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、慢性心力衰竭,进行强心、利尿、扩血管治疗,在使用洋地黄药物时,要注意患者有无禁忌证。下列属于应用洋地黄类药物禁忌证的疾病是()
- 充血性心力衰竭
 - 阵发性室上性心动过速
 - 心房颤动
 - 三度房室传导阻滞
 - 心房扑动
131. 患者,男性,29岁。劳累后心悸、气短4年,休息可缓解。近5个月活动中曾有发作过晕厥2次。体检:胸骨左缘第3~4肋间听到较粗糙的喷射性收缩期杂音;超声心动图显示室间隔非对称性肥厚,舒张期室间隔的厚度与后壁之比 ≥ 1.3 ,间隔运动低下。应考虑的临床诊断是()
- 病毒性心肌炎
 - 二尖瓣狭窄
 - 限制型心肌病
 - 肥厚型心肌病
 - 扩张型心肌病
132. 患者,男性,40岁。3周前诊断为急性心包炎,近1周呼吸困难严重,心率加快。查体发现患者有奇脉,奇脉的表现是()
- 脉搏搏动呈呼气性显著减弱或消失,吸气时又复原
 - 脉搏搏动呈吸气性显著减弱或消失,呼气时又复原
 - 脉搏搏动呈吸气性显著减弱,呼气时消失
 - 脉搏搏动呈吸气性显著消失,呼气时减弱
 - 脉搏搏动呈呼气性显著减弱或消失,吸气时减弱或有停顿
133. 患者,男性,35岁,因头晕、胸闷1日就诊,以“扩张型心肌病”收入院。曾有晕厥史。体检:心界扩大,心率38次/分。心电图提示三度房室传导阻滞。最恰当的处理是()
- 注射利多卡因
 - 静脉点滴异丙肾上腺素
 - 静脉点滴氢化可的松
 - 安装永久性人工心脏起搏器
 - 安装临时性人工心脏起搏器
134. 患者,男性,62岁。因突发急性心肌梗死而住院治疗,住院后病情不稳定,20小时后死亡,其主要死亡原因可能是()
- 呼吸困难
 - 心力衰竭
 - 心律失常
 - 心源性休克
 - 心室壁瘤
135. 患者男,55岁,主诉活动后心前区疼痛一个月余。患者平时活动后即出现心前区压迫样疼痛,持续3~5分钟,休息后可以缓解,入院治疗5天后出院,遵医嘱继续服用硝苯地平,该药物属于()
- 血管紧张素转换酶抑制剂
 - 利尿剂
 - 钙通道阻滞剂
 - β 受体拮抗剂
 - 硝酸酯类
136. 患者女,32岁,因再生障碍性贫血,接受丙酸睾酮注射治疗1月余。护士每次在为患者进行肌肉注射前应首先检查()
- 注射部位是否存在硬块
 - 面部有无痤疮
 - 有无毛发增多

- D. 有无皮肤黏膜出血
E. 口唇、甲床的苍白程度
137. 患者，男性，49岁，拟“特发性血小板减少性紫癜”入院，血常规结果显示红细胞 $3.6 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $90g/L$ ，白细胞 $6.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ 。目前该患者最大的危险是（ ）
- A. 贫血
B. 呼吸衰竭
C. 继发感染
D. 充血性心衰
E. 颅内出血
138. 患者，男性，22岁，皮下出血逐渐增多，甚至血肿，以下肢多见，有头晕、乏力，查体：脾轻度肿大，血常规检查：血红蛋白 $90g/L$ ，红细胞 $3.9 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $20 \times 10^9/L$ ，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$ ，诊断为原发性免疫性血小板减少症（ITP）。本病发病机制是（ ）
- A. 细菌感染
B. 骨髓抑制
C. 雄激素过多
D. 雌激素过少
E. 自身免疫性破坏
139. 患者，女性，32岁，月经量多2年，近4个月来感乏力、头晕、心悸，查血红蛋白 $65g/L$ ，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ，骨髓象：红细胞增生活跃，中晚幼红细胞45%，体积小，胞浆偏蓝，治疗首选（ ）
- A. 肌注维生素 B_{12}
B. 口服铁剂
C. 口服叶酸
D. 输血
E. 脾切除
140. 患者，女性，38岁。因持续高热伴皮下出血1周，查血常规：红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $75g/L$ ，白细胞 $3.2 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ ，拟为“再障”收入住院。在入院患者评估的过程中，此患者突然诉说头痛、烦躁不安，此时要警惕患者（ ）
- A. 瘧病发作
B. 急性焦虑发作
C. 高热状态下的精神错乱
D. 颅内出血
E. 并发脑膜脑炎
141. 患者女，42岁。白血病入院化疗3个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的表现。引起此副作用的化疗药物为（ ）
- A. 泼尼松
B. 长春新碱
C. 柔红霉素
D. 阿霉素
E. 甲氨蝶呤
142. 患者，女性，25岁。高热不退、鼻出血1周。体检：扁桃体肿大，表面有脓苔覆盖，肝脾不大。实验室查：全血细胞减少。患者情绪烦躁，常哭泣，诉说近日常做噩梦。为确诊需进一步检查的项目是（ ）
- A. 血常规
B. 凝血象
C. 骨髓象
D. 血培养
E. 血涂片
143. 患者，女性，68岁，患肝硬化8年，近日发现牙龈出血，皮肤有较多出血点，尿频、尿急、腰痛就医，经检查后确认为“肝硬化、脾功能亢进，伴泌尿系感染”。该患者可出现的血细胞减少是（ ）
- A. 红细胞、白细胞及血小板
B. 淋巴、嗜酸细胞
C. 单核细胞
D. 杆状核及嗜碱细胞
E. 巨核细胞
144. 患者，男性，55岁。以特发性血小板减少性紫癜收入院，最常见的出血部位为（ ）
- A. 皮肤黏膜
B. 泌尿道
C. 消化道
D. 生殖道
E. 颅内
145. 患者，女性，29岁，诊断为特发性血小板减少性紫癜，入院后护士应告知患者禁用的药物是（ ）
- A. 红霉素
B. 阿司匹林

- C. 地西洋
D. 阿莫西林
E. 利多卡因
146. 患者，女性，26岁。下肢有紫癜，无其他部位出血。血常规检查：血小板减少，尿常规检查：镜下血尿，为确诊疾病应首选的检查项目是（ ）
- A. 凝血时间
B. 出血时间
C. 骨髓穿刺
D. 尿素氮
E. 血清肌酐
147. 患者，女性，28岁，因发热、咽痛一周入院，诊断为急性淋巴细胞性白血病。体温达40℃。患者的白血病细胞浸润所致的体征是（ ）
- A. 扁桃体肿大
B. 皮肤紫癜
C. 肺部湿啰音
D. 牙龈增生肿胀
E. 心尖区吹风样杂音
148. 患者，男性，45岁。乏力、消瘦1个月，伴发热1周，食欲减退，拟“急性白血病”收治入院。入院化疗后有恶心、无呕吐。WBC $2 \times 10^9/L$ ，PLT $150 \times 10^9/L$ ，护士对白血病患者进行健康教育的内容中，错误的是（ ）
- A. 注意保暖，预防感染
B. 坚持服药，了解不良反应
C. 少量多餐
D. 化疗期间限制饮水
E. 化疗前后2小时内避免进食
149. 患者，女性，45岁。缺铁性贫血，口服硫酸亚铁0.3g，每日3次进行治疗。护士指导患者应采取的服药方法是（ ）
- A. 每间隔8小时服药一次
B. 三餐饭前服用
C. 三餐饭后服用
D. 上午10时，下午3时
E. 睡前服药
150. 患者，女，49岁。被确诊为急性单核细胞白血病，即予DAH方案化疗（D-柔红霉素、A-阿糖胞苷、H-三尖杉酯碱）。应用化疗药物后，护士应重点观察的是（ ）
- A. 心脏毒性表现
B. 骨髓抑制表现
C. 注射部位局部表现
D. 膀胱毒性表现
E. 神经毒性表现
151. 男性，50岁。因“神志不清、行为异常5天，昏迷1天”入院，既往有肝硬化病史8年。入院查体：呼之不应，压眶反射无反应。皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查：血氨145ug/dl。脑电图显示脑电波每秒3次。诊断为肝硬化、肝性脑病。患者经治疗后好转，神志清楚，此时适宜的饮食是
- A. 绝对禁食蛋白质饮食
B. 限制碳水化合物的摄入
C. 逐步增加蛋白质饮食，以植物蛋白为主
D. 含脂肪丰富食物
E. 含维生素丰富的食物
152. 患者，男性，46岁，有胃溃疡病史近10年。近2个月疼痛加剧且失去节律性，无呕吐，服用多种抑酸剂不能缓解。查体：腹部平软，上腹部轻压痛，可扪及肿块，质硬。为确诊病因应首选（ ）
- A. 大便隐血试验
B. X线钡餐检查
C. 幽门螺杆菌检查
D. 胃镜检查
E. 胃液分析
153. 患者，男性，34岁。因慢性胆囊炎在门诊预约进行胆囊造影检查，护士为其讲解检查的方法。下列错误的是（ ）
- A. 检查前一日中午进高脂肪餐，使胆囊排空
B. 检查前一日晚餐进无脂肪、低蛋白高糖饮食
C. 晚餐后口服造影剂，禁食、禁烟至次日晨
D. 检查当日早餐进清淡饮食，可少量饮水
E. 第一次摄片如胆囊显影良好则进高脂肪餐，30分钟后再摄片
154. 患者，女性，60岁。有溃疡病史10余年。突然呕血约500ml，伴有黑便，急诊入院。查体：神志清楚，血压100/60mmHg，心率110次/分。以下护理措施中正确的是（ ）

- A. 平卧位，头部略抬高
 B. 三腔二囊管压迫止血
 C. 呕吐时头偏向一侧，防止误吸和窒息
 D. 快速滴入血管加压素
 E. 暂时给予流质饮食
155. 患者，男性，44岁。有溃疡病史。患者近日感觉上腹饱胀不适，餐后疼痛加重，并有大量反复呕吐，呕吐物为酸腐味的宿食。此时对该患者最有效的护理措施是（ ）
 A. 静脉补液
 B. 绝对卧床休息
 C. 禁食洗胃
 D. 解痉镇痛
 E. 心理护理
156. 患者，男性，45岁。因突发性中上腹剧痛12小时来院急诊，体检发现板状腹，腹部立位平片示膈下有游离气体，生命体征尚平稳。既往有消化性溃疡病和不规则服药史。对该患者目前首先应采取的必要措施为（ ）
 A. 高浓度吸氧
 B. 使用镇痛药
 C. 立即输血
 D. 禁食并胃肠减压
 E. 立即使用抗生素
157. 患者，男性，65岁。“肝硬化伴上消化道大出血”入院，出现性格改变、行为异常，有扑翼样震颤，该患者可能出现的并发症为（ ）
 A. 原发性肝癌
 B. 中枢神经系统感染
 C. 肝性脑病
 D. 肝肾综合征
 E. 肝肺综合征
158. 患者，男性，52岁。因反复上腹部隐痛伴嗝气、食欲减退3个月，经检查诊断为“慢性胃炎”，下列项目中，最有诊断意义的是（ ）
 A. 消化道症状
 B. 胃液分析
 C. 胃镜检查
 D. 血清学检查
 E. 胃肠钡餐X线检查
159. 患者，女性，50岁。肝硬化十余年伴大量腹水，近日出现意识障碍，血氨增高，肾功能减退。下列治疗不妥的是（ ）
 A. 迅速利尿，减少腹水
 B. 精氨酸静脉滴注
 C. 口服乳果糖，降低肠腔pH，减少氨的形成和吸收
 D. 静脉输入支链氨基酸补充能量，降低血氨
 E. 避免使用镇静催眠药
160. 患者男性，52岁，有慢性肝炎病史10年，查体：肝肋下3cm，脾肋下4cm。面颈部见蜘蛛痣。患者出现蜘蛛痣可能的原因是（ ）
 A. 雄激素增多
 B. 雌激素增多
 C. 糖皮质激素减少
 D. 继发性醛固酮增多
 E. 抗利尿激素增多
161. 患者，男性，26岁。1个月前出现进食后上腹部胀痛，夜间常痛醒，进食后可以缓解，今日进食后感上腹饱胀，频繁呕吐宿食。初步诊断为（ ）
 A. 胃溃疡伴出血
 B. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
 C. 胃癌
 D. 急性胃炎
 E. 慢性胃炎
162. 患者，男性，46岁。4年前诊断为肝硬化，近一周症状加重，出现大量腹水。患者腹水治疗中不宜采用的是（ ）
 A. 输注白蛋白
 B. 饮食中限制盐的摄入
 C. 快速利尿
 D. 穿刺放腹水后缚紧腹带
 E. 卧床休息时可取半卧位
163. 患者，男性，45岁。反复上腹痛10余年，近2个月疼痛加重，检查示胃酸缺乏，进一步的诊疗方案首

选 ()

- A. X线钡餐检查
 - B. 三联疗法
 - C. 胃镜检查及组织活检
 - D. 大便隐血试验
 - E. 预防性手术治疗
164. 患者, 男性, 18岁。腹泻近1月, 每天3~4次, 有黏液, 常有里急后重, 伴腹部疼痛, 便后疼痛减轻。查体: 左下腹轻压痛, 余无特殊。进一步确诊有重要价值的检查是 ()
- A. 大便隐血试验
 - B. 血液检查
 - C. X线钡剂灌肠
 - D. 结肠镜检查
 - E. 药物治疗
165. 患者, 女性, 32岁。上腹部间歇性疼痛3年, 空腹及夜间痛明显, 进食后可缓解。3天前出现黑便。患者出现黑便的原因最可能是 ()
- A. 肠道感染
 - B. 胃溃疡出血
 - C. 十二指肠溃疡出血
 - D. 胃癌
 - E. 应激性溃疡
166. 患者, 女性, 54岁。患肝硬化8年, 近日出现大部分时间昏睡, 可唤醒, 有扑翼样震颤, 肌张力增加, 脑电图异常, 锥体束征阳性。此时该患者处于并发症的 ()
- A. 前驱期
 - B. 昏迷前期
 - C. 昏睡期
 - D. 浅昏迷期
 - E. 深昏迷期
167. 患者男, 22岁。消化性溃疡患者, 给予枸橼酸铋钾+克拉霉素+阿莫西林三联治疗, 期间出现黑便, 担心病情加重, 行粪便隐血试验报告为阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是 ()
- A. 溃疡出血
 - B. 溃疡癌变
 - C. 阿莫西林不良反应
 - D. 克拉霉素不良反应
 - E. 枸橼酸铋钾不良反应
168. 患者, 女性, 32岁。上腹部节律性疼痛2年, 常于过度劳累后诱发。近3天疼痛加剧, 突然呕血500ml。查体: 血压90/60mmHg, 巩膜无黄染, 上腹部无压痛, 未触及肝脾, 对于目前了解的信息, 该患者最有可能是 ()
- A. 肝硬化
 - B. 原发性肝癌
 - C. 溃疡癌变
 - D. 溃疡并发出血
 - E. 溃疡并发穿孔
169. 患者, 女性, 41岁。诊断为“溃疡性结肠炎”收住入院, 每天腹泻5~6次, 有少量脓血便。对此患者饮食护理应注意 ()
- A. 给予易消化、富含纤维素饮食
 - B. 低蛋白饮食
 - C. 进食无渣流质或半流质饮食
 - D. 多进食新鲜水果
 - E. 多吃蔬菜
170. 患者, 男性, 45岁, 因肝硬化大量腹水住院治疗, 以下对该患者的护理措施正确的是 ()
- A. 患者取平卧位, 增加肝、肾血流量
 - B. 每日进水量限制在1200ml左右
 - C. 腹腔放液后应放松腹带, 防止腹压增高
 - D. 利尿剂应用以每天体重减轻不超1.5kg为宜
 - E. 腹穿后缚紧腹带, 防止腹内压骤降
171. 患者, 男性, 52岁。有溃疡病史10年。最近1周中上腹持续性胀痛, 较以往严重, 伴恶心、呕吐。今日呕血一次, 量约800ml, 血压100/75mmHg。该患者目前主要潜在的护理问题是 ()
- A. 疼痛
 - B. 恐惧
 - C. 活动无耐力
 - D. 有体液不足的危险
 - E. 营养失调
172. 患者, 女性, 58岁。有慢性肝炎病史15年, 肝硬化7年, 曾多次住院。此次因为出现腹水和黄疸再次

入院，查体：T36.4℃，脉搏 88 次/分，呼吸 22 次/分，血压 130/80mmHg。目前该患者最主要的护理问题是（ ）

- A. 焦虑
- B. 恐惧
- C. 知识缺乏
- D. 活动无耐力
- E. 体液过多

173. 患者，男性，60 岁。肝硬化 5 年，少量腹水，口服利尿剂，近日为补充营养，口服蛋白粉。今日家属发现其表情淡漠，回答问题准确，但吐字不清，有双手扑翼样震颤，初步诊断为肝性脑病。其发病诱因为（ ）

- A. 上消化道出血
- B. 高蛋白饮食
- C. 感染
- D. 大量排钾利尿
- E. 放腹水

174. 男，41 岁，有消化性溃疡史 4 年，1 天来胃痛明显，无恶心，呕吐。今晨觉头昏、乏力、黑矇，排尿排便 1 次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问（ ）

- A. 排便习惯
- B. 粪便颜色
- C. 尿液颜色
- D. 尿量
- E. 有无眩晕

175. 林先生 41 岁，上腹痛伴反酸，嗝气 2 个月，检查上腹轻压痛，大便隐血试验持续阳性，纤维胃镜检查后诊断为十二指肠球部溃疡。大便隐血试验持续阳性提示为（ ）

- A. 并发幽门梗阻
- B. 溃疡病变活动
- C. 溃疡恶变
- D. 并发慢性穿孔
- E. 合并胃炎

176. 患者男性，56 岁，有肝硬化病史 10 余年。近日食欲明显减退，黄疸加重。今晨因剧烈咳嗽突然呕咖啡色液体约 1200ml，黑便 2 次，伴头晕、眼花、心悸。患者上消化道出血最可能的原因是（ ）

- A. 消化性溃疡出血
- B. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- C. 急性糜烂性胃炎出血
- D. 应激性溃疡
- E. 胃癌出血

177. 患者男，63 岁，慢性胃炎，幽门螺杆菌(+)，需要采用抗菌药物治疗，其用药原则是（ ）

- A. 剂量宜大
- B. 宜静脉给药
- C. 联合用药
- D. 宜长期使用
- E. 药物种类不受限制

178. 患者，女性，26 岁。1 型糖尿病，因感冒而中断胰岛素治疗 3 日，突发昏迷，Kussmaul 呼吸，皮肤弹性差，脉细速，血压下降，尿量减少，血糖 33.3 mmol/L，血尿素氮、肌酐偏高，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 86%，尿糖、尿酮体强阳性，诊断考虑（ ）

- A. 感染性休克
- B. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- C. 糖尿病肾病尿毒症昏迷
- D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- E. 乳酸性酸中毒

179. 患者，女性，25 岁，1 型糖尿病，病程 3 年余，使用胰岛素治疗。今天出现头晕、恶心、呕吐，不能正常进食，突然发生昏迷，测即刻血糖 3.3mmol/L。考虑为（ ）

- A. 低血糖昏迷
- B. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- C. 糖尿病肾病尿毒症昏迷
- D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- E. 乳酸性酸中毒

180. 患者，女性，60 岁。因视力障碍收入院，查空腹血糖 10mmol/L，餐后血糖 18mmol/L，该患者可能是（ ）

- A. 花眼
- B. 糖尿病视网膜病变
- C. 动脉硬化
- D. 黄斑变性
- E. 角膜溃疡

181. 患者，女性，26 岁。妊娠 7 个月，体格检查发现，尿糖(+++)，血糖：空腹 7.81 mmol/L，餐后 2 小时

16. 7mmol/L。治疗主要选择 ()
- A. 饮食治疗
 - B. 体育锻炼
 - C. 口服降糖药
 - D. 胰岛素
 - E. 无需治疗
182. 患者女, 26 岁。诊断为 1 型糖尿病。今日因感冒导致食欲减退、进食量少, 但餐前仍按常规注射胰岛素, 近午时突然心悸、出汗, 继而头晕、视物模糊。急诊处理应采用 ()
- A. 胰岛素静脉注射
 - B. 静滴生理盐水
 - C. 葡萄糖静脉注射
 - D. 静滴碳酸氢钠
 - E. 急查血常规
183. 患者, 女性, 20 岁。因血压升高, 血糖升高, 向心性肥胖, 脸部皮肤薄、红住院, 查血压 180/100mmHg, 月经量少不规则, CT 结果为垂体生长肿物, X 线显示骨质疏松。该患者可能患的是 ()
- A. 库欣综合征
 - B. 糖尿病
 - C. 高血压
 - D. 妇科病
 - E. 肿瘤
184. 患者, 男性, 55 岁。糖尿病。不规则服药, 血糖波动在 8.6~9.8mmol/L, 尿糖(++~+++), 近日感尿频、尿痛, 昨日起突然神志不清, 查血糖 28mmol/L, 尿素氮 7.8mmol/L, 血钠 148mmol/L, 尿糖(+++), 酮体(++)。其诊断为 ()
- A. 低血糖昏迷
 - B. 糖尿病酮症酸中毒
 - C. 乳酸性酸中毒
 - D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
 - E. 急性脑血管病
185. 患者, 女性, 42 岁。糖尿病病史 3 年, 某日餐前突然感到饥饿难忍、全身无力、心慌、出虚汗, 继而神志恍惚。护士应立即采取的措施是 ()
- A. 配血备血
 - B. 协助患者饮糖水
 - C. 进行血压监测
 - D. 建立静脉通路
 - E. 专人护理
186. 患者, 男性, 28 岁。糖尿病病程已有 11 年, 使用胰岛素治疗。但血糖未规律监测。近 3 月出现眼睑及下肢水肿, 尿糖(++), WBC 0~4 个/HP, 尿蛋白(+++). 考虑的诊断是 ()
- A. 胰岛素性水肿
 - B. 肾动脉硬化
 - C. 肾盂肾炎
 - D. 急性肾炎
 - E. 糖尿病肾病
187. 患者, 女性, 18 岁。因双侧甲状腺肿大住院。甲状腺扫描可见弥漫性甲状腺肿, 均匀分布。医生诊断为单纯性甲状腺肿, 支持这一诊断的实验室检查结果是 ()
- A. T_3 、 T_4 升高, TSH 降低
 - B. T_3 、 T_4 降低, TSH 升高
 - C. T_3 、 T_4 升高, TSH 正常
 - D. T_3 、 T_4 降低, TSH 正常
 - E. T_3 、 T_4 正常, TSH 正常
188. 患者, 女性, 39 岁。因甲状腺功能亢进服用丙硫氧嘧啶治疗, 2 个月后发现药物反应。下列需停药观察的重要指征是 ()
- A. 出现皮疹
 - B. 中性粒细胞 $< 1.5 \times 10^9/L$
 - C. 突眼加重
 - D. 头晕、乏力
 - E. 胃肠道反应
189. 患者, 女性, 49 岁。既往体健, 近 1 月来发现记忆力减退、反应迟钝、乏力、畏寒, 住院检查: 体温 35.6℃, 心率 60 次/分, 黏液水肿, 血 TSH 升高, 血 FT_4 降低, 可能的诊断是 ()
- A. 甲状腺功能亢进
 - B. 甲状腺功能减退
 - C. 痛风
 - D. 痴呆
 - E. 幼年型甲减

190. 患者，女性，30岁。自诉全身乏力，心慌怕热，每日大便3~4次，诊断甲亢，治疗半年好转，后上述症状再次出现，且体重下降5公斤，护理发现患者情绪激动，双目有神，甲状腺Ⅱ度肿大，局部可闻及杂音，心率120次/分，患者最可能发生的问题是（ ）
- 伴发糖尿病
 - 甲亢复发
 - 伴发心脏病
 - 出现甲减
 - 发生亚急性甲状腺炎
191. 患者，男性，50岁。下班后与朋友聚餐，很晚回家休息。午夜突发左脚第1跖趾关节剧痛，约3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难，遂来急诊就诊。检查血尿酸为500mmol/L；X线提示：可见非特征性软组织肿胀。患者可能诊断是（ ）
- 痛风
 - 假性痛风
 - 风湿性关节炎
 - 类风湿性关节炎
 - 化脓性关节炎
192. 患者，男，65岁。右侧跖骨、踝关节红肿疼痛。诊断为痛风性关节炎。首选的治疗药物是（ ）
- 美洛昔康
 - 布洛芬
 - 秋水仙碱
 - 糖皮质激素
 - 吲哚美辛
193. 患者，女性，70岁。近1年来腰背、脊柱X线检查示：胸12腰1椎体楔形压缩性骨折，骨密度测定腰椎低于正常年轻妇女峰值骨量。实验室检查血钙2.18mmol/L，血磷0.98mmol/L，血碱性磷酸酶134U/L。诊断最可能是（ ）
- 肾性骨病
 - 脊柱骨折
 - 原发性甲状旁腺功能亢进症
 - 原发性骨质疏松症
 - 继发性甲状旁腺功能亢进症
194. 患者女性，30岁。在烈日下暴晒后面部出现蝶形红斑，全身多关节肿胀疼痛，伴头晕乏力，食欲不振。此患者最可能的诊断是（ ）
- 干燥综合征
 - 类风湿关节炎
 - 坏死性血管炎
 - 反应性关节炎
 - 系统性红斑狼疮
195. 周女士，近期发热、关节疼痛，以类风湿关节炎入院。以下护理措施错误的是（ ）
- 注意休息
 - 热敷、理疗
 - 严格限制关节活动
 - 医嘱用药
 - 同情理解患者
196. 某患者双手掌指关节肿胀疼痛3年，晨起有黏着感，活动后缓解，查类风湿因子(+)，诊断为类风湿关节炎，为防止关节畸形，应注意（ ）
- 长期卧床休息
 - 进食高热量、高蛋白饮食
 - 小夹板固定
 - 长期服用抗生素防感染
 - 进行关节功能锻炼
197. 患者，女，48岁。类风湿关节炎5年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节的功能，正确的做法是（ ）
- 腕关节背伸、指关节背伸
 - 腕关节背伸、指关节掌屈
 - 腕关节掌屈、指关节侧屈
 - 腕关节掌屈、指关节背伸
 - 腕关节侧屈、指关节掌屈
198. 患者女性，25岁。职员，因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛3年，加重2个月，以类风湿关节炎收入院。经休息、药物治疗后，现在病情缓解，准备出院，护士应进行的健康教育是（ ）
- 每日进行运动锻炼4小时
 - 吃高蛋白、高热量饮食
 - 避免劳累，预防感冒
 - 在家承担所有家务劳动

- E. 每日饮水控制在 500ml
199. 患者女性, 49 岁。农民, 2 年前无明显诱因出现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖趾关节肿痛, 伴晨僵, 时间约 10 分钟, 疼痛以夜间明显, 影响行动。实验室检查: 血沉 55mm/h, RF(+). 关节 X 线检查: 双手骨质疏松, 腕部关节间隙变窄。有关关节的护理是 ()
- 关节保暖
 - 使用复方新诺明口服治疗
 - 加强关节运动强度
 - 关节冷敷
 - 因疼痛保持关节持续不动
200. 患者, 女, 15 岁。学生, 主诉因为双肘、腕、手指近端指间关节肿痛 3 年, 加重 2 个月, 以类风湿关节炎收入院。经过药物、休息等治疗后现在病情缓解, 下一步最主要的护理是 ()
- 嘱患者多休息
 - 指导患者进行功能锻炼
 - 向患者做饮食指导
 - 向患者介绍如何观察药物疗效
 - 介绍预防药物不良反应的方法
201. 患儿, 6 岁, 因风湿热入院, 肌注青霉素、口服阿司匹林后出现食欲下降、恶心等胃肠道不适, 护士可以给予的正确指导是 ()
- 饭后注射青霉素
 - 两餐间用阿司匹林
 - 饭后服用阿司匹林
 - 两餐间注射青霉素
 - 阿司匹林与维生素 C 同服
202. 患儿, 5 岁。因发热 3 周, 双膝关节痛 2 周入院。查体: 体温 38°C, 脉搏 101 次/分, 咽稍充血, 心肺(-), 双膝关节红、肿, 活动受限, 实验室检查示: 血沉 98mm/h, C 反应蛋白(+), 心电图示 P-R 间期延长。为确诊需化验的指标是 ()
- 血常规
 - 24 小时动态心电图
 - 黏蛋白
 - 抗链球菌溶血素“O”(ASO)
 - 血清抗核抗体
203. 患者女性, 33 岁。有系统性红斑狼疮 5 年, 一直服用药物治疗, 最近主诉视力下降, 可能因为服用了 ()
- 阿司匹林
 - 吲哚美辛
 - 抗疟药
 - 布洛芬
 - 地塞米松
204. 某女患者因发热、关节痛、面部有蝶形红斑及血中抗 Sm 抗体(+), 确诊为系统性红斑狼疮 (SLE), 医嘱不能食用含有补骨脂素的芹菜、香菜、无花果, 原因为 ()
- 可增强雌激素作用
 - 可损害肾小球
 - 可加重表皮细胞损害
 - 增强对紫外线的敏感性
 - 可加重关节滑膜炎
205. 赵先生, 26 岁, 系统性红斑狼疮患者, 面部有较严重的蝶形红斑, 且有脱发及糖皮质激素治疗引起的容貌改变, 该患者最主要的护理诊断是 ()
- 疼痛
 - 活动无耐力
 - 自我形象紊乱
 - 知识缺乏
 - 焦虑
206. 患者女性, 25 岁, 面部有蝶形红斑, 严重关节疼痛, 最近查 Hb90g/L。乏力, Sm 抗体阳性, 抗双链 DNA 抗体阳性, 需要首先解决的护理问题是 ()
- 乏力
 - 疼痛
 - 皮肤完整性受损
 - 有感染的危险
 - 输营养液
207. 患者, 女性, 24 岁, 主因“全身关节肿痛伴发热 4 周”入院。查体: 面部可见紫红色蝶形红斑, Hb80g/L, 血沉 120mm/h, 尿蛋白(++). 目前治疗本病的首选药物是 ()
- 糖皮质激素
 - 非甾体类抗炎药

- C. 抗疟药
D. 免疫抑制剂
E. 强效广谱抗生素
208. 患者，男性，37岁。不规则发热、咳嗽，伴间断腹泻、食欲减退及明显消瘦2个月，既往有静脉吸毒史。体格检查：体温38℃，全身淋巴结肿大，质韧、无触痛，能活动。血白细胞 $4.0 \times 10^9/L$ ，血清抗HIV(+)。此患者最可能的疾病是（ ）
- A. 支气管肺癌
B. 艾滋病
C. 白血病
D. 败血症
E. 淋巴瘤
209. 患者，男性，37岁。因发热、咳嗽，伴间断腹泻、食欲减退及明显消瘦就诊，既往有静脉吸毒史。查血清抗HIV(+)。诊为艾滋病进行治疗，能反映此病预后和疗效的检查项目是（ ）
- A. CD4⁺/CD8⁺比值
B. 血常规
C. 骨髓检查
D. 血培养
E. 淋巴结活检
210. 患者，男性，38岁。发热、咳嗽2周，伴痛、气短、极度乏力，拟诊为艾滋病。体格检查：体温38℃；双侧颊黏膜散在溃疡、并有白色分泌物；两肺听诊可闻及湿啰音。血白细胞 $4.0 \times 10^9/L$ ，CD4⁺/CD8⁺比值 <1 ，X线提示双肺间质性肺炎。不恰当的护理是（ ）
- A. 严格执行消毒隔离措施
B. 多与患者沟通，鼓励患者树立战胜疾病的信心
C. 给予高热量、高蛋白、高维生素的清淡、易消化饮食
D. 提供患者与家属、亲友沟通的机会，获得更多心理支持
E. 安置患者于隔离室内，病室外挂黄色标识进行严密隔离
211. 某护士在给HBsAg阳性的慢性肝炎患者采血时，不慎刺破左手拇指，此时急需采取的重要措施是（ ）
- A. 立即注射乙肝疫苗
B. 立即进行酒精消毒
C. 定期复查肝功能和HBV-IgM
D. 立即注射高效价乙肝免疫球蛋白和查血HBsAg及HBsAb
E. 立即接种乙肝疫苗，1周内注射高效价乙肝免疫球蛋白
212. 患者，男性，37岁。因近2周食欲减退、上腹部不适、疲乏无力就诊，体检：肝肋下2cm，有轻度触痛。为明确诊断首先应检查的项目是（ ）
- A. 尿胆红素
B. 血清胆红素
C. 血清蛋白
D. 血清丙氨酸氨基转移酶
E. 谷氨酸氨基转移酶
213. 患者，女性，25岁。既往体健，体检时发现肝功能正常，抗-HBs阳性，反复查HBV其他血清标记物均为阴性。表示此患者为（ ）
- A. 乙型肝炎有传染性
B. 乙型肝炎病情稳定
C. 乙型肝炎病毒携带者
D. 乙型肝炎恢复期
E. 对乙型肝炎病毒有免疫力
214. 某学校3周内六位学生相继出现乏力、食欲减退、巩膜黄染，ALT增高，HBsAg(-)，抗HAV-IgM(+)、抗HAV-IgG(-)，最可能的诊断是（ ）
- A. 急性甲型病毒性肝炎
B. 急性乙型病毒性肝炎
C. 急性丙型病毒性肝炎
D. 急性丁型病毒性肝炎
E. 急性戊型病毒性肝炎
215. 患者，男性，50岁。因近1周食欲减退、呕吐、疲乏无力，尿黄。自昨日起烦躁不安，呼气中有腥臭味、巩膜及皮肤黄染，皮肤可见瘀斑，肝未扪及，腹水征阳性。目前最主要的护理问题是（ ）
- A. 体液过多
B. 活动无耐力
C. 皮肤完整性受损
D. 营养失调：低于机体需要量
E. 潜在并发症：肝性脑病
216. 患者，女性，29岁，既往体健，近1年来发现HBsAg阳性，但无任何症状，肝功能正常，此患者目前病情所处状态是（ ）
- A. 无症状HBsAg携带者

- B. 轻度慢性乙型肝炎
 C. 中度慢性乙型肝炎
 D. HBV 既往感染
 E. 急性无黄疸型乙型肝炎
217. 患者，男性，18岁。确诊为原发型肺结核，护士对其实施健康教育，不正确的是（ ）
 A. 定期复查
 B. 避免与其他急性传染病患者接触
 C. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
 D. 全程正规服药，出现毒副作用亦不可停用或减量
 E. 呼吸道分泌物、餐具、痰杯应消毒处理
218. 患儿，男，7岁。因突然高热、惊厥1次就诊。现体温 39.5℃，面色苍白，四肢冷，意识模糊，大便常规有脓细胞。考虑该患儿是（ ）
 A. 中毒性细菌性痢疾
 B. 水痘并发脑炎
 C. 腮腺炎脑炎
 D. 麻疹脑炎
 E. 高热惊厥
219. 患儿女，10个月。发热4天，体温 39~40℃，同时伴流涕，查体：口腔黏膜充血、粗糙，在颊黏膜处可见白色点，耳后皮肤可见斑丘疹。护士考虑该患儿是（ ）
 A. 猩红热
 B. 麻疹
 C. 病毒疹
 D. 幼儿急疹
 E. 水痘
220. 患儿，女，7岁，诊断为流行性腮腺炎，护士指导家长为女儿选择食品正确的是（ ）
 A. 鼓励患儿多饮水
 B. 可每日给适量干果
 C. 可选择高纤维食品
 D. 可选择高热量的牛肉
 E. 选择刺激唾液分泌的酸味食物
221. 患儿，男，7岁。诊断为流行性腮腺炎，护士健康指导不正确的是（ ）
 A. 鼓励患儿多饮水
 B. 睾丸肿痛时可用丁字带
 C. 忌酸辣、硬而干燥的食物
 D. 本病为自限性疾病，无特殊疗法
 E. 如合并脑膜脑炎，则应长期口服肾上腺皮质激素
222. 患儿，3岁。以突然高热、进行性呼吸困难入院，怀疑为中毒性痢疾。为早日检出痢疾杆菌，护士留取大便正确的做法是（ ）
 A. 标本多次采集，集中送检
 B. 开塞露灌肠取便
 C. 患儿无大便时，口服泻剂留取大便
 D. 如标本难以采集，可取其隔日大便送检
 E. 冷盐水灌肠取便
223. 患者，男，54岁。中毒性痢疾，体温 39℃，脉搏 124次/分，血压 80/50mmHg，伴呼吸困难，出冷汗，目前患者需采取的合适卧位是（ ）
 A. 中凹位
 B. 平卧位头偏向一侧
 C. 头高脚低位
 D. 侧卧位
 E. 端坐位
224. 患者，男，45岁。因剧烈腹泻来诊。根据临床症状和查体结果，高度怀疑为霍乱，正在等待实验室检查结果以确认诊断。此时，对患者正确的处置方法是（ ）
 A. 在指定场所单独隔离
 B. 在医院门诊等待结果
 C. 在留下联系电话后要求其回家等通知
 D. 收住入本院消化科病房
 E. 要求患者尽快自行前往市疾控中心确诊
225. 患儿男，8岁。因高热5小时，反复抽搐、意识不清入院。查体：呼吸浅快，面色苍白，抽搐状，两侧瞳孔不等大，对光反射迟钝，实验室检查：WBC $15 \times 10^9/L$ ，肛拭子取粪便检查：脓细胞5个/高倍视野。该患者最可能的诊断是（ ）
 A. 败血症
 B. 高热惊厥
 C. 中毒型细菌性痢疾

- D. 流行性乙型脑炎
E. 流行性脑脊髓膜炎
226. 患者，男性，60岁。主诉四肢远端呈手套、袜套样感觉减退。该患者属于（ ）
A. 末梢型感觉障碍
B. 分离性感觉障碍
C. 交叉性感觉障碍
D. 部分性感觉障碍
E. 完全性感觉障碍
227. 男性，29岁，因突发左侧肢体活动不利伴恶心、呕吐及头痛来诊，以“脑栓塞”收入院。今晨护士进行肌力评估时其左侧肢体的肌肉可轻微收缩，但不能产生动作。按6级肌力记录法，该患者的肌力为（ ）
A. 0级
B. 1级
C. 2级
D. 4级
E. 5级
228. 患者女，32岁，患“缺铁性贫血”，去除病因及经口服铁剂治疗后，血红蛋白已恢复正常。为补足体内贮存铁，需继续服用铁剂（ ）
A. 3~6个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 8个月
E. 12个月
229. 患者，女，26岁，缺铁性贫血。给予铁剂治疗后，能最早反映其治疗效果的指标是（ ）
A. 血清铁
B. 红细胞
C. 血小板
D. 白细胞
E. 网织红细胞
230. 患者男，75岁。支气管哮喘患者。受凉后出现胸闷，呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音入院。既往上呼吸道感染后有类似发作史。对其健康教育最重要的是（ ）
A. 清淡饮食
B. 不饲养宠物
C. 避免接触花草
D. 保持乐观情绪
E. 预防上呼吸道感染
231. 瘫痪患者患侧肢体无力，能脱离床面，但不能抵抗阻力，其肌力为（ ）
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 4级
E. 5级
232. 帕金森病的典型表现为（ ）
A. 日常活动受限
B. 静止性震颤
C. 肌强直
D. 言语障碍
E. 运动减少
233. 患者，女，75岁。因“冠心病，不稳定型心绞痛”入院。为了解患者的心功能，护士应特别关注的辅助检查是（ ）
A. X线胸片
B. 心电图
C. 超声心动图
D. 心脏CT
E. 急诊生化检查
234. 患者，男，40岁。慢性肺源性心脏病5年，近3周来出现呼吸困难加重，气促、心悸、食欲下降、腹胀，饮食方式是（ ）
A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
B. 高盐、高热量、低维生素饮食
C. 高蛋白、高热量饮食
D. 低蛋白、高热量、高维生素饮食
E. 低盐、适当热量、高维生素饮食
235. 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)初期的临床特点是（ ）
A. 有严重低氧血症

- B. 发绀
 C. 有明显肺部体征
 D. 呼吸困难
 E. 深昏迷
236. 感染性心内膜炎的最重要的诊断方法为 ()
 A. 心电图
 B. 超声
 C. X线片
 D. 血培养
 E. C-反应蛋白
237. 患者,女,29岁。约10天前感冒发热,后一直有疲劳感,昨日起感心慌、胸闷。心电图示“二度Ⅱ型房室传导阻滞”。通过实验检查结果,临床考虑为“病毒性心肌炎”。下列实验室检查对诊断患者疾病最有价值的是 ()
 A. 高敏C反应蛋白增高
 B. 血液白细胞升高
 C. 血清中同型病毒抗体滴度升高4倍以上
 D. 肌红蛋白、肌酸激酶及其同工酶增高
 E. 血沉加快
238. 急性重症肝炎早期与亚急性、慢性重症肝炎相鉴别,最有诊断意义的是 ()
 A. 黄疸迅速加深
 B. 出血倾向加重
 C. 中枢神经系统症状
 D. 严重恶心、呕吐
 E. 出现腹水
239. 病毒性心肌炎患者的治疗要点不包括 ()
 A. 预防心力衰竭
 B. 抗生素治疗
 C. 抗病毒治疗
 D. 急性期卧床休息
 E. 防治心律失常
240. 关于急性脱髓鞘性多发性神经炎患者的健康教育,正确的叙述是 ()
 A. 必要时行气管切开
 B. 去枕平卧
 C. 高流量面罩给氧
 D. 人工呼吸
 E. 静脉给予呼吸兴奋剂
241. 系统性红斑狼疮会累及多个器官,最常累及的是 ()
 A. 肾脏
 B. 心脏
 C. 大脑
 D. 脾脏
 E. 肺脏
242. 护士评估肝硬化患者的皮肤改变时可发现蜘蛛痣,蜘蛛痣一般不出现的部位是 ()
 A. 手臂
 B. 胸部
 C. 面颈部
 D. 腹部
 E. 肩背部
243. 心力衰竭患者出现洋地黄毒性反应,首要的处理措施是 ()
 A. 停用洋地黄药物
 B. 补液,稀释体内药物
 C. 电击除颤
 D. 利多卡因,纠正心律失常
 E. 利尿,促进排泄
244. 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是 ()
 A. 白色念珠菌
 B. 结核杆菌
 C. 疱疹病毒
 D. 巨细胞病毒
 E. 肺孢子虫
245. 患者,男,65岁。右侧跖骨、踝关节红肿疼痛。诊断为痛风性关节炎。首选的治疗药物是 ()
 A. 美洛昔康
 B. 布洛芬

- C. 秋水仙碱
D. 糖皮质激素
E. 吡哌美辛
246. 关于慢性浅表性胃炎的叙述、错误的是 ()
A. 胃酸偏低
B. 消化性溃疡的发生率增高
C. 易出现暖气、反酸、腹胀等症状
D. 可以引起恶性贫血
E. 症状酷似消化性溃疡
247. 蛛网膜下腔出血患者可表现的神经系统典型特征是 ()
A. 失语
B. 偏瘫
C. 静止性震颤
D. 脑膜刺激征
E. 醉汉步态
248. 患者，男性，43岁，因胸部挤压伤收入院，查体：左侧胸部塌陷畸形，左侧3-7肋骨骨折，右侧第3-8肋骨骨折。此时该患者首要的评估内容是 ()
A. 骨折情况
B. 体温是否正常
C. 是否有药物过敏史
D. 疼痛是否可以耐受
E. 是否可以维持有效气体交换
249. 再生障碍性贫血患者常出现的体征应除外 ()
A. 面色苍白
B. 肺部感染
C. 口咽、肛周感染
D. 肝、脾肿大
E. 皮肤黏膜出血
250. 老年人在做健身体操时突发心绞痛，立即含硝酸甘油2片(0.6mg)，1min后眼前发黑，恶心、手心发凉。此时应指导其 ()
A. 活动四肢
B. 喝热开水
C. 躺下平卧
D. 再含一片硝酸甘油
E. 站立不动，待自行恢复
251. 急性肾衰竭病人可选择的抗生素是 ()
A. 磺胺药
B. 卡那霉素
C. 链霉素
D. 青霉素
E. 阿米卡星
252. 肝硬化合并上消化道出血最主要的原因是 ()
A. 缺乏维生素K
B. 急性胃粘膜糜烂
C. 血小板减少
D. 食管胃底静脉曲张破裂
E. 反流性食管炎
253. 导致左心室压力负荷过重的病因是 ()
A. 二尖瓣关闭不全
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 甲状腺功能亢进
D. 高血压
E. 肺动脉瓣狭窄
254. 对心肌疾病患者进行长期用药指导的内容不包括 ()
A. 药物的名称、剂量、用法
B. 教会病人或家属观察药物的不良反应
C. 教会病人或家属观察药物的疗效
D. 根据药物疗效调整药物剂量
E. 指导患者时间药效的观点
255. 患者男，58岁。糖尿病住院，经过治疗血糖得以控制，病情稳定准备出院。护士给该患者进行出院饮食指导时，应告诉其每日总热量在三餐中的比例为 ()
A. 早餐 1/6、剩下的午餐、晚餐各半
B. 早餐 1/5、中餐、晚餐各 2/5

- C. 早餐 1/4、剩下的中餐、晚餐各半
- D. 早餐 1/4、中餐 1/2、晚餐为 1/4
- E. 早餐 1/2、剩下的午餐、晚餐各半

256. 患者男, 70 岁。因患肺癌行多次放疗, 护士进行皮肤护理正确的是 ()

- A. 保持皮肤干燥, 清洁
- B. 肥皂水清洗
- C. 热敷理疗
- D. 外用药物
- E. 按摩

(257~258 题共用题干)

患者男, 89 岁。患慢性支气管炎 17 年, 近两周来急性发作入院。患者入院后出现频繁咳嗽、咳痰, 痰稠不易咳出。2 分钟前夜班护士发现患者剧烈咳嗽, 突然呼吸极度困难, 喉部有痰鸣音, 表情恐怖, 两手乱抓。

257. 护士应判断患者最可能发生 ()

- A. 急性心肌梗死
- B. 患者从恶梦中惊醒
- C. 出现急性心力衰竭
- D. 呼吸道痉挛导致缺氧
- E. 痰液堵塞气道导致窒息

258. 此时护士最恰当的处理 ()

- A. 立即通知医师
- B. 给予氧气吸入
- C. 应用呼吸兴奋剂
- D. 立即清除呼吸道痰液
- E. 立即配合医生行气管插管

(259~260 题共用题干)

患者男, 31 岁。2 月来出现午后低热, 盗汗, 乏力, 消瘦, 食欲不振, 近一周高热, 咳嗽, 咳痰, 痰中带血。痰结核分枝杆菌阳性。应用链霉素抗结核治疗。

259. 链霉素长期应用可出现的不良反应是 ()

- A. 周围神经炎
- B. 肝损害
- C. 眩晕, 听力障碍
- D. 高尿酸血症
- E. 视神经炎

260. 对患者的痰液简单有效的处理方法是 ()

- A. 深埋
- B. 焚烧
- C. 阳光下暴晒
- D. 用开水煮沸
- E. 过氧乙酸浸泡

261. 治疗扩张性心肌病需要慎用的药物是 ()

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 利尿剂
- C. 扩血管药物
- D. β 受体阻滞剂
- E. 钙拮抗剂

262. 医生在给患者做腰穿的时候, 突然出现呼吸骤停, 瞳孔忽大忽小, 请问此时患者出现了 ()

- A. 循环衰竭
- B. 枕骨大孔疝
- C. 休克
- D. 蛛网膜下表皮囊肿
- E. 脑梗死

263. 对于被结核菌痰污染的纸张, 最简单的灭菌方法是 ()

- A. 掩埋
- B. 煮沸
- C. 阳光暴晒
- D. 将痰吐包在纸上焚烧
- E. 1%过氧乙酸浸泡

264. 患者, 男, 40 岁。扩张型心肌病病史 5 年。近年来反复发生心力衰竭, 其疾病发生发展的基本机制是 ()

- A. 心肌肥厚
- B. 心房重塑
- C. 心室重塑
- D. 心肌缺血

- E. 心肌梗死
265. 患者，男，65岁。右侧跖骨、踝关节红肿疼痛。诊断为痛风性关节炎。首选的治疗药物是（ ）
- 美洛昔康
 - 布洛芬
 - 秋水仙碱
 - 糖皮质激素
 - 吲哚美辛
266. 患者，女，68岁。肺心病15年，患大叶性肺炎，咳嗽、咳痰2周，自服抗生素，未见明显效果。今日感呼吸困难、烦躁，神志恍惚。查体：口唇发绀，颈静脉充盈，两肺底闻及细湿啰音，体温37.4℃，脉搏110次/分，血压98/68mmHg，双下肢水肿，尿蛋白阳性，大便隐血阳性。患者最可能出现的并发症是（ ）
- 呼吸衰竭
 - 肾功能衰竭
 - 急性脑出血
 - 急性心力衰竭
 - 上消化道出血
267. 患者，男，60岁。有高血压病史30年，在家做家务活动时突发头晕，随即倒地，急送医院检查，患者呈昏迷状态，左侧肢体偏瘫，CT高密度阴影。最可能的诊断是（ ）
- 蛛网膜下腔出血
 - 脑血栓形成
 - 脑栓塞
 - 脑出血
 - 短暂性脑缺血发作
- (268~270题共用题干)
- 患者，女，28岁。因外出春游出现咳嗽、咳痰伴喘息3天入院。体检：体温36.5℃，脉搏90次/分，呼吸28次/分，血压110/80mmHg，喘息貌，口唇发绀，在肺部可闻及广泛哮鸣音。
268. 该患者发病最可能的诱因是（ ）
- 花粉
 - 尘螨
 - 动物毛屑
 - 病毒感染
 - 精神因素
269. 患者进一步表现为发绀明显、端坐呼吸、大汗淋漓，24小时经一般解痉、平喘治疗后症状无缓解，判断患者为（ ）
- 混合性哮喘
 - 内源性哮喘
 - 哮喘持续状态
 - 左心衰竭
 - 右心衰竭
270. 对该患者采取的护理措施不妥的是（ ）
- 每日饮水量应在2000ml以上
 - 在病室内摆放鲜花
 - 遵医嘱给予祛痰药物
 - 遵医嘱给予糖皮质激素
 - 避免食用鱼、虾等食物
271. 心包腔内液体的生理作用是（ ）
- 维持心包腔内压力
 - 润滑作用
 - 营养心肌
 - 免疫作用
 - 维持心肌张力
272. 列入乙类传染病，但按甲类传染病管理的是（ ）
- 高致病性禽流感
 - 血吸虫病
 - 肺结核
 - 百日咳
 - 疟疾
273. 下列具有自律性的心肌细胞为（ ）
- 心房肌细胞
 - 心室肌细胞
 - 乳头肌细胞
 - 心内膜细胞
 - 窦房结
274. 肺结核化学治疗原则的描述，错误的是（ ）

- A. 早期使用抗结核药
 - B. 联合使用两种以上药物
 - C. 间断使用抗结核药
 - D. 严格遵照适当的药物剂量
 - E. 坚持完成规定疗程
275. 肺炎患者出现高热，其饮食原则不包括（ ）
- A. 高热量
 - B. 高蛋白
 - C. 高脂肪
 - D. 高维生素
 - E. 多饮水
276. 患者男，50岁。因支气管哮喘发作到某医院急诊就诊，因护士操作不当，快速静脉推注某药后，患者出现头晕、心悸、心律失常、血压剧降，此类药物可能是（ ）
- A. 沙丁胺醇
 - B. 氨茶碱
 - C. 异丙阿托品
 - D. 地塞米松
 - E. 色甘酸钠
277. 患者男，65岁。高血压病史多年。在活动中突发意识障碍，诊断为“脑出血”收入院。查体：一侧瞳孔散大、不等圆，提示患者病情为（ ）
- A. 脑疝形成
 - B. 出血部位靠近眼睛
 - C. 脑干出血
 - D. 动眼神经瘫痪
 - E. 脑出血量较大
278. 患者男，64岁。诊断为“2型糖尿病”10年。为患者进行糖尿病足预防的健康指导中，不妥的是（ ）
- A. 每天检查清洁足部
 - B. 选择透气、柔软的鞋袜
 - C. 每天坚持适度的运动
 - D. 足部出现破损可自擦药物
 - E. 外出不宜穿拖鞋
279. 患者男，30岁，农民。患病毒性心肌炎经治疗康复后出院。出院医嘱要求患者出院后限制活动6个月。患者认为现无不适现象，询问为何不能下地干农活。护士向患者说明此时合理休息的主要原因是（ ）
- A. 减少疲劳感
 - B. 减轻精神压力
 - C. 减少心肌耗氧量
 - D. 恢复体力，增强体质
 - E. 增加战胜疾病的信心
280. 患者女，26岁。尿频、尿急、尿痛8天，以“急性尿路感染”在门诊应用抗生素治疗。进行尿细菌培养检查前。应嘱患者停用抗生素（ ）
- A. 1天
 - B. 2天
 - C. 3天
 - D. 4天
 - E. 5天
281. 狂犬病毒主要存在于病畜的（ ）
- A. 肝脏中
 - B. 肺脏及肝脏中
 - C. 肾脏及肝脏中
 - D. 肺脏及肾脏中
 - E. 脑组织及脊髓中
282. 癫痫持续状态的首选药物是（ ）
- A. 地西洋
 - B. 三唑仑
 - C. 硫喷妥钠
 - D. 巴比妥类
 - E. 水合氯醛
283. 慢性心力衰竭发作最常见的诱因是（ ）
- A. 吸烟
 - B. 情绪激动
 - C. 劳累
 - D. 感染
 - E. 心律失常

284. 患者，男、18岁。淋雨后感冒，1天后出现寒战、高热，痰液为铁锈色，诊断为肺炎链球菌肺炎，体温持续在38.0～39.5℃，患者的热型呈（ ）
- 弛张热
 - 间歇热
 - 回归热
 - 稽留热
 - 波状热
285. 患者男，70岁。冠心病史15年。活动后出现心前区压榨性疼痛2小时。首选的治疗措施是（ ）
- 口服安体舒通
 - 嚼服达喜
 - 肌内注射度冷丁
 - 舌下含服硝酸甘油
 - 口服扑尔敏
286. 患者，女，56岁。稳定型心绞痛病史，今与邻居争吵时突然发生心前区压榨样疼痛，自行舌下含服硝酸甘油作用是（ ）
- 增强心肌收缩力
 - 增加心脏做功
 - 增加外周血管阻力
 - 扩张外周血管
 - 扩张静脉系统
287. 对急性心肌梗死急性期患者的护理措施，正确的是（ ）
- 高热量、高蛋白质饮食
 - 低流量持续吸氧
 - 协助患者如厕
 - 预防便秘
 - 指导患者尽早下地运动
288. 提示慢性支气管炎发展为慢性阻塞性肺疾病的突出症状是（ ）
- 进行性加剧的反复咳嗽
 - 逐渐加重的呼吸困难
 - 发热
 - 反复感染、咳大量脓痰
 - 咯血
289. 老年人在做健身体操时突发心绞痛，立即含硝酸甘油2片(0.6mg)，1min后眼前发黑，恶心，手心发凉。此时应指导其（ ）
- 活动四肢
 - 喝热开水
 - 躺下平卧
 - 再含一片硝酸甘油
 - 站立不动，待自行恢复
290. 患者，男，52岁。肝硬化病史10年。因肝性脑病入院治疗。实验室检查：血钾2.8mmol/L，血钠135mmol/L，血氯100mmol/L，血氨230umol/L，pH7.36。首选的治疗药物是（ ）
- 谷氨酸钠
 - 谷氨酸钾
 - 复合氨基酸
 - 氟马西尼
 - 精氨酸
291. 某急性心肌梗死的患者发病48小时后，要求到厕所大便，责任护士应该（ ）
- 嘱家人陪同前往
 - 用开塞露后，再允许前往
 - 先给予缓泻剂，再允许前往
 - 如无便秘史，应允许前往
 - 制止患者，指导其床上使用便盆
292. 缺铁性贫血患者给予铁剂治疗后，能最早反映其治疗效果的指标是（ ）
- 血清铁
 - 红细胞
 - 血小板
 - 白细胞
 - 网织红细胞
293. 患者，女，75岁。左心衰竭5年。与家人争吵后心悸、气短、不能平卧、咳粉红色泡沫痰。体检：血压90/60mmHg，呼吸28次/分，神志清醒，端坐位，口唇发绀，两肺满布湿啰音及哮鸣音。患者吸氧宜采用的方法是（ ）
- 持续高流量吸氧
 - 间断高流量吸氧

- C. 间断低流量吸氧
D. 低流量乙醇湿化吸氧
E. 高流量乙醇湿化吸氧
294. 因可使多巴在外周神经处转为多巴胺，影响多巴进入脑组织，减少中枢神经系统的正常传导递质，肝性脑病患者禁用的维生素是（ ）
A. 维生素 B
B. 维生素 B2
C. 维生素 C
D. 维生素 B12
E. 维生素 B6
295. 患者，女，70 岁。主因“慢性咳嗽、咳痰 10 年，活动后气促 15 年，双下肢水肿 5 年，加重 20 天”入院，患者下肢水肿应考虑（ ）
A. 肺心病右心衰
B. 低蛋白血症
C. 摄盐过多
D. 合并肾炎
E. 冠心病
296. 患者，女，68 岁。肺心病 15 年，患大叶性肺炎，咳嗽、咳痰 2 周，自服抗生素，未见明显效果。今日感呼吸困难、烦躁，神志恍惚。查体：口唇发绀，颈静脉充盈，两肺底闻及细湿啰音，体温 37.4℃，脉搏 110 次/分，血压 98/68mmHg，双下肢水肿，尿蛋白阳性，大便隐血阳性。患者最可能出现的并发症是（ ）
A. 呼吸衰竭
B. 肾功能衰竭
C. 急性脑出血
D. 急性心力衰竭
E. 上消化道出血
297. 患者，男，60 岁。有高血压病史 30 年，在家做家务活动时突发头晕，随即倒地，急送医院检查，患者呈昏迷状态，左侧肢体偏瘫，CT 高密度阴影。最可能的诊断是（ ）
A. 蛛网膜下腔出血
B. 脑血栓形成
C. 脑栓塞
D. 脑出血
E. 短暂性脑缺血发作
298. 患者，男，36 岁。来门诊进行体检时，用大头针稍微轻戳患者的皮肤，患者即大声喊叫，此感觉障碍的类型为（ ）
A. 感觉减退
B. 感觉倒错
C. 感觉缺失
D. 感觉过敏
E. 感觉异常
299. 患者，男，68 岁。离退休。既往有心绞痛发作史。4 小时前因体育锻炼后出现心前区剧烈疼痛，含服硝酸甘油无效，急诊入院。患者入院后应先做下列哪项检查（ ）
A. 心脏 X 线检查
B. 心电图
C. 心肌酶学检查
D. 血压
E. 超声心动图
300. 患者，男，45 岁。因“感染性心内膜炎”入院治疗。住院期间心脏超声提示巨大赘生物，为预防栓塞，责任护士对该患者进行健康教育，不正确的是（ ）
A. 卧床休息，适当活动
B. 突发胸痛、气急，考虑肺栓塞的可能
C. 出现肢体突然剧烈痛，考虑外周动脉栓塞的可能
D. 出现腰痛、血尿，考虑肾栓塞的可能
E. 出现失语、吞咽困难等提示脑血管栓塞
301. 患者，男，39 岁。有慢性风湿性心脏病病史。近日轻度活动即感心悸、气促。经护理评估，此患者心功能分级为（ ）
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
E. 不能确定
302. 患者，女，68 岁。因“晕厥 1 次”入院。心电图显示心率：38 次/分，P 波与 QRS 波各自独立，互不关心，心房率快，QRS 形态时限正常，R-R 间期相等。患者最有可能的诊断是（ ）
A. 完全性房室传导阻滞

- B. 三度房室传导阻滞
 - C. 一度房室传导阻滞
 - D. 二度Ⅱ型房室传导阻滞
 - E. 二度Ⅰ型房室传导阻滞
303. 关于肝硬化患者的健康教育的叙述，不正确的是（ ）
- A. 合理安排休息
 - B. 说明防治肝炎的重要性
 - C. 缓解期应定期复诊
 - D. 坚持使用保肝药物
 - E. 保证充足睡眠
304. 患者女，50岁。最近血压波动在（160~170）/（90~95）mmHg，诊断为高血压，属于（ ）
- A. 舒张期高血压
 - B. 收缩期高血压
 - C. 一级高血压
 - D. 二级高血压
 - E. 三级高血压
305. 心肌梗死最常见的部位是（ ）
- A. 右心房
 - B. 左心室正后壁
 - C. 左心室前壁
 - D. 右心室侧壁
 - E. 左心房

（306~307 题共用题干）

患者，男，23岁。支气管扩张8年。近日因上呼吸道感染咳嗽剧烈，有大量黄色脓痰。

306. 胸部X线显示病变位于右肺下叶，体位引流时护士应指导患者采取（ ）
- A. 左侧卧位，头高脚低
 - B. 左侧卧位，头低脚高
 - C. 右侧卧位，头高脚低
 - D. 右侧卧位，头低脚高
 - E. 半坐卧位

307. 导致本疾病的可能因素是幼年时患过（ ）

- A. 百日咳
- B. 猩红热
- C. 水痘
- D. 腮腺炎
- E. 风疹

（308~310 题共用题干）

患者，男，55岁。肝硬化病史5年，今日饮酒后突然大量呕血，伴神志恍惚，四肢湿冷，血压下降，医嘱予以输血，补液。

308. 该患者发生大量呕血最可能的原因是（ ）

- A. 胃溃疡累及血管
- B. 食管—胃底静脉曲张
- C. 门脉高压导致胃瘀血
- D. 肝瘀血所致
- E. 胃穿孔所致

309. 此时，该患者应警惕的最严重的并发症是（ ）

- A. 感染
- B. 便血
- C. 肝性脑病
- D. 黄疸
- E. 腹水

310. 该患者输血的目的不包括（ ）

- A. 补充血容量
- B. 改善休克症状
- C. 预防肝性脑病
- D. 补充凝血因子
- E. 改善微循环

311. 原发性肝癌患者最常见和最主要的症状是（ ）

- A. 肝区疼痛
- B. 低热
- C. 腹胀、乏力
- D. 食欲不振
- E. 消瘦

312. 为缓解疼痛，急性胰腺炎患者可采取的体位是（ ）
- 仰卧位
 - 俯卧位
 - 弯腰屈膝侧卧位
 - 半坐卧位
 - 仰卧屈膝位
313. 消化性溃疡特征性的临床表现是（ ）
- 黄疸
 - 食欲下降
 - 恶心、呕吐
 - 反酸、嗝气
 - 节律性和周期性上腹痛
314. 患者女，19岁，急性白血病。实验室检查：白细胞 $43 \times 10^9/L$ ，红细胞 $2.7 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $67g/L$ ，血小板 $10 \times 10^9/L$ 。此时，应着重观察患者的（ ）
- 活动耐力
 - 尿量
 - 营养状况
 - 月经周期
 - 颅内出血征兆
315. 患者男，70岁。冠心病史15年。活动后出现心前区压榨性疼痛2小时。首选的治疗措施是（ ）
- 口服安体舒通
 - 嚼服达喜
 - 肌内注射度冷丁
 - 舌下含服硝酸甘油
 - 口服扑尔敏
316. 患者男，65岁。因慢性肺源性心脏病合并肺炎、右心衰竭住院治疗。护士核对医嘱时，应提出质疑的是（ ）
- 一级护理
 - 持续吸氧 $6L/min$
 - 头孢美唑钠 $2.0g + 5\%$ 葡萄糖 $100ml$ ，ivgtt，q12h
 - 沐舒坦 $30mg + 0.9\%$ 氯化钠 $100ml$ ，ivgtt，tid
 - 氢氯噻嗪 $25mg$ ，po，bid
317. 急性脱髓鞘性多发性神经炎对患者生命威胁最大的症状是（ ）
- 运动障碍
 - 感觉障碍
 - 脑神经麻痹
 - 呼吸肌麻痹
 - 自主神经功能障碍
318. 护士为使用呼吸机的患者吸痰，发现痰液粘稠不易吸出，错误的处理措施是（ ）
- 叩拍胸背部
 - 增加负压吸引
 - 滴入化痰药物
 - 滴入生理盐水
 - 雾化吸入
319. 右心衰竭患者的特征性体征是（ ）
- 水肿
 - 肝大和压痛
 - 肝颈静脉反流征阳性
 - 肺动脉瓣区第二心音亢进
 - 双肺可闻及哮鸣音
320. 肥厚型心肌病患者猝死的先兆症状是（ ）
- 心悸
 - 晕厥
 - 心前区疼痛
 - 全身乏力
 - 呼吸困难
321. 类风湿关节炎活动期最常见的临床表现是（ ）
- 晨僵
 - 指关节畸形
 - 肘侧皮肤出现浅表结节
 - 下肢皮肤有大片出血点
 - 贫血
322. 患者男，37岁。因感染休克入院。护士在观察病情时，下列哪项症状提示其发生急性呼吸窘迫综合征

的可能 ()

- A. 呼吸音减弱
- B. 肺部湿啰音
- C. 躁动不安
- D. 动脉氧分压下降
- E. 呼吸困难迅速加重

323. 某急性心肌梗死的患者发病 48 小时后, 要求到厕所大便, 责任护士应该 ()

- A. 嘱家人陪同前往
- B. 用开塞露后, 再允许前往
- C. 先给予缓泻剂, 再允许前往
- D. 如无便秘史, 应允许前往
- E. 制止患者, 指导其床上使用便盆

324. 肺炎球菌肺炎患者的典型临床症状不包括 ()

- A. 寒战、高热
- B. 咳嗽
- C. 咳铁锈色痰
- D. 胸痛
- E. 腹胀

325. 患者男, 56 岁, 白血病。在应用化疗药辅助治疗时, 注射部位刺痛、水肿, 并出现条索状红线。正确的处理措施是 ()

- A. 局部热敷
- B. 局部按摩
- C. 加快注射速度
- D. 减慢注射速度
- E. 立即给予抗生素

326. 患者男, 68 岁。高血压病史 10 年。2 小时前看电视时突然跌倒在地、神志不清, 急诊入院。查体: 浅昏迷; BP150/100mmHg, P64 次/分。头颅 CT: 左侧基底节区高密度影。患者最可能发生了 ()

- A. 脑肿瘤
- B. 高血压脑病
- C. 脑脓肿
- D. 脑出血
- E. 脑梗死

327. 关于肝性脑病患者饮食护理的叙述, 正确的是 ()

- A. 每日总热量以脂肪为主
- B. 血氨偏高者限制蛋白质摄入
- C. 病情好转后主要选择动物蛋白
- D. 应控制饮食中维生素 C 的摄入
- E. 每日饮水量不少于 2000ml

328. 患者男。因癫痫入院治疗好转后出院。哪项陈述提示患者对疾病认知不足, 需要进一步进行健康指导 ()

- A. “在家休息的时候, 我会安排家人时刻照顾。”
- B. “可以参加集体活动, 像春游等等。”
- C. “我会注意不要受外伤。”
- D. “我要适当锻炼, 多跑步、游泳。”
- E. “我要时刻关注病情。”

(329~330 题共用题干)

患者女, 56 岁。支气管哮喘 10 年。因受凉后憋喘加重, 呼吸困难, 夜间不能平卧, 自行吸入 β_2 受体激动剂效果不佳, 患者缓和紧张不已。血气分析: PaO_2 70mmHg。

329. 患者目前哮喘程度为 ()

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 危重
- E. 极危重

330. 正确的处理措施是 ()

- A. 给予镇静药
- B. 给予支气管舒张药
- C. 低流量吸氧
- D. 给予抗生素
- E. 静脉使用糖皮质激素

331. 慢性呼吸衰竭患者最早、最突出的临床表现是 ()

- A. 发绀
- B. 发热
- C. 咳嗽

- D. 神经精神症状
E. 呼吸困难
332. 护士指导患者体位引流的方法，其拍背的顺序应是（ ）
A. 由下向上、由外向内
B. 由上向下、由外向内
C. 由下向上、由内向外
D. 由下向上、由左向右
E. 由上向下、由右向左
333. 急性心肌梗死患者发病后 24 小时内的主要的死亡原因是（ ）
A. 心脏破裂
B. 心律失常
C. 心力衰竭
D. 心源性休克
E. 室壁瘤
334. 患者女，50 岁。最近血压波动在（160~170）/（90~95）mmHg，诊断为高血压，属于（ ）
A. 舒张期高血压
B. 收缩期高血压
C. 一级高血压
D. 二级高血压
E. 三级高血压
335. 风心病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是（ ）
A. 室性期前收缩
B. 心房颤动
C. 阵发性室上速
D. 窦房传导阻滞
E. 房室传导阻滞
336. 关于消化性溃疡患者用药的叙述，不正确的是（ ）
A. 氢氧化铝凝胶应在餐后一小时服用
B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
D. 奥美拉唑可引起头晕，用药时不可开车
E. 甲硝唑应在餐前半小时服用
337. 患者男，45 岁。慢性肾衰竭尿毒症期。因酸中毒给予 5%碳酸氢钠 250ml 静滴后出现手足抽搐，最可能的原因是发生了（ ）
A. 低血钾
B. 低血钙
C. 高钠血症
D. 碱中毒
E. 脑出血
338. 尿毒症晚期患者的呼气中可能是（ ）
A. 尿味
B. 樱桃味
C. 大蒜味
D. 甜味
E. 烂苹果味
339. 患者男，42 岁。码头搬运工人。安装永久性起搏器 10 天后出院。正确的出院指导是（ ）
A. 可以回复正常生活
B. 可以行磁共振检查
C. 学会每天自测脉搏
D. 术侧上肢只能下垂，不能抬起
E. 1 年内无心律失常可取出永久起搏器
340. 患者女，41 岁。患有肥厚型心肌病，因胸痛 1 小时急诊入院。首要的护理措施是（ ）
A. 绝对卧床休息
B. 给予 1~2L/min 吸氧
C. 给予高热量饮食
D. 建立静脉通道
E. 预防呼吸道感染
341. 患者女，60 岁。吸烟史 13 年，每日一包，脑出血，经治疗后病情稳定，拟出院，错误的出院指导是（ ）
A. 避免情绪激动
B. 低盐低胆固醇饮食
C. 戒烟
D. 绝对卧床休息
E. 保证充足睡眠

342. 肾病综合征患者最突出的体征是 ()
- 高血压
 - 水肿
 - 肾区叩击痛
 - 嗜睡
 - 昏迷
343. 患者女, 45 岁, 消化性溃疡。近来感上腹饱胀, 疼痛于餐后加重。且反复大量呕吐。该患者可能出现了 ()
- 出血
 - 穿孔
 - 癌变
 - 幽门梗阻
 - 营养不良
344. 我国目前最常见的缩窄性心包炎的病因是 ()
- 风湿性
 - 化脓性
 - 结核性
 - 真菌性
 - 创伤性
345. 患者男, 62 岁。高血压 10 年。夜间睡眠中突然憋醒, 大汗淋漓, 被迫坐起。喘息, 咳粉红色泡沫痰。双肺闻及广泛哮鸣音。给予乙醇湿化吸氧。采用乙醇湿化吸氧的目的是 ()
- 湿化气道
 - 净化气道
 - 降低通气阻力
 - 降低肺泡表面张力
 - 降低肺泡内泡沫的表面张力
346. 急慢性胃炎患者有少量出血时, 为中和胃酸可给予 ()
- 米汤
 - 肉汤
 - 绿色蔬菜
 - 温开水
 - 凉开水
- (347~350 题共用题干)
- 患者女, 33 岁, 干咳伴乏力, 低热、夜间盗汗、体重减轻 2 月余。X 线胸片: 右上肺阴影。疑诊肺结核收住入院
347. 为明确诊断应进行的检查是 ()
- 结核菌素试验
 - 痰结核菌检查
 - 呼吸功能检查
 - 腹部 B 超
 - 纤维支气管镜检查
348. 经检查确诊为肺结核, 拟行异烟肼、利福平和吡嗪酰胺化疗。利福平的药物副作用是可引起 ()
- 周围神经炎
 - 听力障碍
 - 球后视神经炎
 - 胃肠道反应
 - 肝损害
349. 应采取的隔离措施是 ()
- 消化的隔离
 - 呼吸道隔离
 - 保护性隔离
 - 接触隔离
 - 床边隔离
350. 在治疗过程中, 患者突然大量咯血, 应采取的体位是 ()
- 右侧卧位
 - 左侧卧位
 - 俯卧位
 - 仰卧位
 - 坐位
351. 患者女, 45 岁。因餐后腹痛住院, 拟诊为急性水肿型胰腺炎行保守治疗。护士告知患者行胃肠减压的主要目的是 ()
- 减轻腹胀
 - 防止恶心、呕吐

- C. 减少胰液分泌
D. 预防感染
E. 防止胰液逆流
352. 肺结核患者在家休养治疗期间，最简便有效的处理痰液的方法是（ ）
A. 煮沸
B. 深埋
C. 焚烧
D. 70%乙醇浸泡
E. 5%苯酚消毒
353. 肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是（ ）
A. 混合型
B. 胆管细胞型
C. 肝细胞型
D. 结节型
E. 弥漫型
354. 属于甲类传染病的疾病是（ ）
A. 传染性非典型肺炎
B. 猩红热
C. 肺结核
D. 霍乱
E. 伤寒
355. 关于硝普钠的主要药理作用，正确的叙述的是（ ）
A. 利尿
B. 减慢心率
C. 心输出量增加
D. 增强心肌收缩力
E. 扩张动、静脉减轻心脏负荷
356. 频发早搏的心律失常患者，不可饮用浓茶的目的主要是避免（ ）
A. 影响铁的摄入
B. 过多液体的摄入
C. 过多咖啡因的摄入
D. 过多 K⁺的摄入
E. 过多 Ca²⁺的摄入
357. HIV 感染后对免疫系统造成损害，主要的机理是损害哪类细胞（ ）
A. 中性粒细胞
B. B 淋巴细胞
C. CD4⁺T 淋巴细胞
D. CD8⁺T 淋巴细胞
E. 自然杀伤(NK)细胞
358. 患者女，30 岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄 10 年。近 1 个月常于夜间憋醒，呼吸深快，伴有哮鸣音，端坐后可稍缓解，对夜间易发生喘憋的机制，正确的叙述是（ ）
A. 平卧回心血量增加
B. 膈肌抬高/下降
C. 交感神经张力增加
D. 小支气管舒张
E. 全身小动脉痉挛
359. 患者男，70 岁。患肺结核 20 年，近年来病情反复，经常咯血，表现为烦躁、焦虑。护士在护理的过程中，应注意的是（ ）
A. 采取严密隔离
B. 讲解疾病知识，给予鼓励和帮助
C. 采取健侧卧位
D. 患者咯血时可进温软饮食
E. 高流量高浓度吸氧
360. 急性胰腺炎患者应慎用的药物是（ ）
A. 钙剂
B. 奥曲肽
C. 吗啡
D. 生长抑素
E. 洛赛克
361. 患者女，26 岁。系统性红斑狼疮患者，用药治疗过程中出现胃溃疡发作，考虑与哪种药物的不良反应有关（ ）
A. 环磷酰胺
B. 羟氯喹

- C. 泼尼松
D. 雷公藤总苷
E. 免疫球蛋白
362. 患者男，70岁。高血压病史20年，糖尿病病史15年。平时血压控制在160~170/100~105mmHg之间。该患者的高血压危险度分层属于（ ）
A. 无危险组
B. 低度危险组
C. 中度危险组
D. 高度危险组
E. 极高度危险组
363. 患者男，63岁，慢性胃炎，幽门螺杆菌(+)，需要采用抗菌药物治疗，其用药原则是（ ）
A. 剂量宜大
B. 宜静脉给药
C. 联合用药
D. 宜长期使用
E. 药物种类不受限制
364. 患者男，67岁。因冠心病入院。在静脉输液中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰。该患者发生了（ ）
A. 发热反应
B. 急性肺水肿
C. 静脉炎
D. 空气栓塞
E. 过敏反应
365. 患者男，31岁因梗阻性肥厚型心肌病入院治疗。患者常有胸痛症状出，护士需告知其避免胸痛的诱因，其中不包括（ ）
A. 突然屏气
B. 持举重物
C. 情绪激动
D. 饱餐
E. 长时间卧床
366. 患者女，40岁。近1个月来自觉疲乏，无力，头晕，医嘱硫酸亚铁溶液口服，为减少不良反应正确的给药指导是（ ）
A. 饭前服用
B. 直接喝取
C. 茶水送服
D. 牛奶送服
E. 服药后及时漱口
367. 患者男、75岁，患慢性阻塞性肺疾病30余年，现处于疾病稳定期。在为其制定肺功能康复计划时，应是（ ）
A. 护士单独制定，强制患者执行
B. 护士单独制定，指导患者执行
C. 患者自行制定并执行
D. 患者自行制定，有护士指导执行
E. 护士与患者共同制定，护士指导患者执行
368. 护士为甲亢患者进行服用甲基硫氧嘧啶的用药指导，用药后1~2个月需要观察的主要作用是（ ）
A. 静脉炎
B. 粒细胞减少
C. 肾功能损害
D. 胃肠道不适
E. 听神经损伤
369. 患者男，28岁，酗酒后突发剧烈上腹绞痛10h伴呕吐、冷汗、面色苍白入院，查体：T39.1℃，p110次/分，BP83/60mmHg。腹上区压痛及反跳痛阳性，腹肌紧张，Grey-Turner征阳性。实验室检查：血清淀粉酶升高，血钙降低，下面最可能的诊断是（ ）
A. 急性水肿型胰腺炎
B. 出血坏死型胰腺炎
C. 急性胃穿孔
D. 胃溃疡
E. 胆石症
370. 某病毒性心肌炎患者出院时，护士指导其限制重体力活动，预防病毒的重复感染，其目的是限制哪种疾病的发生（ ）
A. 风湿性心瓣膜病
B. 二尖瓣脱垂
C. 肥厚型心肌病

- D. 扩张型心肌病
 - E. 限制型心肌病
371. 表示肺癌已有全身转移的表现是 ()
- A. 痰中带血
 - B. 持续性胸痛
 - C. 股骨局部破坏
 - D. 间歇性高热
 - E. 持续性胸水
372. 肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是 ()
- A. 电解质紊乱
 - B. 肝性脑病
 - C. 原发性肝癌
 - D. 肝肾综合征
 - E. 上消化道出血
373. 为减少支气管扩张患者肺部继发感染和全身中毒症状, 最关键的措施是 ()
- A. 加强痰液引流
 - B. 选择广谱抗生素
 - C. 使用呼吸兴奋剂
 - D. 使用支气管扩张剂
 - E. 注射流感疫苗
374. 急性上呼吸道感染最常见的病原体是 ()
- A. 细菌
 - B. 病毒
 - C. 支原体
 - D. 衣原体
 - E. 幽门螺杆菌
375. 通过利尿作用达到降压效果的药物是 ()
- A. 氯沙坦
 - B. 硝苯地平
 - C. 普萘洛尔
 - D. 氢氯噻嗪
 - E. 卡托普利

(376~377 题共用题干)

患者男, 65 岁。支气管扩张。今日劳作后出现恶心、胸闷, 反复咳血, 24 小时出血量约 800ml。

376. 该患者的咯血程度属于 ()

- A. 痰中带血丝
- B. 微小量咯血
- C. 小量咯血
- D. 中等量咯血
- E. 大量咯血

377. 目前患者饮食应 ()

- A. 禁食
- B. 流质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 软质饮食
- E. 普食

(378~380 题共用题干)

患者女, 56 岁。支气管哮喘 10 年。因受凉后憋喘加重, 呼吸困难, 夜间不能平卧, 自行吸入 β_2 受体激动剂效果不佳, 患者紧张不已。血气分析: PaO_2 70mmHg。患者可能出现了 ()

378. 患者可能出现了 ()

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 心源性呼吸困难
- E. 神经精神性呼吸困难

379. 患者目前哮喘程度为 ()

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 危重
- E. 极危重

380. 正确的处理措施是 ()

- A. 给予镇静药

- B. 给予支气管舒张药
 - C. 低流量吸氧
 - D. 给予抗生素
 - E. 静脉使用糖皮质激素
381. 心室颤动患者的脉搏特征是 ()
- A. 快而规则
 - B. 慢而规则
 - C. 快而不规则
 - D. 慢而不规则
 - E. 摸不到
382. 患者男, 41 岁。近期出现头晕, 乏力, 连续三天血压 140~150/90~96mmHg。患者的血压属于 ()
- A. 正常值
 - B. 正常高值
 - C. 一级高血压
 - D. 二级高血压
 - E. 三级高血压
383. 患者男, 65 岁。因“呼吸衰竭”入院, 住院期间应用呼吸兴奋剂。患者出现了何种情况时提示药物过量 ()
- A. 烦躁不安
 - B. 面色苍白
 - C. 呼吸深快
 - D. 四肢湿冷
 - E. 高热不退
384. 患者男, 70 岁。慢性阻塞性肺疾病。出院后拟进行长期家庭氧疗。护士应告知患者每日吸氧的时间不少于 ()
- A. 5 小时
 - B. 8 小时
 - C. 10 小时
 - D. 12 小时
 - E. 15 小时
385. 肺炎患者出现高热, 其饮食原则不包括 ()
- A. 高热量
 - B. 高蛋白
 - C. 高脂肪
 - D. 高维生素
 - E. 多饮水
386. 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是 ()
- A. 呼吸困难加重, 夜间更甚
 - B. 疲倦乏力, 头晕心悸
 - C. 贫血
 - D. 多食多饮
 - E. 多尿
387. 患者女, 80 岁。慢性阻塞性肺疾病 20 余年。今因“咳嗽, 咳痰加重”住院。夜间因烦躁难以入眠, 自服地西洋 5mg 后入睡, 晨起呼之不应, 呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是 ()
- A. 地西洋的镇静作用
 - B. 地西洋过敏
 - C. 地西洋抑制呼吸中枢
 - D. 地西洋中毒
 - E. 地西洋的镇咳作用
388. 患者女, 65 岁, 慢性阻塞性肺疾病病史。近年来多次在冬季发生肺炎。为减少患病几率, 可以嘱患者在易发病季节 ()
- A. 注射免疫球蛋白
 - B. 接种卡介苗
 - C. 接种流感疫苗
 - D. 服用抗生素
 - E. 在家中不要外出
389. 患者女, 70 岁。糖尿病病史 20 余年。诉视物不清, 胸闷憋气, 双腿及足底刺痛, 夜间难以入睡多年, 近来足趾逐渐变黑。护士在接诊后立即对其进行评估, 发现该患者的并发症不包括 ()
- A. 视网膜病变
 - B. 冠心病
 - C. 神经病变
 - D. 肢端坏疽
 - E. 足部感染

390. 患者男，43岁。踢球时突感左臂及胸前区剧痛，有濒死感，就地休息30分钟未缓解，伴烦躁不安、恶心、出冷汗，急送至急诊科。心电监护示多导联ST段弓背状抬高，T波倒置，可见异常深宽Q波。最可能发生了（ ）
- 稳定性心绞痛
 - 急性心包炎
 - 急性心肌梗死
 - 心脏神经官能症
 - 急性主动脉夹层动脉瘤
391. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄发生栓塞最常累及的部位是（ ）
- 脑
 - 肾
 - 肠
 - 肺
 - 肝
392. 患者男，35岁。急性髓系白血病，应用高三尖杉酯碱化疗。静脉滴注该药时的最佳滴数是低于（ ）
- 20滴/分钟
 - 40滴/分钟
 - 50滴/分钟
 - 60滴/分钟
 - 70滴/分钟
393. 某急性白血病患者，因“乏力，食欲减退，消瘦1个月余，伴发热1周”收入院。行化疗后出现恶心，但无呕吐。血常规检查：白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括（ ）
- 潜在的感染
 - 营养失调：低于机体需要量
 - 活动无耐力
 - 舒适的改变：发热、恶心
 - 潜在的颅内出血
394. 患者男，53岁。饮酒时发生言语不清，呕吐，随即昏迷，右侧肢体偏瘫；血压230/120mmHg，诊断为“脑出血”。为防止出血加重，应首先采取的措施是（ ）
- 控制血压
 - 保护性约束
 - 降低颅内压
 - 出血处理
 - 肢体制动
395. 某患者接受冠状动脉造影术后回到病房，医嘱砂袋压迫股动脉穿刺点6小时。为防止局部出血和栓塞护士应重点观察（ ）
- 呼吸
 - 心率
 - 血压
 - 足背动脉搏动
 - 肌力
396. 患者女，26岁。半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排粘液脓便，疑诊溃疡性结肠炎，拟行肠镜检查。门诊护士告知患者应在行肠镜检查的（ ）
- 前4小时可进食
 - 前1天晚餐后禁食
 - 前2天停药铁剂
 - 前2天清洁灌肠
 - 前3天停药阿司匹林类药物
397. 提示左心衰的临床表现是（ ）
- 奇脉
 - 平脉
 - 水冲脉
 - 脉搏短绌
 - 交替脉
398. 采集血气分析标本时，错误的操作是（ ）
- 使用2ml无菌干燥注射器
 - 抽取经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃去
 - 无菌操作下抽取动脉血1ml
 - 将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住
 - 立即送检
399. 患者女，44岁。患心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时，在30分钟内应特别注意的是（ ）
- 尿量
 - 中心静脉压

- C. 血氧饱和度
- D. 心率
- E. 血压

400. 患者女, 48 岁。类风湿关节炎 5 年。双侧腕、指关节肿胀畸形。为保持关节的功能, 正确的做法是 ()

- A. 腕关节背伸、指关节背伸
- B. 腕关节背曲、指关节掌曲
- C. 腕关节掌曲、指关节侧曲
- D. 腕关节掌曲、指关节背伸
- E. 腕关节侧曲、指关节掌曲

401. 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时, 输液速度宜控制在 ()

- A. 10~20 滴/分钟
- B. 20~30 滴/分钟
- C. 30~40 滴/分钟
- D. 40~50 滴/分钟
- E. 50~60 滴/分钟

402. 患者男, 75 岁。因“发热, 反复咳嗽并伴有脓性痰液 2 周”入院, 诊断为急性支气管炎。易加重病情的药物是 ()

- A. 可待因
- B. 必咳平
- C. 复方甘草合剂
- D. 复方氯化铵
- E. 沐舒坦

403. 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是 ()

- A. 空腹服用
- B. 饭前一小时服用
- C. 饭后一小时服用
- D. 餐时服用
- E. 睡前服用

404. 患者男, 45 岁。汽车修理工。间断咳嗽 3 个月, 无痰。近 20 天出现咳嗽加剧, 痰中带血, 无发热, 寒战等症状。查体: T36.7 摄氏度, P78 次/分, R19 次/分, BP110/70mmHg, 浅表未扪及淋巴结。经确诊为肺癌, 给予化疗。输注化疗药前需要建立静脉通道, 首选的液体为 ()

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 5%葡萄糖盐水
- D. 生理盐水
- E. 林格液 (复方氯化钠溶液)

(405~407 题共用题干)

患者男, 48 岁。支气管肺癌。病理组织报告为“鳞状细胞癌”。

405. 按解剖学部位分类, 该癌肿最常见的类型是 ()

- A. 周围型
- B. 混合型
- C. 边缘型
- D. 中央型
- E. 巨块型

406. 患者进行肺癌切除术后, 需要进行化疗。输注化疗药物前与患者沟通, 最重要的注意事项是 ()

- A. 健康教育
- B. 评估血管
- C. 保护血管
- D. 血液检验指标正常
- E. 告知患者, 并要求签署化疗同意书

407. 患者在输注化疗药物过程中, 突然感觉静脉穿刺处疼痛, 紧急处理措施是 ()

- A. 安慰患者
- B. 检查有无回血, 如有回血继续输注
- C. 拔掉液体
- D. 立即停止输液, 做进一步处理
- E. 通知医生

(408~410 题共用题干)

患者女, 30 岁。因“无明显诱因出现乏力伴胸闷, 气急, 活动后症状加重 3 周”就诊。实验室检查: 血红蛋白 77g/L, 红细胞 $61.8 \times 10^9/L$, 血小板 $183 \times 10^9/L$, 异常细胞 88%。为进一步诊治收入血液科病房。

408. 为明确诊断, 需行骨髓穿刺术。护士对患者解释穿刺的注意事项时, 错误的内容是 ()

- A. 目的是帮助明确诊断
- B. 穿刺时需采取膝胸卧位
- C. 穿刺后可能会有酸胀的感觉

- D. 穿刺后 2~3 天内不宜洗澡
E. 可以正常活动, 不影响生活规律
409. 患者被确诊为急性单核细胞白血病, 给予 DAH 方案化疗 (D-柔红霉素、A-阿糖胞苷、H-三尖杉酯碱)。应用化疗药物后护士应重点观察的是 ()
- A. 心脏毒性表现
B. 骨髓抑制表现
C. 注射部位局部表现
D. 膀胱毒性表现
E. 神经毒性表现
410. 患者病情缓解拟于近日出院。护士为其进行健康教育, 告知注意监测血常规指标。血小板开始低于多少时应限制活动 ()
- A. $<300 \times 10^9/L$
B. $<100 \times 10^9/L$
C. $<50 \times 10^9/L$
D. $<20 \times 10^9/L$
E. $<10 \times 10^9/L$
411. 肝硬化腹水患者每日氯化钠的摄入量宜控制在 ()
- A. 1.2~2.0g
B. 2.5~3.0g
C. 3.5~4.0g
D. 4.5~5.0g
E. 5.0~7.5g
412. 对尿路感染患者的健康教育中, 错误的是 ()
- A. 鼓励患者多饮水
B. 长期预防性服用抗生素
C. 及时治疗尿路结石
D. 及时治疗尿路损伤
E. 保持会阴部清洁
413. 患者男, 68 岁。被人搀扶步入医院, 分诊护士见其面色发绀, 口唇呈黑紫色, 呼吸困难, 家属称其“肺心病又发作”。需立即对其进行的处理时 ()
- A. 为患者挂号
B. 不作处理, 等待医生到来
C. 吸氧, 测量血压
D. 叩背
E. 让患者去枕平卧于平车上
414. 患者女, 42 岁。诊断为急性胰腺炎, 经治疗后腹痛、呕吐基本消失, 开始进食时应给予 ()
- A. 普食
B. 低脂低蛋白流质饮食
C. 高脂高蛋白流质饮食
D. 高脂低蛋白流质饮食
E. 低脂高蛋白饮食
415. 心动过缓是指安静状态下成人脉率每分钟少于 ()
- A. 40 次
B. 50 次
C. 60 次
D. 70 次
E. 80 次
416. 患者女, 50 岁。初诊为高血压, 目前学压维持在 145/85mmHg。护士在评估中发现患者洗好下列食物。护士应指出, 其中最不利于控制高血压的食物是 ()
- A. 猪肝
B. 鲫鱼
C. 瘦肉
D. 河虾
E. 竹笋
417. 患者男, 67 岁。因冠心病入院。在静脉输液中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰。该患者发生了 ()
- A. 发热反应
B. 急性肺水肿
C. 静脉炎
D. 空气栓塞
E. 过敏反应

(418~420 题共用题干)

患者男, 50 岁。因“神志不清、行为异常 5 天, 昏迷一天”入院, 既往有肝硬化病史八年。入院查体: 呼

之不应，压眶反射无反应。皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查：血氨 $145 \mu\text{g/dl}$ 。脑电图显示 δ 波每秒三次。诊断为肝硬化、肝性脑病。

418. 该患者肝性脑病目前分期是 ()

- A. 前驱期
- B. 昏迷前期
- C. 嗜睡期
- D. 昏睡期
- E. 昏迷期

419. 患者入院后制定的护理措施不恰当的是 ()

- A. 取仰卧位，头偏向一侧
- B. 鼻饲 25% 葡萄糖供给热量
- C. 如有便秘及时用肥皂水灌肠
- D. 每日入液量以尿量加 1000ml 为标准
- E. 必要时使用约束带

420. 患者经积极治疗后好转，神志清醒，此时适宜的饮食是 ()

- A. 绝对禁食蛋白质饮食
- B. 限制碳水化合物的摄入
- C. 逐步增加蛋白质饮食，以植物蛋白为主
- D. 逐步增加蛋白质饮食，以动物蛋白为主
- E. 增加脂肪的摄入以保证热量的供给

421. 预防肺结核流行的最重要措施是 ()

- A. 加强营养
- B. 接种卡介苗
- C. 加强登记管理
- D. 做好痰的处理
- E. 隔离和有效治疗排痰病人

422. 甲亢病人不宜进食的食物是 ()

- A. 高糖的食物
- B. 高碘的食物
- C. 高钾的食物
- D. 高磷的食物
- E. 高蛋白质的食物

423. 影响肺泡内氧气与血红蛋白结合的最重要因素的是 ()

- A. 血红蛋白量
- B. 肺泡壁完整性
- C. 肺泡内氧浓度
- D. 肺泡间质的厚度
- E. 血液流速

424. 临床治疗心力衰竭时，应用洋地黄的主要目的是 ()

- A. 增强心肌收缩力
- B. 减慢心室率
- C. 调节心肌耗氧量
- D. 抑制心脏传导系统
- E. 提高异位起搏点的自律性

425. 通过利尿作用达到降压效果的药物是 ()

- A. 氯沙坦
- B. 硝苯地平
- C. 普萘洛尔
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡托普利

426. 患者，男，40岁。2个月来经常感觉上腹部隐痛，去医院检查为消化性溃疡。请问与消化性溃疡发生关系密切的细菌是 ()

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

427. 在正常情况下，呼吸中枢发出呼吸冲动，依赖于血液中哪种物质浓度变化的刺激 ()

- A. 二氧化碳
- B. 氧
- C. 一氧化氮
- D. 碳酸氢根
- E. 酸碱度

428. 患者男, 22 岁。无明显诱因出现双下肢水肿 2 周, 尿蛋白 (++++), 测血压 142/86mmHg。导致其水肿最主要的因素是 ()

- A. 肾小球滤过率下降
- B. 血浆胶体渗透压下降
- C. 继发性醛固酮增多
- D. 抗利尿激素增多
- E. 有效滤过压降低

429. 患者在查体重发现血清抗-HIV 阳性, 护士在对其进行健康教育指导时, 不正确的是 ()

- A. 排泄物用漂白粉消毒
- B. 严禁献血
- C. 性生活应使用避孕套
- D. 不能和他人共用牙刷
- E. 外出时应戴口罩

430. 患者男, 50 岁。患肝硬化入院。自诉“皮肤瘙痒, 睡觉的时候会吧皮肤挠破”。皮肤瘙痒的原因可能是 ()

- A. 叶酸缺乏
- B. 凝血时间延长
- C. 胆红素水平提高
- D. 高钾血症
- E. 低蛋白血症

431. 某患者患慢性支气管炎 30 余年, 慢性阻塞性肺疾病 10 余年, 当该患者在稳定时可指导其在家中长期家庭氧疗, 护士健康教育时, 应告诉患者不属于治疗有效表现的是 ()

- A. 心率减慢
- B. 发绀减轻
- C. 呼吸频率减慢
- D. 血压下降
- E. 活动耐力增加

(432-434 题共用题干)

患者, 男性, 56 岁, 患支气管扩张 10 余年。近半月咳嗽、咳痰加重, 今晨因突发咯血急诊收治入院, 测血压 85/60mmHg。

432. 经评估, 患者日咯血量约为 750ml。根据咯血量, 患者的咯血属于 ()

- A. 痰中带血
- B. 少量咯血
- C. 严重咯血答案
- D. 中等量咯血
- E. 大量咯血

433. 患者出现窒息征象, 应立即采取的体位是 ()

- A. 平卧位
- B. 端坐位
- C. 半卧位
- D. 头低脚高俯卧位, 头面向一侧
- E. 患侧卧位

434. 此时适宜患者的饮食护理为 ()

- A. 禁食
- B. 少量温、凉流质饮食
- C. 易消化、富含纤维素饮食
- D. 高热量、高蛋白饮食
- E. 清淡饮食

435. 患者女, 68 岁, 诊断为慢性阻塞性肺炎。为防止患者发生 II 型呼吸衰竭, 应指导患者特别注意 ()

- A. 定期检查肺功能
- B. 长期家庭氧疗
- C. 避免肺部感染
- D. 进行腹式呼吸或缩唇呼吸训练等
- E. 合理安排工作和生活

436. 患者, 女性, 72 岁。风心病二尖瓣狭窄伴有心房颤动 6 年, 无明显原因突然出现意识障碍, 最可能的直接原因是 ()

- A. 左心房血栓脱落
- B. 发生室颤
- C. 脑出血
- D. 心排出量减少, 脑供血不足
- E. 右心房血栓脱落

437. 患者, 男, 58 岁, 吸烟 30 余年, 工作压力大, 长期精神紧张。近日自觉头痛、头晕, 门诊就诊, 测血压 170/105mmHg, 其心血管风险水平为 ()

- A. 低危
B. 中危
C. 高危
D. 很高危
E. 极高危
438. 患者，女，25岁。近3天来感觉胸闷、心悸，入院检查诊断为病毒性心肌炎。请问病毒性心肌炎最常见的致病体是（ ）
A. 流感病毒
B. 金黄色葡萄球菌
C. 原虫
D. 柯萨奇B病毒
E. 脊髓灰质炎病毒
439. 患者，男性，27岁，自诉生活压力大，来院诊断为十二指肠溃疡。以下对十二指肠溃疡描述正确的是（ ）
A. 常见于十二指肠上部
B. 多见于中老年人群
C. 易发生癌变
D. 胃酸分泌减少
E. 表现为空腹痛
440. 患者，男性，55岁。肝炎后肝硬化3年，摄入蔬果较少，近一周来排便困难。今日家属发现其表情淡漠，吐字不清，有双手扑翼样震颤，初步诊断为肝性脑病。其发病诱因为（ ）
A. 上消化道出血
B. 高蛋白饮食
C. 感染
D. 便秘
E. 低血糖
441. 患者，男性，33岁。主诉有腰痛、肾区不适感，血常规白细胞计数增多，尿蛋白“++~+++”，管型“+”，最大可能诊断为（ ）
A. 急性肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 急性肾盂肾炎
D. 输尿管结石
E. 肾结核
442. 患儿男，4岁，入院时诊断为肾病综合征。查体患儿面部、腹壁及双下肢明显水肿。实验室检查：血清胆固醇升高，尿蛋白（++++）。根据该患儿的情况，最主要的护理诊断为（ ）
A. 营养失调：低于机体需要量
B. 体液过多
C. 有感染的可能
D. 活动无耐力
E. 有皮肤完整性受损的危险
443. 患者女，17岁，患急性早幼粒细胞性白血病。实验室检查：白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，红细胞 $2.7 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $85g/L$ ，血小板 $10 \times 10^9/L$ 。此时，应着重观察患者的（ ）
A. 活动耐力
B. 月经周期
C. 营养状况
D. 尿量
E. 颅内出血征兆
444. 杨先生，28岁，因严重挤压伤入院，住院后病情进行性恶化，第2日出现神志不清。血压 $82/60mmHg$ ，24小时尿量约 $500ml$ ，护士采集血标本时，发现血液黏稠易凝固。该患者可能并发（ ）
A. 弥散性血管内凝血
B. 感染性休克
C. 心功能不全
D. 急性肾衰竭
E. 败血症
445. 患者，女性，55岁。糖尿病病史8年，长期使用注射胰岛素治疗。某日凌晨突然感到饥饿难忍、全身无力、心慌、出虚汗，继而神志恍惚。护士应首先考虑该患者发生了（ ）
A. 胰岛素过敏
B. 低血糖反应
C. 血容量不足
D. 酮症酸中毒
E. 高渗性昏迷先兆
446. 患者，女性，25岁。甲亢半年，遵医嘱服用甲硫氧嘧啶治疗。此药的作用机制是（ ）
A. 减低外周组织对甲状腺激素反应

- B. 使甲状腺激素分泌降低
- C. 抑制抗原抗体反应
- D. 抑制甲状腺激素释放
- E. 抑制甲状腺激素合成

447. 患者，女性，26岁，近来疲倦、乏力，因“全身关节肿痛伴发热3周”入院。查体：鼻梁和双颧颊部呈蝶形分布的红斑，免疫学检查显示补体低下，尿蛋白(++)。目前治疗本病的首选药物是()

- A. 抗疟药
- B. 非甾体类抗炎药
- C. 糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 强效广谱抗生素

448. 患者，男性，36岁，既往有静脉吸毒史。因发热、咳嗽，伴间歇腹泻、食欲减退及明显消瘦就诊，查血清抗-HIV(+)。诊断为艾滋病进行治疗，能了解感染者机体免疫状况和病情进展，确定疾病分期和治疗时机，判断治疗效果和临床合并症的检查项目是()

- A. CD4+ T淋巴细胞绝对数量
- B. 血清抗-HIV检测
- C. 淋巴结活检
- D. 血培养
- E. 骨髓检查

449. 患者，女性，65岁。主诉四肢远端呈手套、袜套样感觉减退，诊断为多发性周围神经病。该患者的感觉障碍属于()

- A. 部分性感觉障碍
- B. 分离性感觉障碍
- C. 交叉性感觉障碍
- D. 末梢型感觉障碍
- E. 完全性感觉障碍

450. 患者，男性，53岁，因突发左侧肢体活动不利来院就诊，以“脑出血”收入院。今晨护士进行肌力评估时其左侧肢体能在床面移动，但无力抬起。按肌力分级，该患者的肌力属于()

- A. 1级
- B. 2级
- C. 3级
- D. 4级
- E. 5级

451. 患者，男性，23岁。头后部遭受钝性打击，受伤后意识模糊约20分钟，头痛，恶心，呕吐，追问受伤经过不能记忆，查体无异常倾向。可能的诊断为()

- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 颅骨骨折
- D. 硬脑膜外血肿
- E. 颅内血肿

452. 患者，男性，35岁。上腹部疼痛间歇性发作3年，多出现在夜间，进食后可缓解。近3天反复呕吐，呕吐大量呈酸腐味的宿食，呕吐后疼痛缓解。此患者最可能的诊断是()

- A. 胃癌
- B. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- C. 胃溃疡伴幽门梗阻
- D. 慢性胃炎
- E. 急性胃炎

453. 患者，女性，65岁。因尿毒症收治入院，Hb60g/L，可能与肾脏内分泌功能障碍有关的临床表现是()

- A. 胃肠道症状
- B. 神经症状
- C. 贫血
- D. 氮质血症
- E. 代谢性酸中毒

(454-456题共用题干)

患者，女性，40岁。因活动后有呼吸困难，近半年进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶哑来院就诊。患者既往有风湿热12年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为慢性风湿性心瓣膜病。

454. 慢性风湿性心脏瓣膜病最常受累的瓣膜是()

- A. 二尖瓣
- B. 三尖瓣
- C. 肺动脉瓣
- D. 主动脉瓣
- E. 静脉瓣

455. 二尖瓣狭窄最早出现的症状是()

- A. 水肿
- B. 咳嗽
- C. 咯血
- D. 端坐呼吸
- E. 劳力性呼吸困难

二、外科护理

单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1. 患者，男，35 岁，右腿自感疼痛、酸胀，足底有块状感，初步判断为血栓闭塞性脉管炎，可确诊该病的辅助检查为（ ）
 - A. X 线
 - B. 检查肢体动脉搏动状况
 - C. 交感神经检查
 - D. 肢体抬高试验
 - E. 动脉造影检查
2. 患者，女，40 岁，自感左腿皮肤发凉、行走麻木，遂至医院就诊，经检查后确诊为血栓闭塞性脉管炎局部缺血期，该阶段患者的表现是（ ）
 - A. 皮肤发红
 - B. 指甲变形
 - C. 脱皮
 - D. 患肢动脉搏动减弱
 - E. 坏疽
3. 患者，男，52 岁，因血栓性脉管炎收治入院。医生嘱咐其如未进行规范的运动，将有截肢的危险。患者遂夜寐难安，无故发怒，与家人吵架。护士对患者进行心理护理，以减轻患者（ ）的负性情绪。
 - A. 恐惧
 - B. 兴奋
 - C. 孤独
 - D. 焦虑
 - E. 猜疑
4. 患者，男，35 岁，因下肢静脉曲张发病 1 月余未改善，再次来院就诊，护士告知其应正确使用弹力袜，以下穿弹力袜的最佳时间为（ ）
 - A. 感到患肢胀痛时
 - B. 上班开始工作时
 - C. 清晨起床前
 - D. 准备下班时
 - E. 晚上睡觉前
5. 患者，男，68 岁，喜卧，近日出现右侧小腿疼痛、肿胀、苍白。护士怀疑其发生了深静脉血栓，并告知家属禁止按摩患肢，其目的是（ ）
 - A. 预防静脉出血
 - B. 促进静脉回流
 - C. 缓解肢体疼痛
 - D. 减轻肢体水肿
 - E. 防止栓子脱落
6. 患者，女，58 岁，右小腿血管扭曲并隆起于皮肤，久站久坐时自感下肢沉重、酸胀，皮肤无破溃，Trendelenburg 试验阳性。目前该患者的主要护理问题是（ ）
 - A. 知识缺乏
 - B. 活动无耐力
 - C. 恐惧
 - D. 营养失调
 - E. 定向力障碍
7. 患者，男，因门静脉高压合并上消化道出血收治入院，医嘱予以三腔二囊管压迫止血，护士长交班时，告知中班护士应注意，该三腔二囊管持续压迫时间最长不应超过（ ）
 - A. 8 小时
 - B. 12 小时
 - C. 24 小时
 - D. 36 小时
 - E. 48 小时
8. 患者，女，55 岁，因肠梗阻收治入急诊，根据患者病情，鉴别单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的判断要点为（ ）
 - A. 梗阻的病史

- B. 梗阻的时间
C. 梗阻的严重程度
D. 肠管壁有无血运障碍
E. 有无并发症
9. 患者，男，80岁，因肠梗阻收治入院，医生考虑患者年迈体弱并综合其病情状况，决定采用非手术治疗，护士应配合医生采取的护理措施为（ ）
A. 中凹卧位
B. 尽早进食
C. 吗啡止痛
D. 胃肠减压
E. 大量保留灌肠
10. 患者，女，35岁，昨日行腹腔手术后，为预防肠粘连，护士告知其首先应（ ）
A. 保持腹腔引流通畅
B. 遵医嘱常规使用抗生素
C. 尽快拔除腹腔引流管
D. 早期下床活动
E. 服用通便药物排便
11. 患者，女，28岁，阑尾切除术后第一天，护士应注意观察的并发症为（ ）
A. 内出血
B. 腹腔脓肿
C. 肠粘连
D. 下消化道出血
E. 切口感染
12. 患者，男，65岁，今晨行斜疝修补术，术后护士应给予的主要措施为（ ），以预防患者发生阴囊水肿
A. 手术侧膝下垫一枕头
B. 告知其一周后下床活动
C. 每日更换敷料3次
D. 用丁字带将阴囊托起
E. 适当提重物，以锻炼肌肉功能
13. 患者，男，65岁，右侧腹股沟区可复性肿块多年。鉴别该患者为腹股沟斜疝或直疝时，最有意义的鉴别点是（ ）
A. 病程的长短
B. 突出的部位
C. 疝块的大小
D. 疝内容物是否进入阴囊
E. 还纳内容物、压迫深环后疝内容物是否再突出
14. 患者，女，23岁，因暴饮暴食后突发急性胰腺炎收治入院，经实验室检查，发现其首先升高的指标为（ ）
A. 血淀粉酶
B. 尿淀粉酶
C. 红细胞计数
D. 血糖水平
E. 血钙水平
15. 患者，男，48岁，昨日在腹腔镜下行胆囊切除术，今晨测得体温38℃，脉搏82次/分，呼吸17次/分，神志清楚，护士考虑其最可能发生了（ ）
A. 肺部感染
B. 腹腔感染
C. 伤口感染
D. 吸收热
E. 肠道感染
16. 患者，男，33岁，排便时出现鲜红色血液，血液在粪便表面，无疼痛，首先考虑的直肠肛管疾病是（ ）
A. 直肠肛管周围脓肿
B. 直肠癌
C. 内痔
D. 外痔
E. 肛裂
17. 患者，男，33岁，因与他人发生口角，被殴打左上腹2次，腹痛2小时后入院就诊。查体见患者神清，面色苍白，血压89/55mmHg，脉搏120次/分，左上腹有轻度压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音阳性，腹腔穿刺抽出不凝固血液。考虑最可能为（ ）
A. 腹壁挫伤
B. 肾挫伤

C.小肠损伤

D.脾破裂

E.肝破裂

18.患者，男，40岁，因急性肠胃炎收治入院，入院后恶心、呕吐，腹痛波及整个下腹部，且疼痛持续加剧，首先考虑发生了（ ）

A.单纯性阑尾炎

B.穿孔性阑尾炎

C.坏疽性阑尾炎

D.阑尾周围脓肿

E.继发性胆囊炎

19.患者，女，45岁，行胆总管切开取石、T管引流术后，引流液每天均在1500ml左右，提示（ ）

A.胆汁过少

B.胆管上端梗阻

C.胆管中端梗阻

D.胆管下端梗阻

E.肝功能衰竭

20.患者，女，56岁，胆结石后继发胆管炎，出现Charcot三联征，其表现为（ ）

A.腹痛、畏寒发热、呕吐

B.腹痛、黄疸、胆囊肿大

C.腹痛、寒战高热、黄疸

D.腹痛、寒战高热、低血压

E.腹痛、黄疸、休克

21.患者，男，42岁，因外科急腹症收治入院，其腹痛的特点是（ ）

A.先呕吐，后腹痛

B.先腹痛，后发热

C.无腹肌紧张

D.疼痛不规律

E.腹痛部位移动

22.患者，男，50岁，因外科急腹症收治入院，以下不属于急腹症患者术前评估内容的是（ ）

A.腹痛发生的时间

B.腹痛的性质和程度

C.腹痛的部位

D.腹痛与饮食的关系

E.有无腹痛的家族史

23.患者女性，因右上腹阵发性绞痛伴恶心、呕吐3小时来院就诊。体温37℃，右上腹深部压痛，Murphy征阴性，进一步检查首选（ ）

A.血白细胞计数

B.腹部X线透视

C.B超

D.口服胆囊造影术

E.血淀粉酶测定

24.患者，男，25岁，因急腹症收治入院，护士告知他应严格禁止以下操作，除外（ ）

A.进食流质

B.使用止痛剂

C.口服泻药

D.灌肠

E.腹腔穿刺

25.患者，男，65岁，近日行胃大部切除术，术后第4天进食后出现右上腹剧痛、压痛和腹肌紧张等症状。最可能的原因是（ ）

A.急性胃扩张

B.胃肠吻合口瘘

C.残胃蠕动无力

D.吻合口梗阻

E.胃出血

26.患者，男，37岁，溃疡病史1年，中午饱餐后，出现上腹剧烈疼痛，伴恶心呕吐，腹肌紧张，出冷汗，休克，首先应考虑并发症是（ ）

A.癌变

B.感染

C.大出血

D.急性穿孔

E.幽门梗阻

27.胆道蛔虫病腹痛的特点（ ）

A.阵发性腹部绞痛

- B.持续性腹部胀痛
C.持续性绞痛伴阵发性加重
D.阵发性钻顶样绞痛
E.刀割样腹痛
- 28.胆总管探查术后 T 管考虑可以拔管的指征不正确的是 ()
A.黄疸消退
B.无腹痛、腹胀
C.无发热
D.大便颜色正常
E.胆汁引流量减少, 颜色淡
- 29.给予消化道急性穿孔的患者禁食、胃肠减压的主要目的是 ()
A.减轻暖气腹胀
B.避免消化液和食物残渣继续流入腹腔
C.减轻恶心呕吐
D.减轻腹痛腹泻
E.加速穿孔愈合
- 30.患者, 男性, 行胆总管切开取石、T 管引流术。术后第三天, 护士查房时发现 T 管无胆汁流出, 患者主诉腹部胀痛, 首先应 ()
A.用无菌生理盐水冲洗 T 管
B.检查 T 管是否受压扭曲
C.用注射器抽吸 T 管
D.准备 T 管造影
E.继续观察, 暂不处理
- 31.患者, 女, 20 岁, 因胰腺炎收治入院, 医嘱予以肠外营养, 关于肠外营养的护理措施不正确的是 ()
A.保持导管通畅
B.营养液需在无菌环境下配置
C.营养液需在 24 小时内输注完毕
D.穿刺插管部位每日消毒更换敷料
E.营养液中可加入治疗用药
- 32.患者, 男性, 47 岁, 因急腹痛 2 天, 诊断为急性胰腺炎。血淀粉酶 2500U/L, 血钙 1.6mmol/L。主要症状表现为 ()
A.上腹部持续性疼痛, 阵发性剧痛, 向腰背部呈带状放射
B.上腹胀痛伴呕吐、腹泻
C.心尖部剧痛伴暖气
D.上腹中间或稍偏左疼痛
E.进食后上腹胀痛伴反酸、暖气
- 33.患者, 男性, 40 岁, 急诊入院, 神志不清, 出冷汗, 脉搏细数, 血压 80/45mmHg, 诊断为“急性梗阻性化脓性胆管炎”。其体位应取 ()
A.半坐卧位
B.中凹位
C.头低足高位
D.头高足低位
E.任意卧位
- 34.患者, 男性, 6 小时前负重物时, 右侧斜疝被嵌顿, 提示疝内容物已发生缺血性坏死, 患者出现 () 临床表现时, 应做好急诊手术前的准备
A.疝块增大, 不能回纳
B.局部有剧烈疼痛
C.疝块紧张发硬, 有触痛
D.阵发性腹痛伴呕吐
E.全腹压痛, 肌紧张
- 35.患者, 女, 26 岁, 产后 4 周出现体温升高、右侧乳房疼痛、局部红肿、有波动感, 最主要的护理措施是 ()
A.托起患侧乳房
B.33%硫酸镁湿敷
C.局部物理疗法
D.及时切开引流
E.全身应用抗生素
- 36.患者, 男性, 62 岁, 因颈部蜂窝组织炎入院, 患者颈部肿胀明显, 应特别注意观察 ()
A.体温
B.呼吸
C.血压
D.吞咽

- E.神志
- 37.患者，男，68岁，右下肢皮肤出现“红线”并伴有压痛，考虑其可能为（ ）
- A.下肢静脉炎
 - B.下肢动脉栓塞
 - C.丹毒
 - D.急性淋巴结炎
 - E.管状淋巴管炎
- 38.患者，女，22岁，近日学业劳累，睡眠质量严重下降，今晨颈部突然出现一片紫红斑，之后局部出现多个脓头，触之明显，考虑其为（ ）
- A.疔
 - B.痈
 - C.丹毒
 - D.痤疮
 - E.急性淋巴管炎
- 39.患者，女，61岁，因丹毒收治入院，其学名为（ ）
- A.静脉管炎
 - B.动脉管炎
 - C.脓性指头炎
 - D.网状淋巴管炎
 - E.管状淋巴管炎
- 40.患者，男，40岁，左小腿皮肤鲜红，烧灼样疼痛，全身寒战、发热，初步考虑是（ ）
- A.急性蜂窝组织炎
 - B.丹毒
 - C.破伤风
 - D.痈
 - E.气性坏疽
- 41.患者，男，55岁，车祸造成腹部损伤，护士第一时间得知其有开放性膀胱破裂。首先要准备的抢救措施是（ ）
- A.三阶梯止痛
 - B.给予抗生素抗感染
 - C.安慰患者
 - D.留置导尿
 - E.准备抗休克处理
- 42.患者，男，70岁，排尿困难，尿频尿急，夜尿增多，与家人饮烈性酒后，小便不能自解，体检发现膀胱区明显膨隆。最可能的诊断是（ ）
- A.尿道结石
 - B.尿道狭窄
 - C.膀胱结石
 - D.肾衰
 - E.前列腺增生
- 43.患者，女，25岁，因外伤致肾损伤收治入院，应特别引起护士注意的体征是（ ）
- A.血尿颜色变浅
 - B.血色素增加
 - C.腹围增加
 - D.持续疼痛
 - E.体温稍高
- 44.患者，男，22岁，因腹部钝性伤导致肾损伤，应特别注意易引起休克的损伤为（ ）
- A.肾挫伤
 - B.肾盂肾炎
 - C.肾小球肾炎
 - D.肾蒂损伤
 - E.肾皮质部分损伤
- 45.患者，女，32岁，因尿道球部外伤收治入院，其可能存在的受伤类型是（ ）
- A.会阴刺伤
 - B.会阴撕裂伤
 - C.撞击伤
 - D.骑跨伤
 - E.击打伤
- 46.患者，女，42岁，确诊输尿管结石2年余，护士在采集病史时，其主诉的主要症状是（ ）
- A.与活动有关的疼痛
 - B.排尿困难
 - C.尿频尿急
 - D.尿失禁

- E.无痛性血尿
- 47.患者，女，35岁，双上肢烧伤患处疼痛较为迟钝，体检：双上肢布满小水疱，水疱较厚，估计其烧伤深度和预后正确的是（ ）
- Ⅰ°烧伤，愈后无瘢痕
 - Ⅲ°烧伤，有挛缩
 - 浅Ⅱ°烧伤，如无感染不留瘢痕
 - 深Ⅱ°烧伤，可产生瘢痕
 - 深Ⅱ°烧伤，仅有色素痕迹
- 48.患者，女，16岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。根据患者烧伤部位的特点，护士应重点观察（ ）
- 呼吸功能
 - 血压
 - 意识
 - 疼痛程度
 - 上肢血液循环
- 49.患者，女，35岁，双手深Ⅱ度烧伤康复期。护士指导其双手平时正确的放置位置是（ ）
- 握拳位
 - 半握拳位
 - 伸直位
 - 半伸直位
 - 双手互握
- 50.患者男性，18岁。因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷1小时，清醒后诉头痛，有呕吐，右上肢肌力Ⅱ级；脑脊液检查有红细胞，CT扫描见左额顶叶低密度灶，其中有散在点状高密度影。观察该患者的生命体征的顺序是（ ）
- 脉搏、呼吸、血压
 - 呼吸、脉搏、血压
 - 呼吸、血压、脉搏
 - 脉搏、血压、呼吸
 - 血压、脉搏、呼吸
- 51.患者，女，25岁。右小腿有12cm×4cm的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是（ ）
- 等渗盐水
 - 0.02%呋喃西林溶液
 - 0.1%依沙吖啶溶液
 - 含氯石灰硼酸溶液
 - 5%氯化钠溶液
- 52.患者，女，54岁，因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是（ ）
- 休克
 - 肺部感染
 - 窒息
 - 肾衰竭
 - 脱水、酸中毒
- 53.患者，男，38岁，因腿部被锈钉刺伤后数日，出现咀嚼不便、张口困难，随后牙关紧闭及全身肌肉强直性收缩、阵发性痉挛，诊断为破伤风。治疗此患者应首选使用的抗生素是（ ）
- 甲硝唑
 - 青霉素
 - 红霉素
 - 四环素
 - 磺胺类药物
- 54.患者，女，46岁，右下肢因房屋倒塌被砖墙压住，4小时后被救出。体检：脉搏96次/分，血压86/66mmHg，右肢明显肿胀有瘀斑，静脉输液应首选（ ）
- 低分子右旋糖酐
 - 10%葡萄糖溶液
 - 3%高渗盐水溶液
 - 全血或血浆
 - 平衡液
- 55.患者，女，25岁，腕关节扭伤，为防止皮下出血和组织肿胀，在早期应选用（ ）
- 局部按摩
 - 红外线照射
 - 冰袋冷敷
 - 湿热敷
 - 放置热水袋
- 56.患者，男，59岁，诊断为直肠癌，准备行直肠癌根治术，考虑其能否保留肛门取决于（ ）

- A.肿瘤的大小
B.肿瘤是否已侵犯肠管周围
C.肿瘤有无远处转移
D.肿瘤距肛门的距离
E.左半结肠的长短
- 57.患者，女，63岁，诊断为直肠癌，行直肠癌根治术后建立人工肛门，其护理方法正确的是（ ）
A.禁忌扩张造口
B.定时结肠灌洗，训练排便习惯
C.造口袋内排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
D.肛门袋宜长期持续使用，少更换
E.根据患者体型、体重选择造口袋的大小
- 58.患者，男，58岁，因上腹不适数月余来院就诊，诊断为胃癌，行毕Ⅱ式胃大部分切除术，术后留置胃管行胃肠减压下，其拔胃管的指征是（ ）
A.肠鸣音恢复
B.引流胃液转清
C.术后 48~72 小时
D.肛门排气后
E.无腹胀、呕吐
- 59.患者，男，38岁，近日胃痛渐加重，并有嗝气、反胃等症状，经诊断为幽门梗阻，需进行手术，术前减轻胃粘膜水肿的主要措施是（ ）
A.术前 3 天开始每晚用温盐水洗胃
B.术前禁食
C.营养支持
D.口腔护理
E.纠正水电解质酸碱平衡
- 60.患者，男，57岁，临床诊断为颈椎病，经常感到眩晕、头痛，其主要是由于（ ）
A.压迫脊髓
B.压迫神经根
C.压迫交感神经
D.压迫椎动脉
E.既压迫脊髓又压迫神经根
- 61.患者，男，58岁，上腹隐痛、纳差 2 月余，诊断为胃恶性肿瘤，行胃大部切除术后 2 月余，进食 30 分钟出现乏力、心慌、出汗，平卧后缓解是因为（ ）
A.吻合口梗阻
B.吻合口出血
C.十二指肠残破裂
D.倾倒综合征
E.空肠输出段梗阻
- 62.患者，男，51岁。胸部 CT 检查示左下肺叶直径 3.4cm、不规则高密度肿块阴影。同侧肺门淋巴结肿大，直径约 1cm。支气管纤维镜检查为鳞癌，行全肺切除术。术后护理措施正确的是（ ）
A.24 小时补液量为 3000ml
B.输液滴速为 50 滴/分
C.取全患侧卧位
D.取 1/4 侧卧位
E.胸腔引流管一般呈开放状态
- 63.患者，女，58岁，刺激性咳嗽 5 个月余。胸部 X 线片示右肺上叶有一不规则肿块阴影，经支气管镜检查诊为小细胞肺癌。患者拟在全麻下行肺叶切除术，呼吸功能尚可，术后应取（ ）
A.平卧位
B.头低足高仰卧位
C.健侧卧位
D.1/4 侧卧位
E.患侧卧位
- 64.患者，女性，58岁，诊断为右肺中央型肺癌，行右肺全肺切除，术后患者输液滴速一般每分钟不超过（ ）
A.70 滴
B.30 滴
C.40 滴
D.60 滴
E.80 滴
- 65.患者，男，52岁，近 2 月来消瘦、乏力、纳差，上腹部隐痛不适，皮肤巩膜黄染进行性加深，进一步确诊为肝癌，需进行手术，其术前护理不正确的是（ ）

- A.给予维生素 K
B.适量输血和白蛋白
C.术前晚用肥皂水灌肠
D.全面检查肝功能和凝血功能
E.术前 3 天口服抗生素
- 66.患者，男性，60 岁，既往体健。近 2 个月来上腹饱胀，食欲下降，有上腹钝痛，B 超显示肝右叶门区占位病变，直径约 7.0cm，有少量腹水，肝功能检查：ALT：351U/L，A/G 比值 3.51：2.79。诊断为肝癌，行肝叶切除术，术后护理错误的是（ ）
- A.应专人护理
B.吸氧 3~5 天
C.术后取平卧位
D.术后取患侧卧位
E.术后给予静脉输液补充营养
- 67.患者，女，28 岁，已婚，右侧乳房出现无痛性肿块直径 3~5cm，局部皮肤出现酒窝征，腋窝可触及 2 个可活动的散在的淋巴结，诊断为乳腺癌，行乳腺癌根治术后的第 2 天护理措施中不正确的是（ ）
- A.患侧垫枕，抬高患肢
B.保持伤口引流管通畅
C.观察患侧肢端的血液循环
D.指导肩关节的活动
E.禁止在患侧手臂上测血压、输液
- 68.王某，女，23 岁，甲状腺大部切除术后 6 小时，患者突然出现进行性呼吸困难，烦躁不安，发绀，检查发现颈部肿大，切口有大量渗血。引起的原因最可能是（ ）
- A.喉头水肿
B.气管塌陷
C.痰液阻塞
D.双侧喉返神经损伤
E.切口内血肿压迫气管
- 69.患者，女，34 岁，因甲亢行甲状腺切除术，术后 24 小时患者突然出现高热、脉速、烦躁、大汗。患者最可能发生了（ ）
- A.甲状腺危象
B.喉返神经损伤
C.甲状旁腺损伤
D.喉上神经损伤
E.切口感染
- 70.患者，女性，40 岁。胰腺癌术后第 4 天，患者出现心慌、出冷汗，测血糖为 2.8mmol/L，护士正确的处理是（ ）
- A.输注血浆
B.补充盐水
C.补充葡萄糖
D.输入脂肪乳
E.增加胰岛素用量
- 71.患者，男，45 岁，经过各项检查确诊为右肾癌，病史中提示与肾癌发病相关的信息是（ ）
- A.曾是潜水员
B.吸烟 20 余年
C.父母有高血压病史
D.有尿道结石病史
E.饮酒数年
- 72.患者，女，35 岁，胃大部切除术后 4 天，体温 39℃，切口疼痛，应考虑（ ）
- A.外科热
B.切口感染
C.腹腔感染
D.肺部感染
E.膈下脓肿
- 73.患者，女性，38 岁。右乳腺癌根治术后，患侧上肢活动受限。护士指导其进行上肢功能锻炼，最理想的预期目标是（ ）
- A.臂能平举
B.肘能屈伸
C.手摸到同侧耳朵
D.手经胸前摸到对侧肩膀
E.手经头顶摸到对侧耳朵
- 74.患者，男，25 岁，头部被木棍击伤后昏迷 20 分钟，清醒后头疼、呕吐，3 小时后又陷入昏迷，右侧瞳孔散大，光反射消失，左侧偏瘫，头颅 x 线摄片右侧颞骨有线性骨折，最可能的诊断是（ ）

- A.脑内出血
- B.急性硬膜外血肿
- C.脑挫裂伤
- D.急性硬膜下血肿
- E.脑干损伤

75.患者，男，30岁，因车祸受伤入院。查体：嗜睡，刺痛能睁眼，回答问题含糊不清，对疼痛刺激能定位。其 Glasgow 昏迷分级计分应为（ ）

- A.5分
- B.9分
- C.10分
- D.12分
- E.15分

76.患者，女，65岁，在家中宴请宾客时突然跌倒在地，当时意识清醒，自己从地上爬起，后因左侧肢体无力再次跌倒，并出现大小便失禁，随后患者意识模糊呈嗜睡状态，急诊诊断为急性脑出血入院，该患者最可能出现的并发症是（ ）

- A.呼吸衰竭
- B.心脏衰竭
- C.脑疝
- D.肾衰竭
- E.DIC

77.患者，男，59岁，脑出血，入院第二天发生颅内压升高，遵医嘱予以静脉滴注 20%甘露醇 250ml，应注意（ ）

- A.慢
- B.极慢
- C.一般速度
- D.快速滴注
- E.按血压高低调节滴注速度

78.患者，女，60岁，高血压 20年，家人探视后突然出现剧烈头痛，头晕、呕吐，进而意识障碍，血压 206/110mmHg，CT 显示高密度影，治疗需要立刻降颅压和镇静。下列药物禁用的是（ ）

- A.吗啡
- B.甘露醇
- C.地西洋
- D.硝苯地平缓释片
- E.尼莫地平

79.患者，女，58岁，高血压 10年，因情绪激动后出现剧烈头痛、呕吐，血压 220/110mmHg，意识障碍，大小便失禁，CT 显示高密度影，最恰当的护理措施是（ ）

- A.发病 1~12 小时内避免搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高
- B.发病 12~24 小时内避免搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高
- C.发病 24~48 小时内避免搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高
- D.发病 48~72 小时内避免搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高
- E.发病 72~96 小时内避免搬动患者，患者侧卧位，头部稍抬高

80.患者，女，38岁，既往体健，2小时前在提取重物后突然剧烈头痛，伴喷射状呕吐，呼吸减慢，心率减慢，血压升高，这种现象是（ ）

- A.急性颅内感染
- B.脑神经受刺激
- C.牵涉性头痛
- D.颅内压升高
- E.神经官能症

81.患者，男，30岁，因突然头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性入院，初步诊断为蛛网膜下腔出血，病因诊断主要依据（ ）

- A.脑脊液检查
- B.CT 检查
- C.MRI 检查
- D.脑血管造影
- E.脑超声检查

82.患者，男，38岁，车祸伤及头部，当即出现右侧鼻唇沟变浅，右外耳道流出淡血性液体，右耳听力下降，CT 显示颅内少量积气。考虑患者出现了（ ）

- A.颅前窝骨折
- B.颅中窝骨折
- C.颅后窝骨折
- D.额骨骨折
- E.脑挫裂伤

83.患者，女，28岁，在家擦玻璃时，从 3 楼意外坠下，额部着地，双眼眶青紫淤血，鼻腔有血性液体流

出，视物模糊，可考虑（ ）

- A.鼻出血
- B.颅前窝骨折
- C.面部擦伤
- D.颅中窝骨折
- E.眼球损伤

84.患者，女，58岁，有高血压病史，最高血压 208/110mmHg，因情绪激动后突然倒地不起，陷入昏迷，紧急入院抢救，诊断为蛛网膜下腔出血，造成蛛网膜下腔出血的原因是（ ）

- A.脑血栓
- B.脑栓塞
- C.脑出血
- D.颅内动脉破裂出血
- E.颅内恶性肿瘤破裂

85.患者，男，20岁，头部被木棒击伤后昏迷半小时，清醒后诉头痛并呕吐 1 次。入院后，若患者出现急性颅内压增高，伴随其出现的生命体征应是（ ）

- A.血压升高，脉搏加快，呼吸急促
- B.血压升高，脉搏缓慢，呼吸深慢
- C.血压升高，脉搏加快，呼吸深慢
- D.血压下降，脉搏缓慢，呼吸深慢
- E.血压下降，脉搏细速，呼吸急促

86.患者，男，35岁，因颅前窝骨折伴脑脊液漏入院，为促进漏口愈合护士应协助其取何体位（ ）

- A.去枕平卧
- B.头低脚高位
- C.侧卧位
- D.半卧位
- E.平卧位

87.患者，男，70岁，因颅内压升高，头痛逐渐加重，行腰椎穿刺脑脊液检查后突然呼吸停止，双侧瞳孔直径 2mm，以后逐渐散大，血压下降，该患者最可能出现了（ ）

- A.小脑幕切迹疝
- B.枕骨大孔疝
- C.大脑镰下疝
- D.脑干缺血
- E.脑血管意外

88.患者，男，18岁，遇车祸时大块头皮被撕脱，紧急救护后，撕脱的头皮的保存方法是（ ）

- A.无菌敷料包裹，隔水低温保存
- B.浸泡于无菌用水中
- C.无菌敷料包裹，常温保存
- D.浸泡在生理盐水中常温保存
- E.无菌敷料包裹，浸泡于 4℃的生理盐水中

89.患者，女，48岁，因严重脑外伤住院，经评估患者存在以下护理问题，属于首优护理问题的是（ ）

- A.营养缺乏
- B.呼吸道阻塞
- C.尿失禁
- D.皮肤完整性受损
- E.语言沟通障碍

90.患者，男，36岁。因颅脑外伤后昏迷入院。当患者出现清醒后，又再次昏迷，其有效的处理措施是（ ）

- A.降温
- B.脱水
- C.手术
- D.给氧
- E.应用肾上腺皮质激素

91.患者，男，58岁。脑出血入院 3 天后突然主诉头痛剧烈，继而出现呕吐呈喷射状，呕吐物呈咖啡色，呕吐后患者仍未感觉轻松，患者出现呕吐，原因是（ ）

- A.药物刺激
- B.幽门梗阻
- C.看到不洁食物
- D.颅内压增高
- E.糖尿病酮症酸中毒

92.患者，男，63岁。跟人发生争吵时突然语言不清、呕吐，随即昏迷，右侧肢体瘫痪；血压 230/120mmHg，诊断为脑出血。为防止出血加重，应首先采取的措施是（ ）

- A.控制血压
B.保护性约束
C.降低颅内压
D.止血处理
E.肢体制动
- 93.患者，男，25岁，诊断为尺桡骨骨折，现发现发生骨筋膜室综合征，应立即采取的处理措施是（ ）
A.抬高患肢
B.为病人抽血化验
C.给予石膏绷带外固定
D.立即输液
E.筋膜切开术
- 94.患者，男，56岁。车祸中致左股骨中段开放性骨折，局部畸形，骨折端外露，伤口有活动性出血。下列急救措施不妥的是（ ）
A.将外露骨折端现场整复
B.用清洁布类加压包扎伤口
C.就地取材固定患肢
D.检查有无其他合并伤
E.迅速送往医院
- 95.患者，女，62岁。下楼梯时跌倒致右股骨颈骨折，现给予持续皮牵引处理。该患者最易发生的并发症是（ ）
A.休克
B.右坐骨神经损伤
C.髓关节创伤性关节炎
D.右股骨头缺血性坏死
E.骨化性肌炎
- 96.患者，男，16岁。跌倒时右手掌撑地，当时右腕剧痛，渐肿胀，活动障碍，局部呈“餐叉”畸形。该患者最可能的原因是（ ）
A.桡骨远端伸直型骨折
B.桡骨远端屈曲型骨折
C.腕骨骨折
D.掌骨骨折
E.腕关节扭伤
- 97.患者，男，18岁。踢球时与人发生碰撞后发生左侧第6肋骨骨折，其最可能出现的特征性临床表现是（ ）
A.损伤局部疼痛
B.咳嗽时局部疼痛加剧
C.损伤局部瘀斑
D.按压肋骨有骨擦感
E.损伤局部有血肿
- 98.患者，男，15岁。车祸至左髌部疼痛，活动受限4小时。X线检查：左股骨颈骨折，移位明显。目前最佳的治疗方法是（ ）
A.切开复位内固定
B.闭合复位内固定
C.牵引治疗
D.人工股骨头置换
E.全髋关节置换
- 99.患者，男，32岁，长期进行长跑训练，在20公里拉力赛后左足第2、3跖骨骨折，此骨折称为（ ）
A.病理性骨折
B.疲劳性骨折
C.裂缝骨折
D.青枝骨折
E.嵌插骨折
- 100.患者，男，33岁，因肱骨干骨折入院。伤后局部软组织肿胀明显。手法复位后行石膏固定。术后护士应注意观察肢端血运。若有血运障碍，下面哪种表现最不可能发生（ ）
A.疼痛
B.发绀
C.肿胀
D.皮温升高
E.脉搏减弱或消失
- 101.患者，男性，29岁，因脊椎骨折行躯体石膏固定。固定后患者出现持续性恶心，反复呕吐，腹胀及腹痛，可能为（ ）

- A.急性阑尾炎
B.急性肠梗阻
C.骨筋膜室综合征
D.石膏综合症
E.急性胃肠炎
- 102.患者，女性，37岁。摔倒后右手撑地，致右上臂疼痛、肿胀、不能活动。经检查肱骨中、下段骨折，最容易合并下列哪条神经损伤()
A.桡神经
B.正中神经
C.腓总神经
D.腋神经
E.尺神经
- 103.患者，女性，59岁，摔倒后左手撑地损伤了桡神经，表现为下列哪种畸形()
A.拇指内收畸形
B.垂腕畸形
C.足下垂
D.猿手畸形
E.骨间肌萎缩畸形
- 104.患者，男，43岁。因车祸致左小腿疼痛、肿胀，局部皮肤瘀斑、畸形、功能障碍被送入急诊室，初步诊断为小腿骨折。当病人有下列哪一种主诉时，应怀疑病人有腓总神经压迫()
A.腹痛
B.滴尿
C.大便失禁
D.足麻木
E.腰背痛
- 105.患者，男性，9岁。跌倒时手掌着地，肘关节半屈曲，伤后2小时就诊。体检：肘部明显肿胀及压痛，呈向后突出的半屈曲位畸形，肘后三角存在。诊断为肱骨髁上骨折。经闭合复位后行骨牵引固定。若病人患肢出现肿胀、苍白、发冷、麻木、剧烈疼痛等症状，预示病人可能出现()
A.压疮
B.感染
C.过度牵引
D.血栓性静脉炎
E.末梢循环障碍
- 106.患者，男性，17岁，疑有肱骨嵌插骨折，下列哪项是诊断骨折的最可靠的依据()
A.局部畸形
B.局部剧烈疼痛
C.骨擦感
D.X线摄片
E.功能障碍
- 107.患者，男性，51岁，不慎从三楼跌下，疑有脊柱骨折，在现场处理中哪项是错误的()
A.立即背起患者迅速转运
B.防止继续损伤
C.患者放在硬板床上抬运
D.保持脊柱中立位
E.判断有无并发其他损伤
- 108.患者，男性，69岁，右侧腹股沟斜疝嵌顿2h，经手法复位成功。护理观察的重点是()
A.疝块有无在此嵌顿
B.呼吸、脉搏、血压
C.腹痛、腹膜刺激征
D.呕吐、腹胀、发热
E.疝块部位红、肿、痛
- 109.患者，男性，36岁，搬运工人，诊断为腹股沟斜疝，行疝修补术后，恢复工作的时间是()
A.术后至少2周
B.拆线后至少1周
C.术后体力恢复后
D.术后至少1个月
E.术后至少3个月
- 110.患者，男性，22岁，诊断为胫腓骨骨折，入院第2天出现患肢小腿部剧烈疼痛进行性加重，严重肿胀，足趾麻木，足背动脉搏动微弱等症状。请问该患者可能发生了什么问题()
A.休克
B.腓总神经损伤

- C.骨筋膜室综合征
D.脂肪栓塞
E.关节僵硬
- 111.患者，女性，42岁，左拇指活动弹响伴左拇指间关节明显疼痛半年，左拇指不能主动伸直一天。查体：左第一掌指关节掌面可及黄豆粒大小质硬结节，压痛明显，被动屈伸左拇指可于结节处触及弹响。根据症状和体征，正确的诊断是（ ）
- A.左拇指长屈肌腱鞘炎
B.左拇指肿瘤
C.风湿结节
D.左拇指腱鞘囊肿
E.骨关节炎
- 112.李先生，28岁。股骨干骨折，入院后行小夹板固定、骨牵引治疗。护理注意点中，错误的一项是（ ）
- A.应将床头抬高 15~30cm
B.牵引绳不可受压
C.牵引重量不可随意增减
D.牵引力与反牵引力应保持在一条线上
E.牵引肢体的足部不能抵住床栏
- 113.患者，女性，35岁，胸部外伤后左侧第 3~6 肋骨多处闭合性骨折，此时应采取的紧急处理措施是（ ）
- A.抗感染
B.固定胸壁
C.剖胸探查
D.穿刺排气减压
E.吸氧
- 114.患者，女性，65岁，因股骨颈骨折行人工全髋关节置换术，术后 3 月内可以进行的活
动是（ ）
- A.盘腿
B.系鞋带
C.弯腰拾物
D.跷二郎腿
E.坐高凳
- 115.患者，女性，37岁，因车祸致伤急诊入院。初步检查拟诊骨盆骨折合并腹腔内脏损伤，
有休克征象。护士应首先给予（ ）
- A.准备骨盆兜，行悬吊牵引
B.建立静脉通道
C.准备腹腔手术止血
D.准备石膏
E.准备骨牵引器材
- 116.患者，男性，31岁，因车祸伤 1 小时入院。主诉小腿局部剧烈疼痛，不能活动。检查
发现，小腿段肿胀较重，未见骨折端外露，出现反常活动。该患者首优的护理诊断是（ ）
- A.疼痛
B.躯体活动障碍
C.焦虑
D.皮肤完整性受损
E.知识缺乏
- 117.患者，女，54岁，因间歇、无痛性肉眼血尿诊断为膀胱癌，经手术治疗后，给患者留置导尿管的护理
中，错误的是（ ）
- A.保持尿管通畅
B.定时观察尿量、颜色、性质
C.定期行膀胱冲洗
D.导尿管每日更换一次
E.用带气囊尿管，以免脱落
- 118.患者，男性，23岁，35天前锐器刺伤右肘前方，经清创缝合，创口已愈合。但右手逐
渐呈猿手畸形，不能握笔写字。该患者最可能损伤的是（ ）
- A.尺神经
B.桡神经
C.屈拇指肌
D.伸拇指肌
E.正中神经
- 119.患者，男性，32岁，外伤后下腹部剧烈疼痛，并有少量血尿排出。腹部检查满腹有压
痛、腹肌紧张、移动性浊音阳性，导尿试验阳性。首先考虑是（ ）
- A.肾损伤
B.膀胱损伤

- C.前尿道损伤
D.后尿道损伤
E.肠破裂
- 120.患者，男性，20岁，外伤后尿道滴血，并有排尿困难。体查：腹平软，腹部压痛、反跳痛不明显，会阴部、阴囊、阴茎部明显肿胀。首先考虑是（ ）
- A.肾损伤
B.输尿管损伤
C.膀胱损伤
D.前尿道损伤
E.后尿道损伤
- 121.患者，男性，28岁。因车祸致骨盆骨折后，出现明显尿意，但仅有少量血尿排出，下腹部感到疼痛，其尿外渗可能波及到（ ）
- A.阴囊
B.阴茎
C.会阴
D.膀胱周围
E.下腹壁
- 122.患者，男性，48岁，中度肾损伤，以下处理措施不正确的是（ ）
- A.输液
B.早期活动
C.输血
D.应用抗菌药物
E.镇静
- 123.患者，男性，30岁，下腹部外伤6小时，病人出现小腹隐痛伴排尿困难，试插导尿管可以顺利进入膀胱，注入200ml生理盐水后抽出不足150ml。此种情况应首先考虑（ ）
- A.后尿道断裂
B.前尿道断裂
C.输尿管损伤
D.膀胱损伤合并尿道损伤
E.膀胱破裂
- 124.青年男性，尿道损伤后出现排尿困难，导尿管能插入膀胱，导尿管的留置时间应为（ ）
- A.1~3天
B.4~5天
C.10~14天
D.21~28天
E.30~40天
- 125.患者，男性，72岁，因前列腺肥大造成排尿困难，腹痛，尿潴留，已16小时未排尿。下述护理中正确的是（ ）
- A.让患者坐起排尿
B.听流水声
C.用温水冲洗会阴部
D.下腹部置热水袋
E.行导尿术
- 126.患者，男性，62岁，进行性排尿困难，夜尿次数增多，直肠指诊发现前列腺明显肿大，目前考虑（ ）
- A.膀胱癌
B.膀胱结石
C.良性前列腺增生
D.尿道狭窄
E.膀胱结核
- 127.患者，男性，47岁，选择性肾动脉造影检查术后1小时，正确的护理措施是（ ）
- A.半卧位
B.尽量少饮水
C.鼓励病人下地活动
D.每小时观察一次足背动脉搏动
E.穿刺局部加压包扎，平卧24小时
- 128.患者，男性，6岁，排尿时突然感到疼痛，尿流中断，大哭，变换体位后疼痛缓解，可继续排尿，可能的诊断是（ ）
- A.尿道狭窄
B.膀胱结石
C.急性膀胱炎
D.输尿管结石
E.膀胱结核

- 129.一位前列腺增生患者，出现急性尿潴留 6 小时，诱导排尿无效，应采取的护理措施是（ ）
- 按压膀胱
 - 导尿
 - 膀胱镜
 - 耻骨上膀胱造瘘
 - 耻骨上膀胱穿刺
- 130.患者，男性，25 岁，不慎从高处摔下，诊断为尿道损伤，下列处理哪项是错误的（ ）
- 恢复尿道连续性
 - 引流尿液，解除尿潴留
 - 外渗部位，应做切开引流
 - 常规应用抗生素
 - 用气囊导尿管压迫止血
- 131.患者，男性，40 岁，近日来腰部隐痛，今日突然出现阵发性剧痛，并向会阴部放射，伴有面色苍白、恶心、呕吐、镜下血尿，应考虑（ ）
- 急性胆管炎
 - 急性阑尾炎
 - 结石
 - 肠梗阻
 - 胃穿孔
- 132.一男性老年患者，半年来夜间尿频，有排尿不尽感，尿流变细，排尿时间延长，排尿困难逐渐加重，近两天排尿时下腹部疼痛考虑为（ ）
- 膀胱癌
 - 肾结核
 - 慢性膀胱炎
 - 前列腺增生症
 - 膀胱及尿道结石
- 133.某人行走时滑倒，右腰部垫于石头上，伤者自觉右腰部疼痛。查血压正常，右腰部压痛，轻叩痛，尿液检查红细胞少许。应考虑为（ ）
- 肾部分裂伤
 - 肾全层裂伤
 - 肾挫伤
 - 肾蒂裂伤
 - 输尿管上段损伤
- 134.患者，男性，10 岁，突然尿频、尿急、尿痛、排尿困难，有时排尿突然中断，有终末血尿，应考虑（ ）
- 肾结石
 - 膀胱结石
 - 输尿管结石
 - 尿路感染
 - 肾结核
- 135.患者，男性，下腹部被砸伤 2h，腹部疼痛难忍，排尿困难，诊断为膀胱破裂，该诊断最可靠的方法是（ ）
- 导尿并作注水试验
 - 用金属探子试探
 - 耻骨上膀胱穿刺
 - 膀胱造影
 - 腹膜穿刺
- 136.突发左腰部疼痛伴肉眼血尿的中年男性患者应首先考虑（ ）
- 肾癌
 - 急性肾盂肾炎
 - 肾、输尿管结石
 - 输尿管癌
 - 肾结核
- 137.患者，女性，30 岁，有痛风病史和高尿酸血症。肾结石手术后，为预防结石复发，应指导病人口服（ ）
- 维生素 B6
 - 维生素 C
 - 小苏打
 - 别嘌呤醇
 - 氧化镁
- 138.患者，男性，56 岁，甲状旁腺功能亢进并发双肾结石，手术取石后，预防其结石复发的最重要的措施是（ ）
- 食低钙食物

- B.酸化尿液
- C.碱化尿液
- D.多活动
- E.手术摘除甲状腺旁腺腺瘤或增生组织

- 139.患者，男，30岁，双上肢及胸腹部烧伤6小时，血压70/50mmHg，中心静脉压3cmH₂O，尿量15ml/h，表明该患者存在（ ）
- A.血容量严重不足
 - B.心功能不全
 - C.血容量过多
 - D.毛细血管过度收缩
 - E.肾功能不全
- 140.患者，男性，45岁，左腰部隐痛1月多。体查：肾区有叩击痛；尿常规检查可见镜下血尿，B超：左肾内有一结石，大小为1.2cm*1.4cm，IVP示肾功能正常，双侧输尿管通畅。目前最适宜的治疗是（ ）
- A.多饮水、运动排石
 - B.体外冲击波碎石
 - C.肾实质切开取石
 - D.经皮肾镜取石或碎石
 - E.中药排石
- 141.患者，男性，37岁，顽固性膀胱刺激症状半年，低热乏力，用抗生素后症状略减轻，尿中有红、白细胞，多次尿培养均为阴性，该病人的诊断可能为（ ）
- A.膀胱炎
 - B.肾盂肾炎
 - C.泌尿系结石
 - D.泌尿系结核
 - E.膀胱异物
- 142.患者，女性，35岁，左肾结核、无功能，右肾轻度积水，功能尚可，膀胱容量正常，左上肺有浸润性肺结核。目前最恰当的治疗应是（ ）
- A.左肾切除
 - B.左肾部分切除
 - C.左肾造瘘
 - D.右肾造瘘
 - E.抗结核治疗
- 143.患者，女性，28岁，膀胱刺激征一年余伴腰痛，经抗炎治疗无效，目前每日排尿40余次伴终末血尿，该患者最可能的诊断是（ ）
- A.慢性膀胱炎
 - B.肾盂肾炎
 - C.肾结核
 - D.肾肿瘤伴感染
 - E.肾结石并感染
- 144.患者，男性，43岁，因尿痛、血尿入院，经检查为初始血尿，考虑病变在（ ）
- A.膀胱颈部或尿道
 - B.膀胱及以上部位
 - C.肾
 - D.输尿管
 - E.后尿道
- 145.一老年患者，平素健康，于饮酒后出现急性尿潴留，最好的处置是（ ）
- A.耻骨上膀胱穿刺
 - B.留置导尿
 - C.尿道扩张
 - D.前列腺切除
 - E.膀胱造瘘
- 146.一老年患者，膀胱造影可见：膀胱粘膜粗糙不规则，膀胱颈部充盈缺损，最可能的病因是（ ）
- A.膀胱肿瘤
 - B.膀胱结石
 - C.前列腺增生
 - D.膀胱颈纤维化
 - E.以上均是
- 147.男，66岁，进行性排尿困难1年余，近3月来尿频，每日排尿10余次，且尿道外口常有尿液溢出。体检：下腹部隆起，叩诊实音；直肠指检：前列腺4cm×5cm大小，质韧，中央沟消失，测残余尿300ml。根据上述病史、体检应考虑下面哪种排尿异常（ ）
- A.遗尿
 - B.真性尿失禁

- C.压力性尿失禁
D.急迫性尿失禁
E.充溢性尿失禁
- 148.患者，男性，42岁，B超、CT均提示右肾癌，直径约5cm，以下不合适的治疗方法是（ ）
A.支持疗法
B.根治性肾切除
C.放疗
D.生物学治疗
E.免疫治疗
- 149.患者，男性，69岁，无明显诱因反复出现无痛性肉眼血尿2月余。经抗感染治疗未见明显效果。首先考虑的疾病是（ ）
A.泌尿系结石
B.泌尿系肿瘤
C.泌尿系结核
D.前列腺增生
E.泌尿系感染
- 150.患者，男性，53岁，平素体健，B超发现右肾上极有一个直径约3cm的占位性病变，CT平扫及增强证实右肾上极占位性病变，增强剂不敏感。首先应考虑（ ）
A.肾囊肿
B.肾血管瘤
C.肾错构瘤
D.肾癌
E.肾脂肪瘤
- 151.患者，男，41岁，有消化性溃疡病史4年，1天来胃痛明显，无恶心呕吐，今晨觉头昏、乏力、黑朦，排尿排便一次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问（ ）
A.排便习惯
B.粪便颜色
C.尿液颜色
D.尿量
E.有无眩晕
- 152.患者，男，53岁，因贲门癌收治入院。患者近期进食梗阻感加重，体重明显下降。护士对其饮食的指导要点中，错误的是（ ）
A.少食多餐
B.半流质饮食
C.低蛋白饮食
D.高热量饮食
E.高维生素饮食
- 153.男性，85岁。胃溃疡史20年，常于餐后出现上腹疼痛，服氢氧化铝可缓解，近一年来疼痛不似从前有规律，且服氢氧化铝也难缓解，伴消瘦来诊，大便潜血阳性，最可能的诊断是（ ）
A.胃溃疡伴溃疡出血
B.十二指肠溃疡出血
C.胃癌出血
D.慢性胃炎出血
E.食管静脉曲张出血
- 154.患者，男性，53岁，消化道溃疡病史10年，近两个月来上腹痛呈现无规律性，伴有失眠、体重下降。X线钡餐检查提示有龛影，患者下一步首先要进行的检查是（ ）
A.幽门螺杆菌检测
B.胃液分析
C.胃镜检查与黏膜活检
D.B超
E.CT
- 155.患者，女性，55岁，胃癌晚期，进来病情发展迅速，病人情绪低落、悲伤，沉默，常哭泣。病人的心理反应处于（ ）
A.愤怒期
B.接受期
C.协议期
D.抑郁期
E.否认期
- 156.患者女，38岁。胃癌术后五天，主诉：腹部胀痛、恶心、停止排气排便，查体：全腹膨隆，未见肠型，中上腹轻度压痛及肌紧张，肠鸣音消失，最重要的处理措施是（ ）
A.镇痛
B.胃肠减压
C.补液

- D.半卧位
E.应用抗生素
- 157.患儿女, 6 个月, 因阵发性哭闹, 右上腹触及腊肠样包块, 怀疑为肠套叠, 该患儿首选的检查治疗是 ()
- A.结肠镜检
B.空气灌肠
C.直肠活检
D.腹部 CT
E.钡剂灌肠
- 158.患者男性, 52 岁, 因绞窄性肠梗阻行“回肠部分切除术”, 术后 4 天患者出现腹痛, 以脐周最为明显, 腹腔引流管间断引出血性液每天约 200ml。体检: T38.5°C, R22 次/分, P95 次/分, BP135 / 76mmHg。腹胀, 脐周中度压痛, 未扪及肿块, 肠鸣音减弱。血常规: 白细胞 $13.5 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞比例 0.83。关于该患者的护理, 以下错误的是 ()
- A.取低半坐卧位
B.予全胃肠外营养
C.充分负压引流
D.若引流管堵塞, 应高压冲洗
E.如行灌洗, 应用等渗盐水
- 159.一小肠瘘病人, 主诉口渴、尿少、厌食、恶心、软弱无力、脉细速。血红蛋白 160g / L、血钠 130mmol / L、CO₂CP 为 27mmol / L。应诊断为 ()
- A.高渗性脱水
B.等渗性脱水
C.低渗性脱水
D.代谢性酸中毒
E.代谢性碱中毒
- 160.患者, 女, 40 岁, 因急性肠梗阻频繁呕吐, 出现口渴、尿少、脱水征、血压偏低。进行液体疗法时应首先静脉滴注下列哪种液体 ()
- A.5%葡萄糖液
B.右旋糖酐
C.5%葡萄糖盐水
D.复方氯化钠
E.0.3%氯化钾
- 161.患者, 男性, 31 岁。有胃溃疡穿孔修补手术史, 3 天前出现腹痛、腹胀伴呕吐、肛门停止排便排气, 经检查诊断为肠梗阻, 现最重要的是应了解 ()
- A.梗阻的原因
B.梗阻的部位
C.梗阻的程度
D.梗阻的发生速度
E.梗阻是否绞窄
- 162.患者, 女性, 48 岁, 阑尾炎术后第二天, 为预防术后肠粘连的最关键措施为 ()
- A.给予半坐卧位
B.观察腹部情况
C.进行深呼吸运动
D.早期下床活动
E.合理增加营养
- 163.患者, 女, 28 岁, 诊断为阑尾周围脓肿, 患者行阑尾切除的时间应在体温正常后 ()
- A.1 个月
B.2 个月
C.3 个月
D.4 个月
E.6 个月
- 164.患者, 男, 56 岁, 1 天前出现转移性右下腹痛, 麦氏点有固定的压痛, 现腹痛突然加剧, 范围扩大, 腹部有肌紧张。应考虑是 ()
- A.单纯性阑尾炎
B.化脓性阑尾炎
C.坏疽性阑尾炎
D.阑尾周围脓肿
E.阑尾穿孔腹膜炎
- 165.患者, 男性, 25 岁, 诊断为化脓性阑尾炎。患者出现腹肌紧张, 说明炎症已累及 ()
- A.阑尾肌层
B.阑尾腔黏膜
C.脏层腹膜
D.壁层腹膜

E.盲肠

166.患者,男,20岁,以转移性右下腹痛10小时之主诉入院,右下腹有固定压痛点,临床诊断为急性阑尾炎,其提示后位阑尾的特殊体征是()

- A.右下腹有的痛的包块
- B.闭孔内肌试验阳性
- C.腰大肌试验阳性
- D.结肠充气试验阳性
- E.直肠指检右上方有触痛

167.患者,男,40岁。在路上行走时不慎绊倒,手掌、手腕部、膝盖部挫伤。局部处理方法,错误的是()

- A.局部制动
- B.抬高患肢
- C.血肿加压包扎
- D.早期局部热敷
- E.血肿若进行性增大,需切开止血

168.患儿,5岁。双上肢烧伤,其烧伤面积为()

- A.6%
- B.12%
- C.18%
- D.24%
- E.30%

169.患儿,7岁,开水烫伤。双下肢有水疱,剧痛,胸腹部为红斑。估计该儿童Ⅱ°烫伤面积是()

- A.20%
- B.41%
- C.42%
- D.46%
- E.59%

170.患者,男性,严重腹泻,表浅淡漠,反应迟钝。主诉全身无力,恶心、心悸,查血钠为140mmol/L,血钾2.8mmol/L,可能的诊断是()

- A.高渗性脱水
- B.等渗性脱水
- C.低渗性脱水
- D.高钾血症
- E.低钾血症

171.患者,男性,46岁,溃疡合并幽门梗阻,反复呕吐半个月,应考虑合并()

- A.代谢性酸中毒
- B.代谢性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒
- D.呼吸性碱中毒
- E.混合性酸中毒

172.患者,男性,25岁,高热3日未进食,自述口渴尿少。查体:口舌干燥,皮肤弹性差,眼窝凹陷,血清钠浓度为155mmol/L,尿比重1.029,应首先输入的液体为()

- A.3%氯化钠溶液
- B.5%碳酸氢钠溶液
- C.5%葡萄糖溶液
- D.5%葡萄糖氯化钠溶液
- E.平衡液

173.王女士,50岁,右上腹部疼痛1天,体温39℃,巩膜黄染,B型超声示胆总管结石。为警惕性急性重症胆管炎,病情观察中要特别注意()

- A.体温、面色
- B.血压、神志
- C.腹部体征
- D.恶心呕吐
- E.血白细胞计数

174.患者,男性,70岁,肝炎20年。近2个月来,肝区疼痛,食欲减退、进行性消瘦、肝呈进行性增大、质硬、面部有蜘蛛痣、腹膨隆。临床首先考虑的是()

- A.原发性肝癌
- B.继发性肝癌
- C.肝硬化
- D.慢性肝炎
- E.结核性腹膜炎

175.患者,男性,60岁,20年前曾患肝炎,近两个月来纳差、消瘦,肝区疼痛明显。查体:轻度黄疸,面部有蜘蛛痣、腹膨隆,肝肋下2cm、剑下4cm,质硬,压痛;脾肋下3cm,移动性浊音阳性,拟诊为肝癌。现首先应检测的是()

- A.血氨
B.甲胎蛋白
C.血清胆红素
D.血清白蛋白
E.血清 ALT 和 AST
- 176.对胆石症患者进行非手术治疗期间，发现腹部绞痛频繁发作，逐渐加重，黄疸更显著，血压下降，脉搏细速而弱，腹肌紧张。此时护士应该（ ）
A.进一步观察其病情变化
B.解痉止痛
C.纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
D.及时报告医生并做好术前准备
E.给予抗生素预防感染
- 177.女性，8岁，阵发性剑突下“钻顶样”痛半天，伴恶心、呕吐，既往有类似发作史。查体：T 37.5℃，剑突下深压痛，无腹肌紧张。拟诊为（ ）
A.肝内胆管结石
B.胆道蛔虫病
C.胆总管结石
D.急性胆管炎
E.胆囊结石
- 178.孙先生，41岁，有吸烟史20年。全麻下行腹腔镜胆囊切除术后已拔除气管内插管，患者意识模糊。目前最重要的护理是（ ）
A.保持呼吸道通畅
B.约束肢体活动
C.防止输液针头脱出
D.监测生命体征
E.做好保暖
- 179.胆道疾病的患者，进行辅助检查，下列哪项应首选（ ）
A.B超
B.静脉胆道造影
C.口服胆囊造影
D.经皮肝穿刺胆道造影
E.经内镜逆行胆胰管造影
- 180.赵某，男，43岁，缓慢性胆囊炎。护士嘱咐患者应用的饮食是（ ）
A.低盐
B.低脂肪
C.低蛋白
D.低糖
E.低碳水化合物
- 181.患者，女性，32岁，平卧患肢抬高70度~80度，持续60秒，如果出现麻木、疼痛、苍白或者蜡黄色者，提示（ ）
A.Pratt 试验阳性
B.Buerger 试验阳性
C.Trendelenburg 试验阳性
D.Perthes 试验阳性
E.腰交感神经阻滞试验阳性
- 182.患者，女性，39岁，行下肢静脉曲张剥脱术后，以下护理措施错误的是（ ）
A.术后弹性绷带包扎2周
B.绝对卧床休息1周
C.睡觉时抬高下肢30度
D.尽量穿宽松衣物
E.适当体育锻炼
- 183.患者，男性，42岁，稍长距离步行后感左小腿疼痛，肌肉抽搐而跛行，稍休息后症状消失，平时感觉左足发凉、怕冷、有麻木感，左足背动脉搏动减弱。应考虑（ ）
A.血栓性静脉炎
B.深静脉血栓形成
C.动脉粥样硬化症
D.血栓闭塞性脉管炎（局部缺血期）
E.血栓闭塞性脉管炎（营养障碍期）
- 184.患者，女性，53岁，中学教师，双下肢浅静脉蜿蜒扩张、迂曲，其病因最有可能为（ ）
A.下肢静脉瓣膜缺陷
B.重体力劳动
C.长时间站立
D.下肢静脉壁薄弱

- E.习惯性便秘
- 185.患者，男性，38岁，血栓性闭塞性脉管炎，下列护理措施不正确的是（ ）
- 温水洗脚，保持足部清洁、干燥
 - 术后制动期间足部适当运动
 - 用热水袋热敷患肢，促进血液循环
 - 坚持多走路，以不出现疼痛为限
 - 有效镇痛，防止血管收缩
- 186.患者，男性，53岁，理发员，下肢酸胀、沉重5年，活动或休息后减轻。体格检查：小腿内侧有蚯蚓团块，足靴区有色素沉着。护士对该病人进行病情评估，最有可能的诊断是（ ）
- 小隐静脉曲张
 - 大隐静脉曲张
 - 深静脉血栓形成
 - 血栓闭塞性脉管炎
 - 动脉硬化性闭塞症
- 187.李女士，53岁，深静脉血栓抗凝治疗期间，测得凝血时间22分钟，有轻度牙龈出血的护理措施最恰当的是（ ）
- 减少抗凝药物剂量
 - 请示医师调整用量
 - 维持原用药剂量
 - 立即停止用药
 - 鼓励病人下地活动
- 188.患者，男性，50岁，动脉硬化性闭塞症患者，表现为缺血性静息痛，皮肤苍白，跛行距离缩短，跛行疼痛加重，下肢皮肤干燥、皱缩、汗毛稀疏，指(趾)甲生长缓慢、粗糙、变形，该患者为临床分期中的（ ）
- 局部缺血期
 - 营养障碍期
 - 组织坏死期
 - 晚期
 - 痉挛期
- 189.患者，女性，55岁，深静脉血栓形成术后出现胸痛、呼吸困难、血压下降等症状，此时正确的护理措施是（ ）
- 侧卧位
 - 深呼吸
 - 避免咳嗽及剧烈翻动
 - 给予低浓度氧气吸入
 - 测凝血时间
- 190.患者，男性，40岁。左下肢大隐静脉曲张，为明确深静脉是否通畅，需（ ）
- 检测浅静脉瓣功能
 - 检测交通支瓣膜功能
 - 做Perthes试验
 - 检测皮肤温度
 - 查血小板计数
- 191.患者，男性，40岁。吸烟多年，脉管炎已有1年余，现已发展成疼痛严重不能入睡。检查局部苍白干冷，肌肉萎缩，足背动脉搏动消失。初步诊断为（ ）
- 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期
 - 血栓闭塞性脉管炎营养障碍期
 - 血栓闭塞性脉管炎坏疽期
 - 深部静脉血栓形成
 - 大动脉栓塞
- 192.患者，女性，51岁。右下肢肿胀伴疼痛5天，入院后B超示右股静脉血栓形成，其最严重的并发症为（ ）
- 下肢皮肤感染
 - 下肢严重水肿，坏死
 - 丧失劳动能力
 - 肺动脉栓塞
 - 下肢静脉曲张
- 193.患者，男性，58岁。因下肢静脉曲张行高位结扎及剥脱术，术后4小时因站立排尿，小腿伤口处突然出血不止。紧急处理方法是（ ）
- 用止血带
 - 于站立位包扎
 - 钳夹结扎止血
 - 指压止血
 - 平卧抬高患肢，加压包扎

- 194.患者，男性，37岁，胸外伤后呼吸困难，发绀，脉快，体检时见胸壁有一约3cm长开放性伤口，呼吸时伤口处发出嘶嘶声音，伤侧呼吸音消失，听诊呈鼓音。首先考虑为（ ）
- 闭合性气胸
 - 开放性气胸
 - 张力性气胸
 - 损伤性气胸
 - 机化性气胸
- 195.患者，女性，65岁，因外伤造成左侧胸部4~7肋骨多处骨折，呼吸时患处可能出（ ）
- 呼气时外凸吸气时正常
 - 吸气和呼气时均外凸
 - 吸气时外凸呼气时内陷
 - 吸气和呼气时均内陷
 - 吸气时内陷呼气时外凸
- 196.患者，女性，31岁，因外伤致张力性气胸，行胸腔闭式引流，其引流瓶的正确位置是低于胸壁引流口平面（ ）
- 10~20cm
 - 20~40cm
 - 40~60cm
 - 60~100cm
 - 100cm以上
- 197.患者，女性，49岁，从高处坠落被树枝刺穿胸壁，致开放性气胸，行胸腔闭式引流，引流管放置的正确位置是（ ）
- 锁骨中线第2肋间
 - 锁骨中线第3肋间
 - 锁骨中线第4~5肋间
 - 腋中线和腋后线之间第6或第7肋间
 - 腋中线6~8肋间
- 198.患者，女性，28岁，被车辆撞击胸部，致胸部损伤，B超示胸腔大量积液，胸腔闭式引流管放置的正确位置是（ ）
- 锁骨中线第2肋间
 - 锁骨中线第3肋间
 - 锁骨中线第4~5肋间
 - 腋中线和腋后线之间第6或第7肋间
 - 腋前线6~8肋间
- 199.患者，女性，41岁，被锋利物刺伤胸壁，胸壁伤口可闻及空气进出的吸吮样声音，应采取的首要急救措施是（ ）
- 封闭伤口
 - 清创
 - 穿刺排气
 - 放置胸腔闭式引流管
 - 吸氧
- 200.患者，男性，52岁，胸部被撞击后出现极度呼吸困难并有严重的皮下气肿，其最可能的损伤类型是（ ）
- 肺损伤
 - 多根多处肋骨骨折
 - 张力性气胸
 - 血胸
 - 创伤性窒息
- 201.患者，女性，39岁，因钝器敲击胸部后出现极度呼吸困难，并在颈部和前胸部触及捻发感，应采取的紧急处理措施是（ ）
- 剖胸探查
 - 固定胸壁
 - 穿刺排气
 - 立即封闭胸壁伤口
 - 抗感染治疗
- 202.患者，男性，32岁，左侧胸部多根多处肋骨骨折，体格检查：极度呼吸困难，发绀，周身冷汗，BP 69/42mmHg，左胸饱满，气管向右侧偏移，叩诊呈鼓音，首要的处理方法是（ ）
- 剖胸探查
 - 吸氧
 - 胸腔穿刺排气
 - 输血、输液
 - 胸廓固定
- 203.患者，男性，26岁，因肺炎合并右侧脓胸，多次胸腔穿刺，抽出稠厚脓液，发热等感

染中毒症状难控制。应采取的治疗方法是 ()

- A.继续胸穿抽脓, 注入敏感抗生素
- B.早日剖胸手术
- C.更换胸穿部位抽脓
- D.胸腔闭式引流术, 全身用敏感抗生素
- E.继续胸穿抽脓, 全身用敏感抗生素

204.患者, 女性, 31 岁, 肺炎已 1 周, 体温正常 2 日, 昨夜突然高热、呼吸急促、咳痰, 胸痛。体格检查: 右侧肋间隙饱满, 语颤音减弱。辅助检查: 胸部 X 线示右侧胸腔呈现大片浓密阴影。血常规示白细胞计数 $16 \times 10^9/L$, 中性粒细胞比值 85%。右侧胸腔穿刺抽出少许稀薄脓性液体。临床诊断考虑为急性脓胸。以下护理措施不正确的是 ()

- A.指导病人做胸式深呼吸
- B.物理降温
- C.适当镇痛
- D.协助病人定时翻身
- E.如予引流, 引流口周围皮肤涂氧化锌软膏

205.患者, 男性, 21 岁, 左前胸部刀刺伤 2 小时后, 感胸闷气短。查体: 面色苍白, 四肢湿冷, 心率 120 次/分, 血压 80/70mmHg, 颈静脉怒张, 首先考虑 ()

- A.胸内大出血
- B.血气胸
- C.开放性气胸
- D.肺裂伤
- E.急性心包填塞

206.患者, 女性, 56 岁, 因刺激性干咳 5 个月, 视物不清 10 天入院, 胸前 X 线示右上肺 4cm×2.5cm 大小的不规则阴影, 医师称此病变造成了 Horner 综合征, 下列表现不属于 Horner 综合征的是 ()

- A.同侧上眼睑下垂
- B.声音嘶哑
- C.眼球内陷
- D.面部无汗
- E.瞳孔缩小

207.患者, 男性, 50 岁, 胸部 CT 检查示右下肺叶直径 3.4cm、不规则高密度肿块阴影, 同侧肺门淋巴结肿大, 直径约 1.1cm, 支气管纤维镜检查鳞癌, 行全肺切除术。该病人术后第 1 日, T 37.5°C, P 88 次/分, R 22 次/分, BP 120/80mmHg, CVP1.57kpa (16cmH₂O), 尿液的颜色和量正常, 下列护理措施中正确的是 ()

- A.保持胸腔引流管通畅使之呈全开放状态
- B.控制钠盐摄入
- C.尽快引流其胸腔积血、积液, 预防感染
- D.取健侧卧位
- E.输液速度控制在 50 滴/分左右

208.患者, 男性, 42 岁, 肺切除术后发生了支气管胸膜瘘, 以下说法错误的是 ()

- A.多发生在术后 1 周
- B.由于支气管残端血运不良, 支气管缝合处破裂引发
- C.表现为从胸腔引流管持续引流出大量气体
- D.亚甲蓝注入胸膜腔后, 病人可咳出蓝色痰液
- E.一旦发生, 病人应健侧卧位, 使用抗生素抗感染

209.患者, 男性, 30 岁, 因车祸引起右胸部损伤, 极度呼吸困难, 发绀, 肺呼吸音消失, 并有严重的皮下气肿, 判断为张力性气胸。急救应立即 ()

- A.吸氧
- B.快速静脉输液
- C.输血
- D.气管切开
- E.胸腔穿刺排气

210.张某, 因墙倒塌砸伤右前胸部, 胸痛, 局部有明显反常呼吸运动。X 线检查右前胸部 4~8 肋均为多处骨折。无血气胸。急救首选 ()

- A.充分给氧
- B.输血、输液
- C.镇静、镇痛
- D.局部加压包扎固定
- E.应用抗生素

211.患者, 男性, 28 岁。右前胸部损伤后, 有胸痛、轻度呼吸困难。X 线: 右第 3、4 肋骨骨折, 无移位, 肺压缩 20%, 治疗应选 ()

- A.镇静、镇痛、对症治疗
- B.输血、输液
- C.胸腔闭式引流

- D.胸膜腔穿刺抽气
E.牵引固定
- 212.患者，男性，24岁，胸外伤引起血气胸，出现脉搏加快、四肢湿冷、血压下降等表现，治疗后好转，2小时后患者突然出血量增大，此时护理人员应首选的治疗措施是（ ）
- A.作剖胸止血的准备
B.加快补液速度
C.监测生命体征
D.安慰患者及家属，缓解紧张情绪
E.做好胸腔闭式引流的护理
- 213.患者，男性，30岁，外伤致右侧胸腔大量血胸，伤后第5周患侧肺仍受压萎缩，采取的最佳治疗方法是（ ）
- A.胸腔穿刺抽血
B.输血、输液
C.开胸清除血凝块
D.胸膜纤维剥脱术
E.胸腔闭式引流
- 214.患者，女性，胸部受伤后胸痛、气促，体检局部有压痛，挤压前后胸时伤侧胸部压痛处疼痛，有骨擦音，听诊伤侧呼吸音稍有减弱，健侧呼吸音清晰，气管居中，心率96次/分，血压120/80mmHg，首先考虑为（ ）
- A.肋骨骨折
B.张力性气胸
C.心包填塞
D.纵隔气肿
E.创伤性湿肺
- 215.患者，男性，36岁，胸部外伤后，第4~7肋骨各有2处以上闭合性骨折，无气胸体征，其不会出现的病理生理改变是（ ）
- A.反常呼吸运动
B.纵隔扑动
C.胸膜腔负压消失
D.回心血量下降
E.缺氧、二氧化碳潴留
- 216.患者，男性，30岁，建筑工人，半小时前躯干被水泥预制板压伤。主诉胸痛、胸闷、气急，烦躁不安，此时护理体检特别应注意的是（ ）
- A.胸部呼吸运动是否对称
B.胸部挤压试验阳性伴骨摩擦音
C.胸腹部开放性损伤
D.假式呼吸消失
E.血压、脉搏、呼吸数据变化
- 217.患者，男性，45岁，左侧胸部损伤后引起左侧血气胸，经胸腔闭式引流后，下列哪项是拔管的最好指标（ ）
- A.X线片显示肺已经完全复张
B.胸腔闭式引流长管内水柱波动小于1cm
C.胸腔闭式引流量连续两天少于50ml，夹管24小时后无异常
D.水封瓶内无气泡冒出或每日引流量少于50ml，X线证实肺已经完全复张
E.胸腔闭式引流长管内水柱停止波动，即可拔管
- 218.在开展社区护理时，白女士诉其患内痔多年，经常便秘。护士对她的健康指导中，不妥的措施是（ ）
- A.鼓励多喝水
B.多食水果蔬菜
C.坚持每日定时排便
D.每日服用泻药
E.坚持适当体育运动
- 219.患者，男性，60岁，行肺段切除术后2小时，患者自觉胸闷，呼吸急促，测血压、脉搏均正常，见水封瓶内有少量淡红色液体，水封瓶长玻璃管内的水柱不波动。考虑为（ ）
- A.呼吸中枢抑制
B.肺水肿
C.胸腔内出血
D.引流管阻塞
E.开放性气胸
- 220.患者，男性，39岁，车祸致肋骨骨折，未特殊处理，今日起床后疼痛加重，翻身咳嗽加重，患者不愿活动，此时应采取的最佳处理措施为（ ）
- A.吸氧
B.口服止痛剂

- C.卧床体息
D.肋间神经封闭
E.输液、镇定
- 221.患者，男性，26岁。右胸部外伤后，胸前壁出现反常呼吸运动，应首先考虑为（ ）
A.损伤性血胸
B.损伤性气胸
C.损伤性血气胸
D.单根单处肋骨骨折
E.多根多处肋骨骨折
- 222.患者，男性，25岁，与人打架胸部受伤，应进行剖胸探查的情形不包括（ ）
A.肋骨骨折，同时肺压缩为原来 2/3
B.胸腔内进行性出血
C.心脏损伤
D.胸腹联合伤
E.胸内存留较大异物
- 223.患者，男性，35岁，胸外伤引起血胸，判断胸腔内是否存在持续性出血的重要依据（ ）
A.白细胞计数升高
B.体温升高
C.患者经补液治疗后，血压回升
D.胸部叩诊呈鼓音
E.胸腔闭式引流每小时引流量超过 200ml
- 224.患者，男性，20岁，右侧胸部损伤后，皮下气肿愈来愈重，呼吸困难，咳泡沫血痰，脉搏细速，血压下降，右侧呼吸音消失。X线检查见液平面。此患者为（ ）
A.张力性气胸
B.闭合性气胸
C.张力性气胸和血胸
D.开放性气胸
E.损伤性气胸
- 225.患者，男性，27岁，外伤后出现休克、昏迷、脾破裂、开放性气胸、开放性胫腓骨骨折等紧急情况，抢救时首先应（ ）
A.输血、输液
B.胸腔穿刺减压排气
C.立即开胸手术
D.气管插管辅助呼吸
E.封闭胸壁伤口
- 226.患者，男性，车祸致左胸部疼痛、呼吸困难 1 小时入院。护理体检发现左胸部饱满，呼吸音消失，胸部叩诊鼓音。气管明显移位，颈部肿胀，触及有捻发音，为确定有无皮下气肿，首选的检查是（ ）
A.胸部 X 线片
B.胸部 CT
C.胸部 MRI
D.B 超
E.胸腔穿刺
- 227.患者，男性，53岁，高血压病史 10 年，糖尿病史 5 年，吸烟 20 年。今晨于用力排便后出现右侧肢体瘫痪，伴头痛，无呕吐，口齿不清，病理反射阳性，CT 示高密度影。导致该患者此次发病的相关因素中不可干预的因素是（ ）
A.高血压病史
B.用力排便
C.年龄
D.糖尿病史
E.吸烟
- 228.患者，男性，30岁，司机。因车祸前额及眶部撞伤，眼部青肿，结膜下出血，鼻部不断流出血性液体，考虑是（ ）
A.颅后窝骨折
B.颅中窝骨折
C.颅前窝骨折
D.鼻骨骨折
E.面部挫伤
- 229.患者，男性，20岁。行走时不慎被石块打伤头部，经查颅骨凹陷骨折，头皮裂伤 6cm，X线摄片见直径约 2cm 骨片凹陷 0.5cm。当前除伤口疼痛外未见其他异常，无呕吐、无癫痫，下列门诊处理不必要的是（ ）
A.清创术
B.缝合术
C.抗生素

D.TAT

E.禁食

230.患者男性, 48 岁。头部外伤, 伤口出血, 经自己在家中简单包裹, 来院急诊, 到医院时已是伤后 12 小时。检查头顶伤口 6cm 深达皮下, 创口整齐较清洁, 未见其他异物。以下处理不妥的是 ()

A.清创后伤口开放

B.TAT 注射

C.用抗生素

D.伤口分帽状腱膜及皮肤两层缝合

E.定期复查

231.患儿, 男, 2 岁 4 个月。出现发热、头痛、呕吐、烦躁, 诊断为化脓性脑膜炎。下列不正确的护理措施为 ()

A.严密观察患儿生命体征及瞳孔的变化

B.记录 24 小时出血量, 防止体液不足

C.保持室内安静, 避免一切刺激

D.为防止患儿呕吐, 应减少患儿食物的摄入

E.给予 20%甘露醇, 降低颅内压

232.患者, 女性, 45 岁, 因脑肿瘤、颅内压增高, 行脑室引流术后 3 小时, 引流管内无脑脊液流出, 不正确的处理方法是 ()

A.将引流袋降低

B.报告医师

C.将引流管轻轻旋转

D.生理盐水冲洗

E.必要时换管

233.患者, 女性, 31 岁。原发性甲状腺功能亢进, 术前服碘剂及硫氧嘧啶类药物无效, 改用普萘洛尔, 效果好。术前行苯巴比妥及阿托品, 术中心率增至 170 次/分, 原因可能是 ()

A.休克早期

B.手术刺激

C.甲状腺危象早期

D.精神紧张

E.阿托品作用

234.患者, 女性, 30 岁, 甲状腺大部切除术后第 2 天, 出现面肌和手足持续性痉挛, 伴疼痛, 持续时间 10~15 分钟不等, 护士应备好 ()

A.苯巴比妥

B.氯化钾

C.碘化钠

D.碳酸氢钠

E.氯化钙

235.患者, 男性, 36 岁, 甲状腺大部切除手术后 6 小时出现憋气, 逐渐发展为呼吸困难, 敷料上有少量血液浸透, 应首先考虑发生了 ()

A.喉头水肿

B.气管塌陷

C.痰液堵塞气道

D.切口内出血

E.双侧喉返神经损伤

236.患者, 女性, 43 岁, 被汽车撞倒, 头部受伤, 唤之睁眼, 回答问题错误, 针刺肢体回缩, 其格拉斯哥昏迷评分为 ()

A.15 分

B.12 分

C.11 分

D.8 分

E.5 分

237.冯先生, 用力排便后出现肛门剧痛, 无便血。检查见肛管皮下暗紫色肿块, 有触痛。临床诊断首先考虑的是 ()

A.嵌顿性内痔

B.血栓性外痔

C.肛旁皮下脓肿

D.肛裂

E.直肠息肉

238.患者, 男, 25 岁, “颅脑外伤”入院。护士对处于昏迷状态的患者评估后, 确认患者以下健康问题, 其中应优先解决的是 ()

A.大便失禁

B.沟通障碍

- C.活动无耐力
D.皮肤完整性受损
E.清理呼吸道无效
- 239.患者，女性，32岁，车祸伤及头部后，眼眶青紫，鼻部流出无色清亮液体。此病人可能受损伤的神经是（ ）
A.嗅神经
B.展神经
C.听神经
D.面神经
E.滑车神经
- 240.患者，女性，33岁，头部损伤后，乳突部皮下和咽结膜下有淤血，耳部有脑脊液流出，听力丧失，眩晕。正确的处理是（ ）
A.应用利尿脱水剂
B.给予镇静镇痛药
C.用棉球堵塞外耳道
D.头低足高位卧床休息
E.用生理盐水棉球清洁外耳道
- 241.患者，男性，52岁，骑车摔倒，头部触地，当场昏迷，送至急诊，体格检查：神志昏迷，呼之不应，瞳孔无明显改变，对光反射存在，血压正常，约20分钟醒来，诉头疼头晕，对外伤经过无记忆，神经系统检查基本正常，初步诊断刘先生发生了（ ）
A.脑震荡
B.脑挫裂伤
C.脑干损伤
D.硬脑膜外血肿
E.硬脑膜下血肿
- 242.患者，男性，29岁，交通事故，头部外伤，当即昏迷被送至医院。CCS评分6分，住院治疗，约伤后15分钟醒来，神志恢复正常。住院观察期间特别警惕出现（ ）
A.血压下降
B.再次昏迷
C.全身抽搐
D.瞳孔双侧开大
E.呼吸骤停
- 243.患者，女性，40岁，行走时被汽车撞伤，当即昏迷，20分钟后清醒，对发生事件描述不清诉头痛、头晕。神志清醒，病理征未引出，CT未见异常。目前对该病人的主要护理措施是（ ）
A.嘱卧床休息
B.高蛋白饮食
C.应用止吐剂
D.应用镇痛药物
E.应用脱水剂
- 244.患者，女，68岁。头部外伤后头痛，呕吐三小时后入院。血压100/70mmHg，头颅CT提示硬膜外血肿，护士告知患者要保持大便通畅，勿用力排便，其主要目的是（ ）
A.防止血压升高
B.预防痔疮
C.缓解头痛
D.防止出血
E.预防脑疝
- 245.患者，女，35岁，外伤后5小时入院，来院时评估患者神志清楚，可见患者双眼呈“熊猫眼症”，鼻腔内流出无色透明清亮液体，患者最可能的诊断是（ ）
A.颅中窝骨折
B.颅后窝骨折
C.枕骨骨折
D.颞骨骨折
E.颅前窝骨折
- 246.患者，女性，32岁，因头痛1年半，头痛加重伴有喷射样呕吐2个月入院。CT示左顶叶肿瘤。行开颅术后第2天病人意识清醒后又逐渐嗜睡、反应迟钝，最终昏迷。该病人可能出现了（ ）
A.脑脊液漏
B.颅内出血
C.颅内积液
D.假性囊肿
E.感染
- 247.患者，男性，58岁，因诊断为“颅内肿瘤”入院。护士将其床头抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，其主要目的是（ ）
A.有利于改善心脏功能

- B.有利于改善呼吸功能
 - C.有利于颅内静脉回流
 - D.有利于鼻饲
 - E.防止呕吐物误入呼吸道
- 248.患者，男性，38岁。车祸致颅中窝骨折，第4天出现高热、头痛、意识障碍，脑膜刺激征阳性。应考虑（ ）
- A.颅内压过高
 - B.颅内血肿
 - C.颅内感染
 - D.伤口感染
 - E.脑水肿
- 249.患者男，24岁。因“车祸伤3小时”入院，伤后呼之不应，半小时后清醒，20分钟后患者再度出现昏迷，具有典型的“中间清醒期”，查体：体温36.8℃，脉搏62次/分，血压165/75mmHg，呼吸22次/分，最可能的诊断是（ ）
- A.硬膜下血肿
 - B.颅内血肿
 - C.头皮血肿
 - D.硬膜外血肿
 - E.脑挫裂伤
- 250.患者，男性，18岁。头部遭受钝性打击，整个头皮形成血肿，触之较硬，有明显波动，诊断为（ ）
- A.皮下血肿
 - B.骨膜下血肿
 - C.硬脑膜外血肿
 - D.帽状腱膜下血肿
 - E.硬脑膜下血肿
- 251.脑出血患者，45岁，入院2d，一直处于浅昏迷状态，颅内压继续增高，生命体征尚可，心肾功能良好，脑CT示小脑出血血肿20ml左右，侧脑室有扩大征象，采取何种措施最合适（ ）
- A.继续内科用药降颅压
 - B.降血压
 - C.鼻饲以保证营养
 - D.手术清除血肿
 - E.使用止血药
- 252.患者，男性，70岁。因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷1小时，清醒后诉头痛，有呕吐。入院8小时，仍未排尿，主诉下腹胀痛。查体见下腹膀胱区隆起，耻骨联合上叩诊呈实音。目前其主要护理问题是（ ）
- A.下腹疼痛
 - B.尿潴留
 - C.体液过多
 - D.潜在呼吸道感染
 - E.有皮肤完整性受损的危险
- 253.患者，男性，18岁。因车祸致头部受伤，伤后当即昏迷20分钟，清醒后诉头痛。脑震荡的临床特点还具有（ ）
- A.情绪不稳定
 - B.逆行性健忘
 - C.头痛，呕吐
 - D.神经系统阳性体征
 - E.生命体征改变
- 254.患者男，50岁，应钝器击伤头部1小时入院。患者昏迷，呕吐，双侧瞳孔不等大，血压180/102mmHg。行硬膜下血肿清除术+碎骨片清除术，留置引流管送回病房。术后引流管护理正确的措施是（ ）
- A.每天消毒引流管
 - B.保持引流管通畅
 - C.脱出要及时送入
 - D.定时冲洗引流管
 - E.每天更换引流管
- 255.患者，女性，26岁。诊断为甲状腺功能亢进症入院，护士为其行基础代谢率测定，时间宜在（ ）
- A.下午6点、餐后和静卧
 - B.清晨、空腹和静卧
 - C.下午4点、静卧
 - D.午间12点、餐后和静卧
 - E.下午2点、静卧

256. 黄某，女性，36岁，行甲状腺大部分切除术后3天，出现手足疼痛，指尖针感并有轻微抽搐，护士应备好（ ）
- 氯化钾
 - 苯巴比妥
 - 碘化钠
 - 碳酸氢钠
 - 葡萄糖酸钙
257. 患者，女性，40岁，甲亢行甲状腺大部分切除术，术后第2天，护士在与其交流时发现声音嘶哑。可能是由于（ ）
- 喉上神经内外支损伤
 - 喉上神经内支损伤
 - 喉上神经外支损伤
 - 两侧喉返神经损伤
 - 一侧喉返神经损伤
258. 患者，女性，35岁，因甲亢行甲状腺大部切除术。术后进流质时，出现呛咳，可能是术中损伤了（ ）
- 喉上神经内支
 - 喉上神经外支
 - 单侧喉返神经
 - 双侧喉返神经
 - 甲状旁腺
259. 患者，女性，33岁，甲亢术后痊愈出院，护士对她进行康复指导，下列不正确的是（ ）
- 术后1个月恢复正常劳动
 - 练习颈部活动
 - 注意有无甲亢复发
 - 注意有无甲状腺功能低下
 - 定期复查
260. 患者，女性，35岁，在甲状腺次全切除后4小时，突感呼吸困难、颈部肿胀、口唇发绀，紧急处理第一步应（ ）
- 气管切开
 - 立即拆开颈部缝线，去除血块
 - 吸氧
 - 请麻醉医师插管
 - 注射呼吸兴奋剂
261. 患者，女性，35岁，颈部甲状腺弥漫性肿大，出现霍纳综合征。该患者发生霍纳综合征的原因是肿大的甲状腺压迫（ ）
- 气管
 - 食管
 - 颈部大静脉
 - 颈交感神经丛
 - 喉返神经
262. 患者，女性，17岁，因甲状腺肿大来院就医。查体：甲状腺Ⅱ度肿大，未触及结节。TSH在正常范围，甲状腺功能检查正常。该患者可能的诊断是（ ）
- 甲状腺功能亢进症
 - 甲状腺功能减退症
 - 单纯性甲状腺肿
 - 慢性甲状腺炎
 - 亚急性甲状腺炎
263. 患者，男性，25岁。因车祸致右侧胸部损伤，1小时后送至急诊科，能判断患者是开放性气胸典型的临床表现是（ ）
- 呼吸困难
 - 胸部听诊呈鼓音
 - 胸部有捻发音
 - 胸壁伤口处可听到空气出入的吸吮声
 - 气管向健侧移动
264. 患者，男性，35岁。因胸部外伤导致右侧气胸，经胸腔闭式引流后，达到拔管指征。拔出胸腔闭式引流管时，应嘱患者（ ）
- 深吸气后屏气
 - 深呼气后屏气
 - 正常呼吸
 - 浅吸气后屏气
 - 浅呼气后屏气
265. 张力性气胸时首要的急救处理措施是（ ）

- A.气管插管辅助呼吸
 B.输血、补液抗休克
 C.立即排气，降低胸膜腔内压力
 D.剖胸探查
 E.气管切开辅助呼吸
- 266.患者男性，40岁，破伤风住院，全身肌肉紧张性收缩，阵发性痉挛，治疗的中心环节是（ ）
 A.清除毒素来源，彻底清除坏死组织和异物
 B.用青霉素
 C.用镇静解痉药
 D.中和游离毒素
 E.防治并发症
- 267.患者，女，58岁，体重60Kg，被沸水烫伤颈部、左上肢，胸腹部，双小腿和双足，创面布满水疱，有剧痛，右大腿散在约5个掌面烧伤，创面焦痂呈皮革样，不痛。伤后第一个24小时补液总量为（ ）
 A.4500ml
 B.5000ml
 C.5500ml
 D.6000ml
 E.6500ml
- 268.患者女性，45岁，因饱餐后现右下腹疼痛而入院，诊断为胆囊结石，应忌食（ ）
 A.蛋白食物
 B.纤维食物
 C.高热量食物
 D.油腻食物
 E.高维生素食物
- 269.男性，67岁，患直肠脱垂1年，随着病情加重，站立时常有粘液从肛门流出，符合该病人目前病情的护理问题是（ ）
 A.疼痛
 B.活动无耐力
 C.有体液不足的危险
 D.有皮肤完整性受损的危险
 E.营养失调：低于机体需要量
- 270.手术前应行清洁灌肠的是（ ）
 A.结肠癌根治术
 B.胃大部切除术
 C.阑尾切除术
 D.脊椎手术
 E.十二指肠手术
- 271.患者，女性，64岁。食管癌收治入院，准备行食管-胃吻合术，术前护理人员向其家属提供临床教育时，下列不正确的是（ ）
 A.术前常规留置胃管
 B.术前需清洁灌肠
 C.术后最严重的并发症是吻合口瘘
 D.术后可出现进食后呼吸困难
 E.术后应严格按医嘱进食
- 272.血栓闭塞性脉管炎Ⅱ期的典型表现是（ ）
 A.静息痛
 B.间歇性跛行
 C.足背动脉搏动减弱
 D.患肢麻木发凉
 E.足趾溃疡坏死
- 273.患者，男性，33岁，施工塌方致左大腿骨折。接诊时首先应注意的并发症是（ ）
 A.内脏损伤
 B.感染
 C.骨筋膜室综合征
 D.休克
 E.愈合障碍
- 274.尿路结石叙述正确的是（ ）
 A.大多发生在女性
 B.结石形成与气候无关
 C.尿酸结石易在碱性尿液中形成
 D.磷酸钙结石易在碱性尿液中形成
 E.不会引起泌尿系统恶性变

- 275.女, 46 岁, 左下肢静脉曲张 8 年, 拟行手术治疗。下列哪项试验可决定能否做大隐静脉剥脱术或结扎术 ()
- 浅静脉瓣膜功能试验
 - 深静脉瓣膜功能试验
 - 交通支瓣膜功能试验
 - 深静脉通畅试验
 - 浅静脉通畅试验
- 276.患者, 男性, 24 岁, 鼻部有一疖, 局部挤压后出现头痛、寒战、高热, 鼻、眼部红肿,血白细胞数增高, 护理评估时首先应考虑 ()
- 颅内海绵窦静脉炎
 - 脑脓肿
 - 面部蜂窝织炎
 - 化脓性脑膜炎
 - 败血症
- 277.患者, 男性, 70 岁。拟行食管癌切除、食管胃吻合术, 为预防术后发生吻合口瘘, 术前消除食道炎症的护理措施是 ()
- 餐后口服新霉素
 - 禁食
 - 营养支持
 - 全身使用抗生素
 - 留置胃管
- 278.患者, 男性, 35 岁。脑外伤致小脑幕切迹疝, 行冬眠低温治疗。护理中最重要的是 ()
- 防止出现寒战
 - 防止肺部感染
 - 降温不宜太快
 - 按时检查生命体征和神志
 - 协助翻身
- 279.患者, 男性, 36 岁, 因颅内压增高, 头痛逐渐加重, 行腰椎穿刺脑脊液检查时突发急性枕骨大孔疝。其最主要表现为 ()
- 意识障碍
 - 呼吸和循环障碍
 - 瞳孔散大
 - 肢体瘫痪
 - 瞳孔缩小
- 280.患者女性, 34 岁, 行甲状腺大部切除术, 术后 5 小时出现呼吸困难甚至窒息症状, 紧急措施应 ()
- 注射止血剂
 - 氧气吸入
 - 拆除缝线去除血块
 - 气管插管
 - 加压包扎
- 281.男, 65 岁, 因急性绞窄性肠梗阻死亡。其死亡的最主要原因是 ()
- 水和电解质失调
 - 肠道内出血
 - 急性肾功能障碍
 - 腹膜炎, 感染性休克
 - 代谢性酸中毒
- 282.患者女, 37 岁, 确诊为急性出血坏死性胰腺炎。下列哪一项病人不会出现 ()
- 黄疸
 - 血性腹水
 - 神志模糊和谵妄
 - 血糖 $> 11.1\text{mmol/L}$
 - 血钙 $> 1.87\text{mmol/L}$
- 283.病人, 男, 36 岁, 搬运工人, 站立时阴囊部位出现肿块, 呈梨形, 平卧时可还纳, 体检发现外环扩大, 嘱病人咳嗽时, 指尖有冲击感, 平卧回纳肿块后, 手指压迫内环处, 站立咳嗽, 肿块不再出现。为避免术后疝的复发, 术前准备中最重要的是 ()
- 治疗便秘
 - 备皮
 - 排尿
 - 灌肠
 - 麻醉前用药
- 284.患者, 女, 48 岁, 诊断为左下肢静脉曲张, 检查时在大腿中部扎止血带, 松紧适度能阻断浅静脉血流, 嘱病人快速下蹲运动 10 次, 如曲张静脉明显减退, 说明 ()

- A.深静脉交通支瓣膜功能不全
 B.大隐静脉入股静脉处瓣膜功能不全
 C.大隐静脉入股静脉处瓣膜功能良好
 D.深静脉通畅良好
 E.深静脉阻塞
- 285.患者，男，58岁，1年前行结肠癌根治术，术后反复出现腹部轻度胀痛，伴恶心，5小时前吃2支香蕉后突然出现腹部剧烈胀痛，并呕吐数次，呕吐物为胃内容物。此病人最可能的诊断是（ ）
 A.急性肠扭转
 B.急性肠套叠
 C.急性肠穿孔
 D.急性粘连性肠梗阻
 E.急性绞窄性肠梗阻
- 286.患者，男，28岁，急性阑尾炎入院。下列哪一体征不会出现（ ）
 A.结肠充气试验阳性
 B.腰大肌试验阳性
 C.麦氏点压痛
 D.阑尾压痛
 E.墨菲征阳性
- 287.患者，男，38岁，反复肛门周围肿痛、流脓血，诊断为肛瘘。行瘘管切开术。此肛瘘应是（ ）
 A.低位肛瘘
 B.单纯性肛瘘
 C.高位肛瘘
 D.复杂性肛瘘
 E.外瘘
- 288.患者，女，54岁，胆囊切除、胆总管切开取石、T形管引流术18天拔除T形管。拔除后观察病人食欲，大便色泽和黄疸消退情况外，同时应注意的是（ ）
 A.血压，脉搏
 B.有无恶心，呕吐
 C.神志
 D.有无腹痛和发热
 E.尿量
- 289.患者，男性，28岁，右腰部撞伤致局部疼痛，肿胀，有血尿，考虑有肾损伤，其最严重的损伤类型是（ ）
 A.肾挫伤
 B.肾盂部分裂伤
 C.肾皮质部分裂伤
 D.肾全层裂伤
 E.肾蒂损伤
- 290.患者，女性，43岁，骨盆骨折后有少量肉眼血尿，试插尿管可顺利入膀胱，注射生理盐水200ml，但仅抽出50ml，应考虑是（ ）
 A.后尿道损伤
 B.膀胱损伤并后尿道断裂
 C.前尿道损伤
 D.膀胱破裂
 E.输尿管下段破裂
- 291.患者，男性，58岁，确诊为直肠癌。行Miles手术，术后人工肛门开放初期，病人宜采取的体位是（ ）
 A.左侧卧位
 B.右侧卧位
 C.平卧位
 D.俯卧位
 E.仰卧中凹位
- 292.患者，女性，28岁，颅前窝骨折伴脑脊液鼻漏，颅底护理中禁止鼻滴药、冲洗和堵塞是为了防止（ ）
 A.脑疝形成
 B.颅内压增高
 C.头痛
 D.颅内继发感染
 E.脑脊液流失
- 293.患者，女性，21岁，坠楼后额部着地，确诊为颅底骨折。首选治疗措施是（ ）
 A.保守治疗
 B.手术修补骨折片
 C.手术摘除骨折片
 D.手术去除血肿
 E.手术堵塞脑脊液漏

- 294.患者, 男性, 48 岁, 已行毕 II 式胃大部切除术, 术后预防其早期倾倒综合征的方法不包括 ()
- 少食多餐
 - 避免过甜、过咸、过浓流质饮食
 - 进餐后平卧 10~20 分钟
 - 进食低糖、高蛋白饮食
 - 餐后活动 30 分钟
- 295.患者, 男性, 58 岁, 排尿犹豫、费力, 夜尿增多, 诊断为前列腺增生。行 B 超检查除进一步明确诊断外, 还要确定 ()
- 血尿的程度
 - 尿频的程度
 - 排尿困难的程度
 - 有否尿潴留
 - 残余尿的多少
- 296.患者, 男性, 45 岁, 在工作中不慎被钢筋刺破胸壁。在运送病人过程中应 () 采取的体位是 ()
- 去枕平卧位
 - 头低仰卧位
 - 低斜坡患侧卧位
 - 俯卧位
 - 低斜坡健侧卧位
- 297.患者, 男性, 23 岁, 野外施工时足底被锈钉子刺伤, 因条件有限仅自行简单处理。如发生破伤风通常会在什么时候发作 ()
- 1~3 天
 - 6~12 天
 - 14 天
 - 15~21 天
 - 28~30 天
- 298.患者, 王某, 因车祸造成颈椎骨折, 需行颅骨牵引。护士应为病人安置的卧位是 ()
- 仰卧位
 - 侧卧位
 - 头高脚低位
 - 头低脚高位
 - 健侧卧位
- 299.患者, 男性, 28 岁, 头部受伤后意识不清约 20 分钟, 头痛, 恶心, 呕吐, 追问受伤经过不能记忆, 查体无异常倾向。病人每天静脉输液量应控制在 ()
- 500ml 以内
 - 500~1000ml
 - 1500~2000ml
 - 2500~3000ml
 - 3000ml 以上
- 300.王先生, 43 岁, 主诉排便不适、便意不尽, 常伴有排尿困难。查体: 肛周正常。肛诊: 直肠上部可触到一个波动感包块, 触之疼痛。该病人可能为 ()
- 肛门周围脓肿
 - 骨盆直肠间隙脓肿
 - 坐骨直肠间隙脓肿
 - 内痔
 - 直肠癌
- 301.患者, 女, 52 岁。诊断为急性胆囊炎。下列关于其临床特点的描述可能性最大的是 ()
- 疼痛特点是右上腹阵发性绞痛
 - 有明显的黄疸
 - 有寒战高热
 - 墨菲氏征阴性
 - 粪便呈陶土色
- 302.患儿, 6 个月。阵发性哭闹伴呕吐。右侧腹部可触及腊肠样肿块。下列最能确定诊断的检查是 ()
- 腹部立位平片
 - 腹部扪及肿块
 - 肛检可见果酱样大便
 - 右下腹空虚感
 - 空气或钡剂灌肠
- 303.患者, 男性, 28 岁。脑外伤后出现小脑幕切迹疝, 对其急救处理不正确的是 ()
- 保持呼吸道通畅、吸氧
 - 应用激素
 - 快速静脉输入 20%甘露醇

- D.腰椎穿刺、降低颅压
E.做好紧急手术减压的准备
- 304.患者男性, 38 岁, 有胃溃疡史 8 年, 因突发腹痛 3 小时来急诊, 诊断胃溃疡急性穿孔, 行胃大部切除术后, 出现早期倾倒综合征。下列关于术前饮食指导错误的是 ()
- A.少量多餐
B.低蛋白
C.低糖
D.避免过甜、过咸食物
E.避免过浓食物
- 305.患儿女, 10 岁。突然腹部钻顶样疼痛 2 小时来院。大汗淋漓, 转辗不安; 疼痛停止时又平息如常。查体: 剑突偏向右方有压痛; 无腹肌紧张及反跳痛。为明确诊断, 应采取的检查是 ()
- A.腹部 B 超
B.ERCP
C.右上腹 X 线平片
D.测血清淀粉酶
E.十二指肠引流液检查
- 306.患者, 男性, 45 岁。腹部撞伤后感腹部疼痛, 伴恶心、呕吐。疑有腹腔脏器损伤。区别是实质性脏器还是空腔脏器损伤的主要依据是 ()
- A.外伤史
B.腹痛程度
C.有无腹膜刺激征
D.腹腔穿刺抽出物
E.有无全身中毒症状
- 307.结肠癌的普查方法是 ()
- A.超声检查
B.直肠指检
C.乙状结肠镜
D.大便潜血试验
E.X 线钡剂灌肠
- 308.患者男性, 40 岁, 经膀胱镜检查确诊为膀胱癌, 可以肯定下列哪一因素与其发病无关 ()
- A.长期接触苯类化学物质
B.吸烟
C.膀胱白斑
D.腺性膀胱炎
E.高脂、高蛋白饮食
- 309.病人女性, 56 岁, 不慎摔倒, 主诉右髋部疼痛, 无法站立和行走。查体: 患肢屈曲、内收、内旋、短缩, 臀部可触及股骨头。下列哪种诊断可能性较大 ()
- A.股骨颈骨折
B.髋关节脱位
C.髌关节骨折
D.股骨干上 1/3 段骨折
E.右侧骨盆骨折
- 310.患者男性, 15 岁, 骨折致急性血源性骨髓炎。其最可能的致病菌是 ()
- A.白色葡萄球菌
B.乙型溶血性链球菌
C.溶血性金黄色葡萄球菌
D.大肠埃希菌
E.肺炎链球菌
- 311.女, 43 岁, 下肢静脉曲张 10 年, 行大隐静脉结扎及剥脱术。术后护士鼓励患肢早期活动的意义是防止 ()
- A.肺部并发症
B.深静脉血栓形成
C.小腿肌肉萎缩
D.下肢创面出血
E.压疮
- 312.患者男性, 18 岁。头部受伤后当即昏迷 5 小时。格拉斯哥昏迷评分为 6 分。对其急救首先应该做到 ()
- A.准备床单位
B.测量呼吸、脉搏、血压
C.保持呼吸道通畅
D.给予止血剂和抗感染药物
E.应用脱水剂

- 313.患者男性, 15 岁, 右胫骨骨折致急性骨髓炎。下列哪项对其早期诊断意义不大 ()
- 症状
 - 体征
 - X 线
 - B 超
 - 血常规
- 314.食道癌好发部位是 ()
- 食道下段
 - 食道中段
 - 食道上段
 - 食道下段和中段
 - 食道上段和中段
- 315.患者, 女性, 48 岁。发现左乳房外上象限肿块, 直径为 4cm, 与皮肤轻度粘连, 并出现“酒窝征”, 左侧腋窝下扪及 3 个肿大淋巴结, 活动度尚可。皮肤出现酒窝征表示肿瘤已侵犯 ()
- 毛囊和汗腺
 - 皮下毛细淋巴管
 - 大的乳腺导管
 - Cooper 韧带
 - 胸大肌筋膜
- 316.女性, 36 岁, 患外痔多年, 行手术治疗。术后 1~2 天内饮食宜选择 ()
- 普食
 - 流食
 - 多吃水果蔬菜
 - 低蛋白饮食
 - 高蛋白高脂肪
- 317.患者, 男性, 27 岁, 上腹痛 2 天, 能忍受。今日午餐后疼痛加剧, 伴有呕吐, 吐后疼痛不缓解, 疑为急性胰腺炎。该患者的饮食宜选用 ()
- 低糖、低脂流食
 - 普食
 - 软质饮食
 - 半流质饮食
 - 禁食
- 318.患者, 男性, 28 岁。脑外伤后出现小脑幕切迹疝, 其有定位意义的瞳孔变化是 ()
- 患侧瞳孔逐渐缩小
 - 患侧瞳孔逐渐散大
 - 双侧瞳孔缩小
 - 双侧瞳孔散大
 - 双侧瞳孔大小不变
- 319.患者, 男性, 32 岁, 左手中指末节指腹刺伤后继发脓性指头炎。治疗时如切开不及时易引起 ()
- 甲沟炎
 - 坏死性骨髓炎
 - 急性化脓性腱鞘炎
 - 化脓性滑囊炎
 - 指甲下脓肿
- 320.患者女性, 30 岁。右腰部撞伤后局部疼痛, 肿胀。有淡红色血尿, 诊断为右肾挫伤, 行非手术治疗。下列护理措施哪项是错误的 ()
- 观察腹痛的变化
 - 注意血尿情况
 - 绝对卧床至少 2 周
 - 监测血尿变化, 颜色加深提示出血加重
 - 血尿消失, 可下地活动
- 321.男性, 27 岁, 自去年冬季以来每日发生腹痛, 平时伴有恶心、打嗝、反酸, 查体在剑突右侧有局限压痛, 无反跳痛, 诊断“十二指肠溃疡”。十二指肠溃疡疼痛的特点是 ()
- 餐后即痛, 持续 2 小时后缓解
 - 餐后 1 小时开始, 持续 2 小时后缓解
 - 餐后 2 小时开始, 持续 2 小时后缓解
 - 餐后 3~4 小时开始, 进餐后缓解
 - 无规律性
- 322.男性, 55 岁。肛瘘 20 年, 对其进行健康教育时, 下列哪一项不正确 ()
- 肛瘘多数是直肠肛周脓肿的后果
 - 少数肛瘘为结核性
 - 瘘管穿过肛管直肠环, 不应一次切除

- D.肛瘘难以自愈，多须手术治疗
E.挂线疗法后 2~3 天内不要排便
- 323.患者，男性，43 岁，左肾及输尿管结石，检测为尿酸结石。病人不宜食（ ）
- 动物内脏
 - 肉类
 - 菠菜
 - 鸡蛋
 - 马铃薯
- 324.病人，男性，35 岁，浅Ⅱ度烧伤约 20%，深Ⅱ度烧伤约 10%。烧伤后多长时间内护士要警惕低血量性休克发生（ ）
- 24 小时
 - 36 小时
 - 48 小时
 - 60 小时
 - 72 小时
- 325.患者，女性，42 岁。自 6 米高处跌下 1 小时，腹痛，腹肌紧张，伴压痛和反跳痛，肠鸣音弱，血压 90/50mmHg，脉率 132 次/分，X 线摄片显示，右第 9、10 肋骨骨折，右膈肌升高。应考虑为（ ）
- 肝破裂
 - 脾破裂
 - 十二指肠破裂
 - 胰腺破裂
 - 结肠破裂
- 326.细菌性肝脓肿患者最常见的早期症状是（ ）
- 恶心
 - 黄疸
 - 贫血
 - 右上腹肌紧张，局部触痛明显
 - 寒战高热
- 327.患者，男性，58 岁。因腹泻、便秘交替出现 2 个月就诊。大便稀薄并带有黏液血便，疑患直肠癌收入院。经腹会阴联合直肠癌根治术适用于（ ）
- 肿瘤距肛门 20cm 之内
 - 肿瘤距肛门 15cm 之内
 - 肿瘤距肛门 13cm 之内
 - 肿瘤距肛门 10cm 之内
 - 肿瘤距肛门 5cm 之内
- 328.患者，女，42 岁，诊断为Ⅲ期内痔。其主要治疗方法是（ ）
- 坐浴
 - 局部热敷
 - 消炎栓塞肛
 - 痔核切除
 - 无需治疗
- 329.患者，女，32 岁，患急性蜂窝组织炎入院，行抗炎、对症治疗。其主要致病菌常为（ ）
- 溶血性链球菌
 - 金黄色葡萄糖球菌
 - 铜绿假单胞菌
 - 厌氧菌
 - 大肠埃希菌
- 330.下列哪个部位的骨折易造成前臂缺血性肌挛缩（ ）
- 肱骨干中下 1/3 骨折
 - 肱骨髁上骨折
 - 桡骨下段骨折
 - 尺骨下段骨折
 - 尺桡骨双骨折
- 331.患者，男性，29 岁，摔伤左肩致肩关节前脱位。下列哪项对其诊断最有意义（ ）
- 患肢轻度外展
 - 患肢短缩畸形
 - 三角肌塌陷
 - Dugas 征
 - 头部倾斜
- 332.壶腹部癌的临床表现中较早出现的是（ ）
- 黄疸
 - 上腹痛及脊背痛
 - 寒战发热

- D.消化道症状
E.贫血消瘦
- 333.患者，女性，40岁，怀疑甲亢，出现下列哪项可作为诊断甲亢的特征性临床表现（ ）
A.腹泻
B.心悸
C.多汗
D.消瘦
E.胫前黏液性水肿
- 334.血栓闭塞性脉管炎的病变主要累及（ ）
A.四肢中小动脉
B.四肢中小静脉
C.下肢大隐静脉
D.下肢末梢神经
E.四肢交感神经
- 335.患者，女性，诊断为小肠痿，主诉尿少，厌食，恶心，软弱无力，脉细速。血红蛋白16g/L，血钠132mmol/L。应考虑病人出现（ ）
A.高渗性脱水
B.等渗性脱水
C.低渗性脱水
D.代谢性酸中毒
E.代谢性碱中毒
- 336.患者，男，36岁。诊断为骨盆直肠窝脓肿。其主要临床表现是（ ）
A.局部红肿热痛明显
B.排尿失禁
C.直肠刺激征明显
D.便秘和腹泻交替
E.排便失禁
- 337.患者，男，66岁，发现右侧腹股沟可复性肿块3年。10h前，用力排便时突感腹痛难忍，呕吐数次，伴发热、全身不适。查体：右腹股沟及阴囊可扪及肿块，张力高，明显触痛。全腹有压痛、腹肌紧张；白细胞计数明显增高。此类疝属（ ）
A.腹股沟直疝，嵌顿性疝
B.腹股沟斜疝，嵌顿性疝
C.腹股沟直疝，绞窄性疝
D.腹股沟斜疝，绞窄性疝
E.股疝，绞窄性疝
- 338.患儿，男，8岁。不慎被木刺扎进右食指指腹，疼痛，家人挑出肉眼所见肉刺后未作进一步处理。次日出现肢端胀痛、触痛，皮肤呈苍白色，体温38.5℃。最可能的诊断是（ ）
A.丹毒
B.甲沟炎
C.脓性指头炎
D.化脓性滑囊炎
E.急性化脓性腱鞘炎
- 339.患者，女性，26岁，产后4周右侧乳房肿胀疼痛，表面皮肤红热，扪及触痛的硬块，无波动感，体温38.9℃，患侧腋窝淋巴结肿大，压痛，其治疗不正确的是（ ）
A.患乳停止哺乳，吸净乳汁
B.局部热敷
C.局部理疗
D.切开引流
E.全身应用抗生素
- 340.前列腺术后1周内护理，下列哪项不妥（ ）
A.安置两根引流管
B.膀胱冲洗液自气囊导尿管注入
C.冲洗液从耻骨上造口流出
D.患者便秘应灌肠
E.冲洗液中必要时加入止血剂
- 341.患者，因破伤风被安置在隔离室，牙关紧闭，四肢抽搐，角弓反张，采取的安全防护措施哪项不妥（ ）
A.用床栏，防坠床
B.取下义齿，防窒息
C.枕横立于床头，四肢用约束带以防撞伤
D.纱布包裹压舌板，垫于上下臼齿之间，防止舌咬伤
E.室内保持充足光线、安静，以利护理操作
- 342.患者，女性，45岁，确诊为脊髓型颈椎病。治疗时下列哪种方法应慎用（ ）

- A.超短波治疗
B.超声疗法
C.药物离子导入
D.颈椎牵引
E.红外线治疗
- 343.正常成年人 24 小时物质代谢氧化产生的水量约为 ()
A.100ml
B.150ml
C.200ml
D.250ml
E.300ml
- 344.下列哪项是低渗性缺水的病因 ()
A.运动后大量出汗
B.烧伤后大量饮水
C.高热
D.昏迷病人不能进食
E.急性胃肠炎
- 345.患者,男,38岁,两年来常感左下肢麻木、发凉、怕冷,检查后确诊为血栓闭塞性脉管炎。其病因与下列哪项无关 ()
A.长期大量吸烟
B.气候寒冷潮湿
C.神经内分泌紊乱
D.下肢活动较少
E.免疫功能异常
- 346.关于细菌性肝脓肿,下列叙述正确的是 ()
A.大部分是胆源性肝脓肿
B.致病菌多为 G+球菌
C.脓液多为棕褐色
D.多由于溃疡性结肠炎所致
E.手术引流是唯一有效的方法
- 347.患者,男,25岁,转移性右下腹痛伴恶心,纳差,诊断为急性阑尾炎。其发病的原因最重要的是 ()
A.细菌侵入
B.黏膜受损
C.管壁痉挛
D.管壁血液循环障碍
E.阑尾腔梗阻
- 348.骨骼系统恶性度最高的肿瘤是 ()
A.骨软骨瘤
B.骨肉瘤
C.骨巨细胞瘤
D.骨转移癌
E.尤文肉瘤
- 349.下列哪一种损伤虽已 12 小时,清创后仍可一期缝合 ()
A.上肢撕脱伤
B.下肢刺伤
C.头皮裂伤
D.背部火器伤
E.小腿裂伤
- 350.患者男性,43岁,车祸致脑挫裂伤。当患者出现哪些征象应立即作好术前准备 ()
A.呼吸深而慢
B.血压升高,脉压变大
C.出现脑膜刺激征
D.一侧瞳孔进行性散大,对侧肢体瘫痪
E.腰穿抽出血性脑脊液
- 351.患者男性,32岁,右下腹突发性绞痛,左肾区酸胀,伴尿频、尿急,尿道和龟头疼痛,诊断为输尿管结石,最重要的措施是 ()
A.大量饮水
B.应用抗生素
C.解痉止痛
D.手术治疗
E.跳跃运动
- 352.患者,男性,36岁,患破伤风,入院时牙关紧闭,角弓反张,四肢抽搐,其伤口清洗应用 ()
A.碘伏

- B.75%酒精
- C.外用生理盐水
- D.3%过氧化氢
- E.1‰苯扎溴胺

353.男性，25岁。因车祸致右侧胸部损伤，1小时后送至急诊室，能判断病人是开放性气胸的临床表现是（ ）

- A.呼吸困难
- B.胸部听诊呈鼓音
- C.胸部有捻发音
- D.胸壁伤口处可听到空气出入声
- E.伤侧听诊呼吸音加强

354.周先生，40岁，体重60kg。反复呕吐一周，测得血钠125mmol/L，血钾3mmol/L。初步考虑为（ ）

- A.低钾血症，高渗性脱水
- B.高钾血症，重度缺钠
- C.低钾血症，轻度缺钠
- D.低钾血症，中度缺钠
- E.血钾正常，等渗性脱水

355.患者，女，48岁，未婚，左侧乳房出现无痛性肿块，边界不清，质地坚硬，直径为4cm，同侧腋窝2个淋巴结肿大，无粘连，诊断为乳癌，需手术治疗。此病人术前备皮范围是（ ）

- A.胸部、同侧腋下及颈部
- B.胸部、同侧腋下
- C.胸部、同侧腋下及上臂
- D.胸部、上臂
- E.胸部、双侧腋下

356.梁某，女，30岁，原发性甲状腺功能亢进，拟行甲状腺大部切除术，应用碘剂行术前药物准备，以下哪项不是碘剂的作用（ ）

- A.抑制甲状腺素的释放
- B.减少甲状腺血运
- C.使腺体缩小
- D.使腺体变硬
- E.抑制甲状腺素合成

357.王先生，45岁。因午餐后挑担突感脐周剧烈绞痛，并延及腰部，伴恶心、呕吐4小时急诊来院。查：体温36.5℃，脉搏112次/分，呼吸22次/分，血压90/70mmHg，急性痛苦病容，心肺无明显异常。腹部膨隆，全腹有压痛、反跳痛、肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音减弱。该病人首先应检查（ ）

- A.血常规
- B.血生化
- C.腹部X线
- D.B超
- E.CT

358.男孩，7岁，1天来持续高热寒战，左下肢活动受限。左小腿上端剧痛，且有深压痛。血白细胞 $21 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%，X线片正常。6天前有左膝碰伤史。可能是（ ）

- A.左膝化脓性关节炎
- B.急性血源性骨髓炎
- C.急性蜂窝织炎
- D.膝关节结核
- E.创伤性关节炎

359.陈先生，46岁。左腰部被撞1小时，左腰肿痛入院。查：血压66/46mmHg、脉搏120次/分，神志清，面色苍白，脉细速，左腰膨隆，有压痛，腹软，无肌紧张，无移动性浊音，肠鸣音正常。经导尿引出黄色透明液约200ml，快速输液1000ml、血浆400ml、全血400ml，病情无好转，血压继续下降。哪种损伤可能性大（ ）

- A.脾破裂
- B.肠破裂
- C.肾部分裂伤
- D.肾全层裂伤
- E.肾蒂断裂伤

360.一学生上学途中被自行车撞倒，右颞部着地，当时不省人事达20分钟，醒后轻微头痛，四肢活动自如，次日感头痛加重，呕吐数次，嗜睡而来就诊，下列哪种处理最好（ ）

- A.给予镇痛处理，休息1周
- B.给予止呕处理，休息1周
- C.口服镇痛和激素药物，休息1周
- D.给予口服脱水、利尿药，随诊
- E.给予脱水利尿治疗，同时进一步检查

- 361.男, 48 岁, 突发持续剧烈腹痛, 给予非手术治疗护理。观察病情时, 最应注意的局部体征是 ()
- 肠鸣音的变化
 - 腹壁静脉曲张
 - 腹式呼吸运动的大小
 - 腹膜刺激征
 - 移动浊音
- 362.可以施行灌肠的急腹症是 ()
- 结肠套叠早期
 - 绞窄性肠梗阻
 - 肠穿孔
 - 肝癌破裂出血
 - 急性化脓性阑尾炎
- 363.全身麻醉患者术后出现低氧血症, 护士应该采取以下措施但除外 ()
- 观察患者的意识、生命体征和面色等
 - 监测 SpO_2 和 $PaCO_2$ 的变化
 - 给患者纯氧吸入
 - 协助治疗病因
 - 配合医师行机械通气治疗和护理
- 364.患者, 男性, 60 岁, 原发性肝癌早期, 拟行肝叶切除术。其术前护理, 错误的是 ()
- 低蛋白、高脂肪、高维生素饮食
 - 适量输血或白蛋白
 - 术前 2 天口服肠道不吸收抗生素
 - 术日晚、术晨清洁灌肠
 - 配血
- 365.患者, 男, 40 岁, 因车祸导致胸部受伤, 医生诊断为血胸, 行胸腔闭式引流, 护士发现引流血量 $200ml/h$, 持续 3 小时, 此时应该采取何种治疗措施 ()
- 穿刺抽血
 - 保持引流通畅
 - 剖胸手术
 - 抗休克
 - 纤维剥脱术
- 366.患者女性, 38 岁, 意外事故中致左胫腓骨骨折。患者左小腿高度肿胀, 皮温低, 足背动脉触不清, 应考虑并发症是 ()
- 神经损伤
 - 血管损伤
 - 肌肉挤压伤
 - 感染
 - 骨筋膜室综合征
- 367.某进入更年期女性患者, 出现骨质疏松症状, 并询问护士骨质疏松最易好发部位, 护士正确的回答是 ()
- 股骨
 - 肩胛带
 - 骨盆带
 - 脊椎
 - 指(趾)骨
- 368.男性, 55 岁, 头痛 3 个月, 多见于清晨, 常出现癫痫发作, 经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高, 拟行开颅手术。术前患者出现便秘时, 不正确的处理方法是 ()
- 使用开塞露
 - 腹部按摩
 - 使用缓泻剂
 - 用肥皂水灌肠
 - 鼓励患者多食蔬菜水果
- 369.患者, 女性, 26 岁, 下腹部踢打致膀胱挫伤。行非手术治疗, 其导尿管应保留 ()
- 2~3 天
 - 7~10 天
 - 3~4 周
 - 5 周
 - 6 周
- 370.高钾血症病人出现心律失常, 首要措施是静脉输入 ()
- 5%碳酸氢钠
 - 10%葡萄糖酸钙
 - 50%葡萄糖溶液和胰岛素

- D.生理盐水
E.11.2%乳酸钠
- 371.患者，男性，17岁，右小腿被锐器刺入致开放性损伤，其最主要临床表现是（ ）
A.疼痛
B.肿胀
C.淤血
D.伤口
E.功能障碍
- 372.患者，男，40岁，胫骨骨折石膏管型固定后8小时，诉患肢疼痛难忍。检查：肢端苍白，温度降低，足趾不能主动活动，应考虑（ ）
A.骨折端移位
B.衬垫不妥
C.继发感染
D.血管受压
E.体位不当
- 373.患者，男，25岁。肋骨骨折后合并血气胸，急诊行胸腔闭式引流护理，错误的是（ ）
A.嘱患者勿折叠、扭曲、压迫管道
B.嘱患者翻身时勿牵拉引流管
C.保持水封瓶长管没入水中6~8cm
D.指导患者多做深呼吸运动
E.更换引流瓶时应双重夹闭引流管
- 374.某患者因胃癌行胃大部切除术。术后第1天除生命体征外，护士最应重点观察的（ ）
A.神志
B.尿量
C.肠鸣音
D.腹胀
E.胃管引流液
- 375.患者，男，20岁。铁打扎伤1周后，出现张口受限、苦笑面容、角弓反张，抽搐频繁，护理措施不正确的是（ ）
A.注射破伤风抗毒素
B.保持病室安静避光
C.病情严重时少食多餐
D.密切观察病情
E.做过好消毒隔离
- 376.患者，男，53岁，因贲门癌收治入院。患者近期进食梗阻感加重，体重明显下降。护士对其饮食的指导要点中，错误的是（ ）
A.少食多餐
B.半流质饮食
C.低蛋白饮食
D.高热量饮食
E.高维生素饮食
- 377.患者男，45岁，直肠癌行根治术（Miles术）后，造口周围皮肤保护的健康指导不包括（ ）
A.擦干后涂上锌氧油
B.注意有无红、肿、破溃
C.及时清洁皮肤
D.常规使用乙醇清洁
E.防止粪水浸渍
- 378.患儿，男，5岁。摔倒后左肘关节着地送来急诊。分诊护士判断该患儿是否发生骨折的最重要依据是（ ）
A.左上臂疼痛
B.局部肿胀
C.左上臂畸形
D.局部压痛
E.肘关节活动度减小
- 379.患者，女，38岁。大面积烧伤后5小时入院，心率120次/分，血压70/50mmHg，尿少。发生上述情况最可能的原因是（ ）
A.大量红细胞丧失造成肺换气功能障碍
B.大量水分蒸发造成脱水
C.疼痛导致的生理反应
D.大量体液从血管内渗出引起低血容量性休克
E.创面细菌感染造成感染性休克
- 380.患者，男性，57岁，盲肠癌行Miles手术。术后10小时，患者出现腹部胀痛，恶心。腹壁造口检查：肠壁为浅红色，且弹性差，可伸入一小指。该患者可能出现的术后并发症（ ）

- A.造口肠段血运障碍
- B.吻合口瘘
- C.肠粘连
- D.造口狭窄
- E.便秘

381.患者，女性，68岁，转移性右下腹疼痛16小时，无恶心呕吐。查体：体温38.5℃，无腹肌紧张，右下腹压痛、反跳痛不明显，结肠充气试验(+)，血常规：白细胞 $8.7 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞85%，尿常规正常。该患者首选的治疗方法是（ ）

- A.局部理疗
- B.禁食、置胃管
- C.手术
- D.应用抗生素
- E.中药治疗

382.患者，男性，57岁，头部外伤后昏迷2小时，曾呕吐数次。入院测血压150/80mmHg，脉搏60次/分，呼吸12次/分。考虑“脑挫裂伤”，给予非手术治疗。为及时发现小脑幕切迹疝，应重点观察（ ）

- A.瞳孔、肢体活动
- B.血压、脉搏、尿量
- C.意识、肌张力
- D.呼吸、体温、血压
- E.压迫眶上孔的反应

383.患者，男性，32岁，右下腹突发性绞痛，左肾区酸胀，伴尿频、尿急，尿道和龟头疼痛，诊断为输尿管结石，关于保守排石的陈述正确的是（ ）

- A.每日饮水量3000ml左右
- B.避免使用抗生素
- C.为减轻疼痛减少运动
- D.疼痛时服用止痛剂
- E.进食高蛋白低纤维素饮食

384.患者，男性，53岁，患十二指肠溃疡10年。近1个月以来，上腹部胀满不适，反复呕吐带酸臭味的宿食，呕吐后患者自觉胃部舒适。体检：皮肤干燥、弹性差，唇干；上腹部膨隆，可见胃型和肠蠕动波，手拍上腹可闻及振水声。考虑该患者有瘢痕性幽门梗阻，拟行手术治疗。该患者最容易出现哪种电解质和酸碱失衡（ ）

- A.高钾性酸中毒
- B.低钾、低氯性碱中毒
- C.低钙、低镁性碱中毒
- D.低钠、低钾性碱中毒
- E.高氯性酸中毒

385.严重肝脏患者疾病患者手术前，最需要补充的维生素是（ ）

- A.维生素A
- B.维生素B
- C.维生素C
- D.维生素K
- E.维生素E

386.患者，女，29岁，因肛瘘行瘘管切除术，护士指导患者最合适的术后卧位是（ ）

- A.侧卧位
- B.平卧位
- C.半坐位
- D.头低足高位
- E.中凹位

387.患者，女，56岁，诊断胰头癌入院行胰头十二指肠切除术，术后出现高血糖。出院饮食指导原则正确的是（ ）

- A.低脂、低糖、低蛋白
- B.高脂、低糖、高蛋白
- C.高脂、低糖、低蛋白
- D.低脂、低糖、高维生素
- E.低脂、高糖、高维生素

388.患者，男，25岁，“颅脑外伤”入院。护士对处于昏迷状态的患者评估后，确认患者存在以下的健康问题，其中应优先解决的问题是（ ）

- A.大便失禁
- B.沟通障碍
- C.活动无耐力
- D.皮肤完整性受损
- E.清理呼吸道无效

389.一患者右腰部被重物击伤，自觉疼痛，查体见右腰部压痛、叩击痛，血压、脉搏正常，

尿液镜检红细胞 10~15 个/高倍视野, 应考虑 ()

- A.腰部挫伤
- B.肾挫伤
- C.肾部分裂伤
- D.肾全层裂伤
- E.肾蒂裂伤

390.某女 44 岁, 胃溃疡穿孔合并急性慢性腹膜炎, 手术后 5 天体温 39°C, 每日大便次数 7~8 次, 有排
不完感, 下列哪项可能性最大 ()

- A.肠炎
- B.细菌性痢疾
- C.肠粘连
- D.盆腔脓肿
- E.肠间隙脓肿

391.赵先生, 30 岁, 肛门周围不断有少量脓性分泌物溢出, 甚至有大便和气体排出 1 周,
肛周皮肤瘙痒。肛门检查: 肛门周围皮肤有一乳头状隆起的开口, 挤压可见少量脓性分泌物。

下列哪一种检查可以确诊 ()

- A.直肠指诊
- B.从皮肤开口插入探针
- C.肛门镜检查
- D.X 线钡剂灌肠
- E.局部穿刺

392.毛先生, 71 岁, 前列腺摘除术后使用气囊导尿管压迫止血。护士进行膀胱冲洗时, 错
误的护理措施是 ()

- A.密闭式持续膀胱冲洗
- B.冲洗液用无菌生理盐水
- C.每次冲洗量 200~300mL
- D.注入止血药后要夹管 30min
- E.记录冲洗和排出量

393.男, 30 岁, 下肢急性蜂窝织炎伴全身化脓性感染, 需抽血作血培养及抗生素敏感试验,
最佳时间应是 ()

- A.高热时
- B.间歇期
- C.寒战时
- D.静脉滴注抗生素时
- E.抗生素输入后

394.男, 50 岁, 经常发生肾绞痛、血尿, 疑为肾结石, 需作静脉肾盂造影。造影前准备下
列哪项不正确 ()

- A.常规肠道准备
- B.当天禁止早餐
- C.鼓励饮水
- D.检查前排尽小便
- E.需作碘过敏试验

395.李先生, 因下肢挤压伤致血清钾升高, 出现心动过缓, 心律不齐。应选用的药物是 ()

- A.毛花甙丙(西地兰)
- B.普萘洛尔(心得安)
- C.利多卡因
- D.5%碳酸氢钠
- E.10%葡萄糖酸钙

396.张女士, 35 岁, 患原发性甲状腺功能亢进。入院后在清晨未起床前测患者脉率 110 次/分, 血压
140/80mmHg, 拟在服用复方碘化钾溶液等术前准备后, 择期行甲状腺大部切除术。按简便公式计算, 该患
者的基础代谢率(BMR)为 ()

- A.50%
- B.59%
- C.109%
- D.139%
- E.170%

397.结肠破裂修补术后 5 天, 患者血钠 136.0mmol/L, 血钾 6.8mmol/L, 血 PH 值 7.3, 近 24 小时尿量
520ml, 应诊断为 ()

- A.低渗性脱水
- B.高渗性脱水
- C.低钾血症
- D.高钾血症
- E.低钾合并等渗性脱水

- 398.患者，女，48岁，类风湿关节炎5年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节的功能，正确的做法是（ ）
- 腕关节背伸、指关节背伸
 - 腕关节背伸、指关节掌屈
 - 腕关节掌屈、指关节侧屈
 - 腕关节掌屈、指关节背伸
 - 腕关节侧屈、指关节掌屈
- 399.某女，30岁，经前乳房胀痛及出现肿块，经后自行消退，应考虑为（ ）
- 乳腺癌
 - 乳房纤维腺瘤
 - 乳腺内瘤
 - 乳腺囊性增生病
 - 乳管内乳头状瘤
- 400.某男，20岁。腹部撞击伤2小时后出现面色苍白，脉细弱120次/分，血压70/50mmHg。意识清，腹膜刺激征阳性，腹腔穿刺抽出不凝血液，诊断可能是（ ）
- 胃破裂
 - 腹壁血肿
 - 肝、脾破裂
 - 小肠破裂
 - 胆囊破裂
- 401.某女，31岁，会计，喜食辛辣食物，患痔疮4年，近期无痛性便血加重，在排便时间歇滴血，痔核脱出肛门外，排便后不可自行恢复。该患者的病情属于（ ）
- 内痔第一期
 - 内痔第二期
 - 内痔第三期
 - 血栓性外痔
 - 混合痔
- 402.男性，58岁，拟行左结肠癌根治术，术前需几日开始服用肠道消炎药（ ）
- 1日
 - 2日
 - 3日
 - 4日
 - 5日
- 403.患者，女性，45岁。3个月前无意中发现左侧乳房有一小指头大小的无痛性肿块，近一个月来肿块逐渐增大，故来院就诊。体检：左侧乳房可扪及一3cm×2cm大小的肿块，边界不清，表面不甚光滑，活动度尚可；患侧乳头内陷（为近期出现）；同侧腋窝可扪及2个散在、可推动的淋巴结。初步怀疑为乳癌。患者近期内出现乳头内陷是由于（ ）
- 癌细胞堵塞皮下淋巴管
 - 癌肿侵犯乳房 Cooper 韧带
 - 癌肿与胸肌粘连
 - 癌肿与皮肤粘连
 - 癌肿侵犯乳管
- 404.患者，男性，40岁，体重60kg。因食管癌进食困难1个月余入院，主诉：乏力、极度口渴、尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼凹征、舌干燥、皮肤弹性差。该患者的水、电解质失衡诊断为（ ）
- 轻度高渗性脱水
 - 中度高渗性脱水
 - 重度高渗性脱水
 - 重度低渗性脱水
 - 中度低渗性脱水
- 405.患者，男性，36岁，搬运工人，诊断为腹股沟斜疝，行疝修补术后，恢复工作的时间是（ ）
- 术后至少2周
 - 拆线后至少1周
 - 术后体力恢复后
 - 术后至少1个月
 - 术后至少3个月
- 406.患者，女性，50岁，腹股沟韧带内侧的下方突然出现半球形包块，疼痛、不能回纳，伴恶心、呕吐，肛门不排气。腹透：腹腔胀气，有数个液平面。肠嵌顿性疝的急诊术前准备，错误的是（ ）
- 禁食
 - 输液，维持水、电解质平衡
 - 备血
 - 灌肠
 - 胃肠减压

- 407.患者，女性，41岁。胆囊结石病史2年，主诉晚餐后突然出现右上腹阵发性剧烈疼痛，向右肩、背部放射，伴有腹胀、恶心、呕吐等症状。体检示：体温38.9℃，脉搏112次/分，血压106/85mmHg，右上腹部有压痛、肌紧张、反跳痛。实验室检查：WBC $10.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.79，该病人的体格检查可出现（ ）
- Charcot三联征
 - Murphy征阳性
 - Reynolds五联征
 - MODS征
 - MOF征
- 408.患者，男性，38岁，车祸伤及头部，当即出现右侧鼻唇沟变浅，右外耳道流出淡血性液体，右耳听力下降，CT示颅内少量积气。考虑病人出现了（ ）
- 颅前窝骨折
 - 颅中窝骨折
 - 颅后窝骨折
 - 额骨骨折
 - 脑挫裂伤
- 409.肛裂病人排便后出现第二次持续疼痛的主要原因是（ ）
- 粪便刺激
 - 未进行肛门坐浴
 - 神经末梢受刺激
 - 皮下静脉血栓形成
 - 肛管内括约肌痉挛性收缩
- 410.病人发生脑疝时，其瞳孔的变化特点是（ ）
- 单侧瞳孔直径 $> 6mm$ ，固定
 - 双侧瞳孔直径 $> 4mm$
 - 双侧瞳孔直径 $< 2mm$
 - 双侧瞳孔直径 $> 6mm$ ，固定
 - 瞳孔边缘不齐
- 411.患者，女性，50岁，急性胃穿孔腹膜炎手术修补后7天，患者突然出现寒战，发热，出汗等全身中毒症状，伴有上腹痛，呃逆以及季肋部压痛，叩击痛等，在观察期应考虑是（ ）
- 肠间脓肿
 - 盆腔脓肿
 - 脓血症
 - 膈下脓肿
 - 败血症
- 412.患者因十二指肠溃疡行毕氏II式手术，术后9d进食。进食后出现上腹部饱胀感，后出现呕吐，呕吐物为食物和胆汁，请问病人出现了下列哪一种情况（ ）
- 胃炎
 - 吻合口梗阻
 - 输入段梗阻
 - 输出段梗阻
 - 倾倒综合征
- 413.阑尾发生炎症时，阑尾容易坏死的解剖因素是（ ）
- 阑尾为盲管状器官
 - 官腔细长且开口较小
 - 阑尾动脉为终末动脉
 - 静脉回流至门静脉
 - 其他位置随盲肠而变异
- 414.患者，男性，42岁，有20余年胃十二指肠溃疡病史。今日午餐进食较多，并少量饮酒，餐后突然上腹剧烈刀割样疼痛，迅速全腹痛。查：急性面容，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，上腹板状。初步考虑是（ ）
- 急性阑尾炎
 - 溃疡病急性穿孔
 - 急性胆囊炎
 - 急性胰腺炎
 - 溃疡病急性出血
- 415.患者男，34岁。因车祸致右下肢开放性骨折，大量出血，被送来急诊。在医生未到之前，接诊护士应立即（ ）
- 详细询问车祸发生的原因
 - 向医院有关部门报告
 - 给患者注射镇静剂
 - 给患者使用止血药
 - 给患者止血、测量血压，建立静脉通道
- 416.张先生，35岁，左股骨干闭合性骨折，行股骨踝上骨牵引术后3周，护士在指导患者

进行功能锻炼时应以哪种锻炼活动为主 ()

- A.以患肢肌肉舒缩活动为主
- B.以骨折处远端关节为主
- C.以重点关节活动为主
- D.以骨折近处关节活动为主
- E.以骨折近、远处关节活动为主

417.膀胱造瘘口术后护理, 错误的是 ()

- A.造瘘管接引流袋, 并妥善固定
- B.定时用 1:5000 呋喃西林行高压膀胱冲洗
- C.造瘘口周围皮肤涂氧化锌油膏
- D.造口管一般留置 7~14 天拔除
- E.敷料渗液应及时更换

418.患者, 男性, 70 岁。间断性便秘 15 年, 时有腹部胀痛, 便后缓解。1 天前用力排便时突发腹部绞痛, 腹胀, 恶心, 未呕吐, 停止排便排气。P112 次/分, Bp80/60mmhg。全腹膨胀, 以左侧为明显, 全腹压痛, 以左下腹为重, 伴肌紧张, 反跳痛, 移动性浊音阳性, 肠鸣音消失。此时病人的水、电解质、酸碱代谢改变主要是 ()

- A.低氯低钠性碱中毒
- B.低氯低钾性碱中毒
- C.低钠低钾性酸中毒
- D.低钠高钾性酸中毒
- E.高钠高钾性酸中毒

419.患者, 女, 43 岁, 胰腺癌术后, 护士对其出院指导哪项是错误的 ()

- A.均衡饮食, 少量多餐
- B.按计划行放、化疗
- C.术后每 3~6 个月复查一次
- D.出现疼痛应及时止痛
- E.若出现贫血、乏力应及时复诊

420.患者, 女, 39 岁。下肢静脉曲张数年, 近日行硬化剂注射疗法。护士对其进行健康教育, 正确的内容是 ()

- A.绷带加压包扎期间不能行走
- B.绷带加压包扎期间可以久站
- C.坐时双膝可长久采取交叉位
- D.绷带加压包扎 1 个月
- E.可穿紧身衣裤

421.患者, 男, 41 岁。肛周肿痛 3 天, 肛门左侧皮肤发红伴疼痛, 以坐时及排便时明显。2 天前加剧并局部肿胀, 无畏寒, 发热。查体: 膝胸位肛门 11 点处局部肿胀约 2cm×2cm, 有脓头, 周围皮肤发红, 波动感 (+)。引起该病的最常见原因是 ()

- A.外伤
- B.肛周皮肤感染
- C.肛腺感染
- D.痔行药物注射治疗后
- E.血栓性外痔剥离术后

422.患者, 男, 30 岁。因外伤导致直肠损伤行切开复位加结肠造口术。不正确的术后护理 ()

- A.多食含粗纤维的食物
- B.置气垫床
- C.平卧位和患侧卧位交替
- D.保持造口周围皮肤清洁
- E.进行上肢伸展运动

423.患者, 女, 57 岁。胆总管结石。入院行胆总管切开探查, T 型管引流术。术后针对 T 型管引流的护理措施, 不妥的是 ()

- A.记录引流胆汁的量、色及性状
- B.每日用生理盐水冲洗 T 型管
- C.一般留置 2 周
- D.拔管前经 T 管胆道造影
- E.拔管前夹管观察 1~2 天

424.王先生, 62 岁, 先是夜间尿频, 后逐步排尿时间延长, 尿不尽, 今下午排不出尿, 小腹胀痛来院就诊。护士首先应如何处理 ()

- A.穿刺抽尿
- B.膀胱造瘘
- C.导尿并留置导尿管
- D.压腹部排尿
- E.急诊做前列腺摘除术

425.患者, 王先生, 排尿开始时有血尿, 以后逐渐变清, 预示病变部位在 ()

- A.前尿道
 - B.后尿道
 - C.膀胱三角区
 - D.输尿管
 - E.肾脏
- 426.患者，女，34岁，肱骨干骨折术后3天。护士指导患者进行功能锻炼，正确的方法是（ ）
- A.患侧运用握力器进行前臂肌肉舒缩运动
 - B.患肢爬墙运动，以活动上臂肌肉
 - C.用手推墙动作，以活动胸大肌、三角肌
 - D.运篮球动作，以活动上肢各肌群
 - E.提重物练习，以促进骨痂愈合
- 427.细菌性肝脓肿患者最常见的早期症状是（ ）
- A.恶心
 - B.黄疸
 - C.贫血
 - D.右上腹肌紧张，局部触痛明显
 - E.寒战高热
- 428.患者，男，51岁，反复出现排便后肛门疼痛，时有瘙痒4年余，站立行走过久时肛门有肿胀感，昨日突发便后肛门剧烈疼痛，咳嗽时疼痛加强，查体见肛门外有一紫红色肿块，有触痛感，直径2cm。若患者行手术治疗，术后不会出现的情况是（ ）
- A.伤口出血
 - B.尿潴留
 - C.肛门疼痛
 - D.伤口渗血
 - E.肠粘连
- 429.对全肺切除术后病人，正确的护理措施是（ ）
- A.24小时补液量3000ml
 - B.输液速度以50滴/分
 - C.取患侧卧位
 - D.取1/4侧卧位
 - E.胸腔引流管一般呈开放状态
- 430.患者，男性，35岁。近2个月来右腰部有隐痛、钝痛。今晨7时突然发作阵发性刀割样疼痛，向下腹及会阴部放射。患者辗转不安，呻吟呼痛，面色苍白，伴镜下血尿。此疼痛为（ ）
- A.心绞痛
 - B.肠绞痛
 - C.胆绞痛
 - D.肾绞痛
 - E.坐骨神经痛
- 431.护士指导腰椎间盘突出症患者在手术后早起即进行直腿抬高练习，其目的是为了预防（ ）
- A.神经根黏连
 - B.肌肉萎缩
 - C.血肿形成
 - D.伤口感染
 - E.骨质疏松
- 432.小脑幕切迹疝时，通常疝入小脑幕裂孔中的脑组织是（ ）
- A.小脑扁桃体
 - B.额叶内侧
 - C.颞叶沟回
 - D.延髓
 - E.小脑蚓部
- 433.前列腺切除术后早期护理的重点是（ ）
- A.防止尿失禁
 - B.防止血栓形成
 - C.观察和防治出血
 - D.防止感染
 - E.防止尿道狭窄
- 434.患者，女，48岁。出现头痛伴频繁呕吐入院。患者突然出现意识不清，脉搏、呼吸减慢，左、右瞳孔明显不等大。应考虑其发生了（ ）
- A.脑血栓形成
 - B.脑疝
 - C.高血压危象
 - D.蛛网膜下腔出血
 - E.癫痫发作

435. 直肠肛管周围脓肿的分类中，最多见的是（ ）
- 直肠后间隙脓肿
 - 肛周皮下脓肿
 - 直肠粘膜下脓肿
 - 骨盆直肠间隙脓肿
 - 坐骨肛管间隙脓肿
436. 原发性肝癌最早、最常见的转移途径是（ ）
- 淋巴转移
 - 肝外转移
 - 种植转移
 - 血行转移
 - 肝内血行转移
437. 患者，男性，28岁，打球时不慎跌倒受伤。X线检查：右肱骨髁上骨折。骨折临床愈合后肘关节功能的恢复主要取决于（ ）
- 足够的休息、康复时间
 - 床上活动
 - 功能锻炼
 - 石膏固定松紧度
 - 有没有内固定
438. 前尿道损伤致尿外渗的范围不包括（ ）
- 下腹壁
 - 阴茎
 - 会阴
 - 阴囊
 - 膀胱、前列腺周围
439. 患者，男，68岁，行胰头十二指肠切除术（Whipple术）后4小时，患者变换卧位后30分钟内，腹腔引流管突然引流出200ml鲜红色血性液体。正确的措施是（ ）
- 恢复原卧位
 - 加大吸引负压，促进引流
 - 严密观察生命体征，报告医生
 - 加快输液输血速度
 - 夹闭引流管，暂停引流
440. 肾癌根治术后，腹膜后引流管的正常拔出时间是术后（ ）
- 1天
 - 2~3天
 - 4~5天
 - 5~6天
 - 7天
441. 某患者因腹泻、呕吐入院，心电图：ST段水平压低，T波倒置，U波增高。最可能的病因是（ ）
- 高钾血症
 - 低钾血症
 - 高钙血症
 - 洋地黄效应
 - 洋地黄中毒
442. 患者女，20岁。寒战、发热，右小腿内侧皮肤出现鲜红色片状疹，烧灼样疼痛，附近淋巴结肿大疼痛。错误的护理措施是（ ）
- 遵医嘱使用抗生素
 - 嘱患者勿抬高患肢
 - 局部温热敷
 - 给予物理降温
 - 嘱患者卧床休息
443. 患者，女性，45岁，诊断肠梗阻，护士向患者介绍胃肠减压的目的，错误的是（ ）
- 排空胃肠道内积气积液
 - 缓解腹胀不适
 - 改善肠壁血液循环
 - 帮助恢复胃肠功能
 - 预防体液丢失
444. 患者，男，35岁，行腹外疝无张力修补术，术后为减轻切口张力，缓解疼痛，护士应主要采取的措施是（ ）
- 术后早期离床活动
 - 进高纤维食物
 - 避免用力咳嗽
 - 托起阴囊，避免处于低处

- E.取仰卧位，腠窝垫枕
- 445.患者，男，24岁，用力排便后有少量鲜血滴出，并在肛门处触及一无痛的肿块，可自行还纳。诊断为内痔，护士在进行健康教育是，错误的是（ ）
- 适度的体育运动可促进肠蠕动，防止便秘
 - 保持大便通畅
 - 嘱患者多喝水和进高纤维食物
 - 养成定时排便的习惯
 - 每次排便前用 1:5000 高锰酸钾温水坐浴
- 446.患者，女，47岁，行胆道切开取石+T管引流术，昨日开始进食，今日引流胆汁 50ml，提示发生了（ ）
- 引流管不通畅
 - 肝功能不佳
 - 胆道感染
 - 胆总管下端阻塞
 - Oddi括约肌痉挛
- 447.患者，男，21岁，因头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝，该患者的烧伤程度为（ ）
- 轻度
 - 重度
 - 特重度
 - 中度
 - 中重度
- 448.患儿，5岁，因煤气泄漏爆炸导致头面部烧伤，查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝，其烧伤面积为（ ）
- 22%
 - 9%
 - 11%
 - 16%
 - 24%
- 449.患者，女，65岁，在行走途中摔倒致股骨颈骨折，股骨颈骨折畸形可使患肢（ ）
- 缩短
 - 缩短，外旋
 - 缩短，内旋
 - 伸长，内旋
 - 伸长，外旋
- 450.患者，女性，60岁，因胆源性胰腺炎入院。护士进行健康指导时，应告知对预防胰腺炎再次发作最有意义的措施是（ ）
- 注意饮食卫生
 - 服用抗菌药
 - 经常服用消化酶
 - 治疗胆道疾病
 - 控制血糖
- 451.患者，男性，50岁，进行性吞咽困难半年，X线钡餐透视诊断为食管癌，该患者手术后最严重的并发症是（ ）
- 肺炎
 - 吻合口瘘
 - 吻合口狭窄
 - 乳糜胸
 - 出血
- 452.患者，男，55岁，胃癌根治术，术后进食发生呕吐，呕吐物仅为食物，不含胆汁，吐后症状缓解，可能并发（ ）
- 胃肠吻合口狭窄
 - 输入襻梗阻
 - 输出襻梗阻
 - 倾倒综合征
 - 十二指肠残端瘘
- 453.患者，女，33岁，大面积烧伤入院，以下选项中属于该患者第一个 24 小时内主要护理措施的是（ ）
- 心理护理
 - 包扎
 - 保持创面清洁
 - 扩充血容量
 - 镇痛
- 454.患者，女性，47岁，发现右侧乳房内无痛性肿块 2 个月，体检：右侧乳房外上象限可扪及直径约 4cm 的肿块，边界不清，质地硬，局部乳房皮肤出现“橘皮样”改变，经活组织病理学检查证实乳腺癌，该患者乳

房“橘皮样”改变是由于 ()

- A.淋巴管堵塞
- B.静脉堵塞
- C.动脉堵塞
- D.乳管堵塞
- E.Cooper 韧带受侵

455.患者,男,46岁,突发性右腰部刀割样绞痛,并向下腹部和外阴部放射,入院查体:右肾区叩击痛,尿常规镜检见血尿,诊断为上尿路结石,该患者发生肾绞痛是因为 ()

- A.结石合并上尿路感染
- B.结石活动或引起输尿管完全性梗阻
- C.结石嵌顿引起输尿管黏膜充血水肿
- D.结石压迫输尿管壁,引起输尿管壁坏死
- E.结石堵塞输尿管,引起肾积水

456.患者,男性,26岁,进餐后突然出现剧烈腹痛,入院查体:腹膜刺激征(+),肝浊音界缩小,X线见膈下游离气体。可初步判断为 ()

- A.炎症性病变
- B.穿孔性病变
- C.出血性病变
- D.梗阻性病变
- E.绞窄性病变

三、妇产科护理

(一)单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项,选项中有一个答案是正确的,参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂,多选、少选或不选均不得分。

1.患者,女性,38岁,于高处取物时不慎摔下,呈骑跨式,伤及外阴部位,疼痛难忍,此患者最可能出现血肿的部位在 ()

- A.小阴唇
- B.大阴唇
- C.阴阜
- D.阴蒂
- E.会阴

2.王女士,28岁,已婚,平时月经规律,周期约为32天。来医院咨询受孕相关知识,护士告知她的排卵日期约在月经周期的 ()

- A.第10天
- B.第12天
- C.第14天
- D.第16天
- E.第18天

3.护士小李给某中学女生做青春期健康知识讲座,其中关于月经描述错误的是 ()

- A.第一次月经来潮称月经初潮
- B.体弱或营养不良者月经初潮常推迟
- C.月经的出现是生殖功能成熟的一项标志
- D.月经量超过80ml为月经过多
- E.相邻两次月经第1天的间隔时间,称月经周期

4.患者,女性,24岁,已婚,停经45天,为了确诊其是否妊娠,快速且最准确的检查方法是 ()

- A.妊娠试验
- B.黄体酮试验
- C.基础体温测定
- D.超声检查
- E.宫颈粘液检查

5.患者,女性,24岁,已婚,平素月经规律,现停经52天,黄体酮试验无出血,最可能的诊断是 ()

- A.子宫内膜炎
- B.早期妊娠
- C.继发性闭经
- D.卵巢早衰
- E.宫颈粘连

6.李女士,27岁,已婚,平时月经规律,末次月经为2007年3月14日,B超证实为宫内孕,该孕妇的预产期是 ()

- A.2007年11月21日
- B.2007年12月21日

- C.2007 年 10 月 2 日
- D.2007 年 11 月 28 日
- E.2007 年 12 月 28 日

7.刘某, 初孕妇, 孕 36 周, 四步触诊结果: 子宫底部触到圆而硬的胎头, 胎背位于母体腹部右前方, 其胎方位为 ()

- A.骶左前
- B.骶右前
- C.枕右后
- D.枕右前
- E.枕左前

8.高女士, 孕 20 周, 产前检查时医生为其测量骶耻外径, 应选择的体位是 ()

- A.仰卧位, 双腿伸直
- B.右侧卧位, 左腿伸直, 右腿屈曲
- C.仰卧位, 双手抱膝
- D.左侧卧位, 右腿伸直, 左腿屈曲
- E.左侧卧位, 左腿伸直, 右腿屈曲

9.某孕妇, 末次月经不详, 检查发现子宫底位于脐与剑突之间, 胎心 140 次 / 分, 该孕妇可能的孕周是 ()

- A.24 周末
- B.26 周末
- C.28 周末
- D.30 周末
- E.32 周末

10.某孕妇, 常规产前检查, 咨询护士胎儿身长与妊娠周数的关系, 回答正确的是 ()

- A.妊娠 20 周末, 胎儿身长为 25 Cm
- B.妊娠 24 周末, 胎儿身长为 28 Cm
- C.妊娠 28 周末, 胎儿身长为 31 Cm
- D.妊娠 32 周末, 胎儿身长为 34 Cm
- E.妊娠 40 周末, 胎儿身长为 45 Cm

11.某初孕妇, 末次月经不详, 今日初感胎动, 其孕周大约为 ()

- A.妊娠 13.~14 周
- B.妊娠 15.~17 周
- C.妊娠 18.~20 周
- D.妊娠 21.~23 周
- E.妊娠 24.~26 周

12.某孕妇, 常规产前检查, 咨询护士妊娠足月孕妇的体重平均约增加多少, 回答正确的是 ()

- A.8.5kg
- B.10.5kg
- C.12.5kg
- D.14.5kg
- E.16.5kg

13.张护士给孕妇进行健康宣教, 指导孕妇休息时, 下列何种体位最佳 ()

- A.平卧位
- B.左侧卧位
- C.胸膝卧位
- D.头低足高位
- E.半卧位

14.某孕妇, 孕 30 周, 因平卧于床上看书, 感觉心悸.出汗, 正确的护理措施是 ()

- A.改为左侧卧位
- B.给予口服升压药
- C.立即坐起
- D.改为右侧卧位
- E.起身进行户外活动

15.陆女士, 孕 30 周, 其小腿下半部及踝部出现水肿, 休息后消退, 下列措施正确的是 ()

- A.严格限制盐的摄入
- B.严格限制水的摄入
- C.适当限制水的摄入
- D.适当限制盐的摄入
- E.可不做任何限制

16.护士给孕妇周女士进行健康宣教, 告知其孕期最简便而又较准确地测定胎儿安危的方法是 ()

- A.胎动计数
- B.缩宫素激惹试验

- C.羊膜镜检查
D.测定孕妇尿雌三醇值
E.胎心监测
- 17.护士小陈给孕妇林女士进行孕期宣教，告知她分娩最可靠的先兆是（ ）
A.宫底下降
B.不规则宫缩
C.阴道见红
D.胎动活跃
E.阴道分泌物增多
- 18.某产妇，规律宫缩 2 小时入院，护士给她做分娩知识的宣教，下列叙述错误的是（ ）
A.子宫收缩是分娩的主要产力
B.宫缩随产程进展逐渐增强
C.软产道是由子宫体.子宫颈.阴道及盆底软组织构成
D.初产妇第一产程时间平均为 11~12 小时
E.自然破膜多发生在宫口近开全时
- 19.某初产妇，23 岁，妊娠 38 周，规律宫缩 11 小时。肛查：宫口开大 8 Cm，诊断为（ ）
A.正常活跃期
B.潜伏期延长
C.活跃期延长
D.正常第二产程
E.第一产程延长
- 20.初产妇，孕 38 周，规律宫缩 10 小时，宫口开 8 Cm，胎头位于坐骨棘下 2 Cm，下列护理措施错误的是（ ）
A.鼓励产妇在宫缩间歇期少量多次进食
B.鼓励产妇每 2~4 小时排尿一次
C.绘制产程图，观察产程进展，
D.指导产妇正确使用腹压
E.做好心理支持
- 21.某新生儿出生后，经检查心率每分钟 98 次，呼吸浅慢不规则，全身皮肤青紫，吸痰器清理呼吸道时喉部有轻微反射，四肢肌张力稍有抵抗，请问该新生儿 Apg Ar 评分应为（ ）
A.0 分
B.3 分
C.5 分
D.6 分
E.7 分
- 22.某产妇，产后第一天，护士向其做产后乳房护理指导，不正确的指导是（ ）
A.哺乳前可按摩乳房
B.喂奶结束后，挤出乳汁涂抹于乳头上
C.可用湿毛巾清洁乳房
D.可用酒精清洁乳头
E.使用合适大小的乳罩
- 23.王女士，顺产后 5 天，母乳喂养，母子无异常情况，今日出院。护士给予出院指导，下列内容错误的是（ ）
A.保持合理均衡的营养
B.产褥期结束后采取工具避孕，防止意外怀孕
C.告知产妇产后 2 个月携婴儿来本院进行健康检查
D.尽早做产后康复操，促进腹壁及盆底肌肉张力的恢复
E.勿过早从事体力劳动
- 24.某高危孕妇，孕 35 周，医生需要了解胎儿成熟度，用以决定终止妊娠的时间。下列哪项不能测定胎儿成熟度（ ）
A.卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
B.肌酐值
C.脂肪细胞计数
D.胆红素测定
E.胎盘生乳素测定
- 25.某高危孕妇，孕 35 周，医生需要了解胎盘功能，下列哪项不能测定胎盘功能（ ）
A.卵磷脂 / 鞘磷脂比值测定
B.胎儿电子监护
C.胎动计数
D.盆腔 B 超
E.雌三醇测定
- 26.护士给孕妇林女士进行健康宣教，告知她 12 小时的胎动总数多少，即提示为胎儿窘迫的是（ ）
A.10 次以下

- B.15 次以下
- C.20 次以下
- D.25 次以下
- E.30 次以下

- 27.初产妇,26岁,妊娠40周,规律宫缩5小时,胎头高浮,胎心140次/分,宫口开大2Cm。6小时后破膜,立即听胎心率,减慢至80次/分。本例应首先考虑的是()
- A.胎头受压,脑血流量一时性减少
 - B.脐带脱垂
 - C.胎盘功能不良
 - D.宫体包裹胎体
 - E.脐带绕胎儿颈部
- 28.初产妇,27岁,妊娠39周,规律宫缩12小时,宫口开大3Cm,胎膜未破,胎心116次/分,胎心监护有多个晚期减速出现。本例正确处置应是()
- A.吸氧,严密观察产程进展
 - B.人工破膜
 - C.灌肠,督促排尿
 - D.静脉滴注缩宫素,加速产程进展
 - E.立即行剖宫产术
- 29.某孕妇,26岁,妊娠38周,入院待产。夜间呼唤护士,自述感觉胎动过频,此时错误的处理是()
- A.立即听胎心音
 - B.通知值班医生
 - C.吸氧
 - D.左侧卧位
 - E.立即做好剖宫产的术前准备
- 30.患者,女性,25岁。停经45天,阴道少量流血2天,伴下腹部轻度酸痛,尿妊娠试验(+)妇科检查:宫口闭,子宫6周妊娠大小,考虑哪项诊断()
- A.先兆流产
 - B.难免流产
 - C.不全流产
 - D.完全流产
 - E.稽留流产
- 31.患者,女性,28岁,已婚,现停经50天,有少量阴道流血,无腹痛,医生诊断为先兆流产,患者比较担心。对该患者的处理,下列哪项是错误的()
- A.卧床休息
 - B.定期妇科检查以明确病情进展
 - C.可使用对胎儿危害小的镇静剂
 - D.经过2周治疗病情不缓解应停止保胎
 - E.提供心理支持
- 32.患者,女性,23岁,停经45天,2天前有少量阴道出血,今晨起阴道流血量增多,多于月经量,阵发性腹痛加重。查体:子宫如孕40天大小,宫口开。需采取以下哪项措施()
- A.遵医嘱使用保胎药物
 - B.立即行清宫手术
 - C.可不需特殊处理
 - D.需做凝血功能检查
 - E.卧床休息
- 33.初孕妇,33岁。产前检查发现其骨盆为漏斗型骨盆。现因足月妊娠,胎膜早破来就诊。查体:胎头未入盆。医嘱:入院行各项检查,拟次日行剖宫产术。护士对其进行健康教育,不正确的内容是
- A.解释产道异常对母儿的影响
 - B.说明剖宫产的必要性
 - C.解释剖宫产的术前、术后注意事项
 - D.嘱其注意胎动
 - E.鼓励术前多下床活动
- 34.患者,女性,25岁,已婚,停经48日,阴道流血1日,下腹隐痛5小时。检查子宫前倾如鹅卵大,宫口闭。对确诊最有价值的检查项目应是()
- A.黄体酮试验
 - B.测量基础体温
 - C.尿妊娠试验
 - D. B型超声检查
 - E.诊断性刮宫
- 35.患者,女性,已婚,27岁。停经50日,阴道少量流血1日。今晨5时无原因出现下腹剧痛,伴恶心呕吐及一过性晕厥。查面色苍白,血压70/40mmHg,脉搏120次/分,妇科检查:宫颈举痛明显,后穹窿触痛(+),盆腔触诊不满意。此时最适宜的处理方法是()

- A.住院观察病情
B.给予止痛药物
C.行阴道后穹隆穿刺，并做急诊手术准备
D.指导进食以增加热量摄入
E.行腹腔镜检查
- 36.孕妇，妊娠 36 周，主诉头晕、头痛、视物模糊、恶心。查血压 160/110mmHg，尿蛋白 6g/24h，下肢水肿（++），诊断可能性最大的为（ ）
A.妊娠期高血压
B.子痫前期轻度
C.妊娠水肿
D.子痫前期重度
E.子痫
- 37.某孕妇，孕 36 周，诊断为妊娠期高血压疾病（子痫前期轻度），治疗药物首选（ ）
A.硫酸镁
B.苯妥英钠
C.山莨菪碱
D.利血平
E.胍屈嗪
- 38.某孕妇，26 岁，因妊娠高血压疾病用硫酸镁治疗，发生了中毒现象，除应停药外，还应给予（ ）
A.5%的葡萄糖静脉滴注
B.肌注山莨菪碱
C.静注 50%的葡萄糖
D.静注 10%的葡萄糖酸钙
E.静注低分子右旋糖酐
- 39.患者，女性，35 岁，孕 32 周，因妊娠期高血压疾病入院治疗，医嘱使用硫酸镁。关于硫酸镁的使用，下列说法错误的是（ ）
A.硫酸镁能较好地预防控制子痫的发作
B.24 小时硫酸镁用量 25~30g
C.硫酸镁中毒首先表现为膝反射消失
D.出现中毒反应须立即停药，并用葡萄糖酸钙缓慢推注
E.静脉滴注时速度以每小时 2~3g 为宜
- 40.初孕妇，37 岁，妊娠 39 周，诊断为妊娠期高血压疾病（子痫前期重度），枕左前位，胎心 140 次/分，骨盆外测量正常。本例恰当处理应是（ ）
A.积极治疗，等待产程自然发动
B.积极治疗 24~48 小时病情无好转，应终止妊娠
C.积极治疗 1 周后病情无好转，应终止妊娠
D.立即引产
E.立即行剖宫产术
- 41.患者，女性，35 岁，初孕妇，孕 35 周，因妊娠期高血压疾病（子痫前期重度）于今日上午入院，即给予解痉、镇静等治疗。3 小时后，患者突然出现抽搐，医生诊断为子痫，对该患者的护理措施错误的是（ ）
A.遵医嘱使用硫酸镁控制抽搐
B.专人护理，患者取头低侧卧位
C.床边加床档，防止摔伤
D.子痫控制后继续妊娠，尽量延长到妊娠足月
E.减少刺激，治疗和护理尽量轻柔且相对集中
- 42.孕妇，妊娠 33 周，无诱因阴道出血约 100ml，腹部检查：腹软，无压痛，胎位清楚，胎心 158 次/分，阴道可见少量血液，最可能的诊断是（ ）
A.胎盘早剥
B.早产
C.前置胎盘
D.妊娠期高血压疾病
E.见红
- 43.经产妇，30 岁，妊娠 38 周，阴道无痛性少量流血 2 日，检查枕左前位，胎头高浮，胎心 142 次/分。产后检查见胎膜破口距胎盘边缘 4 Cm，胎盘边缘有黑紫色陈旧血块附着。本例的最终诊断应是（ ）
A.边缘性前置胎盘
B.Ⅱ度胎盘早剥
C.完全性前置胎盘
D.部分性前置胎盘
E.Ⅰ度胎盘早剥
- 44.初孕妇，27 岁，妊娠 33 周，枕左前位。少量阴道无痛性流血，无宫缩，胎心 140 次/分本例最恰当的处理应是（ ）

- A.期待疗法
- B.催产素引产
- C.人工破膜
- D.行剖宫产术
- E.口服止血药物

- 45.患者，女性，25岁，妊娠31周，无痛性阴道出血2次。检查发现：胎心规律，140次/分钟，子宫无压痛，阴道流血量少于月经量，B超提示为部分性前置胎盘。对该患者正确的护理措施是（）
- A.卧床休息，左侧卧位
 - B.定期肛查，以了解宫口有无扩张
 - C.定期阴道检查，以了解宫口有无扩张
 - D.立即缩宫素引产
 - E.立即剖宫产
- 46.孕妇，妊娠35周，妊娠期高血压疾病（子痫前期重度）于昨日下午入院，经治疗无明显好转。今晨突然感到剧烈腹痛，并伴少量阴道流血。检查：血压140/100mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，有压痛，胎位不清，最可能的诊断是（）
- A.妊娠合并急性阑尾炎
 - B.先兆子宫破裂
 - C.前置胎盘
 - D.先兆早产
 - E.胎盘早剥
- 47.某孕妇，妊娠28周，腹部遭遇撞击后出现持续性腹痛，阴道无流血。查体：面色苍白，血压75/50mmHg，子宫大于妊娠周数，硬如板状，有压痛，胎心胎动消失，诊断为重型胎盘早剥。错误的处理是（）
- A.纠正休克
 - B.立即催产素引产终止妊娠
 - C.严密观察病情
 - D.立即剖宫产终止妊娠
 - E.积极防治DIC、产后出血等并发症
- 48.孕妇，妊娠35周，宫缩规律，间隔5~6分钟，持续约40秒，查宫颈管消退80%，宫口扩张3cm，诊断为（）
- A.先兆临产
 - B.早产临产
 - C.假临产
 - D.足月临产
 - E.生理性宫缩
- 49.患者，女性，32岁。妊娠33周，出现不规则宫缩，宫口未开，胎膜未破，胎心140次/分。首要处理应是（）
- A.抑制宫缩，促进胎儿肺成熟
 - B.卧床休息，右侧卧位
 - C.促进宫缩
 - D.顺其自然
 - E.吸氧
- 50.某孕妇，孕35周，先兆早产，为预防早产儿特发性呼吸窘迫综合症，可在分娩前对孕妇使用哪种药物（）
- A.给氧
 - B.能量合剂
 - C.小三联注射
 - D.地塞米松
 - E.抗生素
- 51.某孕妇，孕30周，腹壁紧张，膨隆，医生诊断为羊水过多，需要腹壁穿刺放羊水，放水速度宜控制在每小时约（）
- A.200ml
 - B.300ml
 - C.400ml
 - D.500ml
 - E.600ml
- 52.某孕妇，孕33周，腹壁膨隆，子宫大于妊娠月份，医生诊断为羊水过多，需要腹壁穿刺放羊水，一次放水量不超过（）
- A.500ml
 - B.800ml
 - C.1200ml
 - D.1500ml
 - E.2000ml

- 53.患者，女性，23岁，初次怀孕，孕16周出现心慌、气短，经检查发现心功能Ⅱ级。给予严密孕期监测，目前孕37周，自然临产。该产妇的体位最好是（）
- 平卧位
 - 右侧卧位
 - 随意卧位
 - 左侧卧位上半身抬高
 - 仰卧位
- 54.患者，女性，32岁。妊娠合并心脏病，于妊娠足月顺产一男婴，产后心功能Ⅲ级，该产妇的产褥期护理正确的是（）
- 产后前3天，最容易发生心衰
 - 产后30分钟可以开奶
 - 产后第2天可下床活动，防止便秘
 - 为避免菌群失调，不使用抗生素治疗
 - 指导做产后体操，尽早恢复盆底肌肉张力
- 55.患者，女性，33岁，妊娠2个月，一般家务劳动后感心悸、气短和胸闷。查体：心率每分钟118次，呼吸每分钟22次，心尖区有Ⅲ级收缩期杂音，肺底部有湿啰音，下肢水肿（+）。正确的处理是（）
- 心衰控制后，继续妊娠
 - 加强整个孕期的监护
 - 在以后的孕期饮食中限制食盐的摄入
 - 心衰控制后人工流产终止妊娠
 - 立即人工流产终止妊娠
- 56.患者，女性，29岁，妊娠合并心脏病。目前孕37周，自然临产。对该产妇在分娩期护理措施中错误的是（）
- 产程开始即给予抗生素预防感染
 - 胎儿娩出后，腹部立即放置沙袋
 - 缩短第二产程，避免产妇屏气用力
 - 严密观察产程进展，防止心力衰竭的发生
 - 产后立即肌注麦角新碱以减少产后出血
- 57.患者，女性，25岁，已婚，因妊娠36周合并乙肝住院。对该患者的护理，下列哪项是错误的（）
- 应与正常孕妇隔离
 - 临产前1周给予维生素K1每日肌注
 - 第二产程胎肩娩出后立即给予缩宫素静脉注射
 - HBEAg阳性者不宜哺乳，可用雌激素予以退奶
 - 产后宜选用对肝脏损伤小的广谱抗生素预防感染
- 58.某孕妇，29岁，妊娠30周，测空腹血糖2次均 $>7.0\text{mmol/L}$ ，诊断为妊娠期糖尿病。错误的护理措施是（）
- 监测血糖变化
 - 合理控制孕妇饮食
 - 可选用适宜的口服降糖药治疗
 - 确保母婴安全的前提下，尽量推迟终止妊娠的时间
 - 指导患者适度运动
- 59.孕妇，妊娠27周，在产前检查中发现其血色素偏低，需要补充铁剂，正确的服药时间是（）
- 餐前半小时
 - 餐后20分钟
 - 空腹时
 - 睡前
 - 晨起后
- 60.某孕妇，26岁，产检时发现血色素 8g/L ，血细胞比容0.2，红细胞计数 $3.2\times 10^{12}/\text{L}$ ，诊断为妊娠期贫血。护士应告诉孕妇在口服铁剂时应同时服（）
- 维生素A
 - 维生素B
 - 维生素C
 - 维生素D
 - 维生素E
- 61.产妇，王某，产后第一天，护士向其做产后乳房护理指导，不正确的指导是（）
- 哺乳前可按摩乳房
 - 喂奶结束后，挤出乳汁涂抹于乳头上
 - 可用湿毛巾清洁乳房
 - 可用酒精清洁乳头
 - 使用合适大小的乳罩
- 62.某产妇，26岁，规律宫缩10小时，宫口开大2Cm，协调性子宫收缩乏力，头盆相称，胎位正常，最恰当的处理是（）

- A.镇静剂
- B.催产素静滴
- C.人工破膜
- D.肌注杜冷丁
- E.剖宫产

63.妊娠足月产妇，胎位正常，无头盆不称，协调性子宫收缩乏力，拟静滴缩宫素增强宫缩，在 0.9%生理盐水 500ml 中应加入缩宫素（ ）

- A.2.5U
- B.3U
- C.3.5U
- D.4U
- E.4.5U

64.初产妇，足月临产，产程中出现宫缩乏力，医嘱使用缩宫素增强宫缩。下列关于缩宫素静滴时的注意事项，哪项是错的（ ）

- A.专人观察
- B.注意胎心
- C.注意血压
- D.一般滴速不超过 50 滴/分钟
- E.以 4~5 滴/分钟开始

65.某产妇，骨盆测量显示入口平面轻度狭窄，其余平面正常，胎儿估计 3000g，准备给予试产，进行试产的时间应是（ ）

- A.2~4 小时
- B.3~5 小时
- C.4~6 小时
- D.5~7 小时
- E.6~8 小时

66.经产妇，27 岁，因子宫收缩过强，出现急产，对于其新生儿正确的护理措施是（ ）

- A.早吸吮
- B.出生后半小时内喂葡萄糖水
- C.按医嘱给维生素 K1 肌注
- D.新生儿沐浴每天 1 次
- E.新生儿抚触每天 2 次

67.某孕妇，产前检查时发现胎儿臀位，需要给予胎位矫治。护士应告知其最佳的干预时间是（ ）

- A.孕 20 周后
- B.孕 22 周后
- C.孕 24 周后
- D.孕 28 周后
- E.孕 30 周后

68.某孕妇，臀先露，为矫正胎位，护士应告知其可采取的体位是（ ）

- A.膝胸卧位
- B.半卧位
- C.左侧卧位
- D.膀胱截石位
- E.俯卧位

69.初孕妇，28 岁，妊娠 39 周，主诉肋下有块状物。腹部检查：子宫呈纵椭圆形，胎先露部较软且不规则，胎心在脐上偏左，本例应诊断为（ ）

- A.肩先露
- B.臀先露
- C.额先露
- D.枕先露
- E.面先露

70.初产妇，28 岁，妊娠 40 周，规律宫缩 12 小时，近 2 小时产程无进展，产妇呼喊疼痛，腹部拒按，子宫呈痉挛性收缩，胎位触不清，胎心 152 次/分。肛查宫口开大 5 Cm，胎头 S+1，胎膜未破。本例正确处理应是（ ）

- A.阴道检查后再决定分娩方式
- B.静脉滴注缩宫素
- C.肌注哌替啶 100mg
- D.人工破膜后静滴缩宫素
- E.立即行剖宫产术

71.初孕妇，27 岁，妊娠 38 周。骨盆测量：骶耻外径 19cm，髂棘间径 26cm，髂嵴间径 28cm，坐骨棘间径 9cm，坐骨结节间径 7cm。该孕妇的骨盆应诊断为（ ）

- A.扁平型骨盆

- B.均小骨盆
- C.佝偻病性扁平骨盆
- D.漏斗型骨盆
- E.类人猿型骨盆

72.产妇，足月临产，规律宫缩 10 小时，宫口开 7cm，此时产妇主诉有排便感，可能的胎位为（ ）

- A.持续性枕横位
- B.持续性枕后位
- C.颜面位
- D.横位
- E.臀位

73.初产妇，孕 35 周，有液体从阴道流出来院，无腹痛。行肛查，触不到羊膜囊，上推胎儿先露部可见到流液量增多，胎心率正常。最可能的诊断为（ ）

- A.先兆流产
- B.先兆早产
- C.临产
- D.胎膜早破
- E.胎盘早剥

74.孕妇，25 岁，孕 37 周，晨起发现阴道流液，入院后诊断为胎膜早破。护士应指导孕妇的体位是（ ）

- A.仰卧位
- B.右侧卧位
- C.头高足低位
- D.左侧卧位，抬高臀部
- E.半坐卧位

75.某孕妇，妊娠 32 周，因“胎膜早破”14 小时入院，检查发现胎心正常，无腹痛，体温正常。错误的护理措施是（ ）

- A.卧床休息，抬高臀部
- B.严密观察孕妇生命体征
- C.监测白细胞计数
- D.监测胎儿宫内安危
- E.保持外阴清洁干燥，目前无需使用抗生素

76.某产妇，胎儿娩出后 24 小时出血量达 600ml，检查子宫软，按摩后子宫变硬，阴道流血减少，该产妇诊断为产后出血。造成该产妇产后出血的最可能原因是（ ）

- A.子宫收缩乏力
- B.胎盘残留
- C.软产道裂伤
- D.凝血功能障碍
- E.胎膜残留

77.产妇，妊娠 39 周，顺产一女婴，胎盘胎膜娩出完整，产后 30 分钟阴道出血增多，宫底位于脐上 3 横指，子宫软，按压宫底排出血液及血块约 500ml。首要的处理原则是（ ）

- A.检查凝血功能
- B.抗感染
- C.检查软产道
- D.加强宫缩
- E.清理宫腔

78.患者，女性，妊娠 38 周，阴道分娩，胎儿娩出后即有较多的持续性阴道流血，色鲜红，能凝固，出血原因最可能是（ ）

- A.胎盘剥离不全
- B.胎盘植入
- C.产后宫缩乏力
- D.凝血功能障碍
- E.软产道损伤

79.初产妇，妊娠 40 周，胎儿经阴道娩出后，护士立即为其按摩子宫并协助胎盘娩出，这一行为可能导致不良后果是（ ）

- A.胎盘粘连
- B.子宫胎盘卒中
- C.胎盘嵌顿
- D.胎盘植入
- E.胎盘剥离不全

80.某产妇，孕 3 产 1，因前置胎盘行剖宫产，术中胎儿娩出后行人工剥离胎盘很困难，发现胎盘部分绒毛植入子宫肌层，宫腔内出血不止。下面哪项处理是恰当的（ ）

- A.立即用力将胎盘拉出
- B.刮宫术

- C.按摩子宫
- D.立即给予缩宫素
- E.子宫切除

- 81.胎儿娩出后 10 分钟，产妇出现阴道流血约 200ml，助产士用手在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，外露脐带回缩，此时助产士正确处理方法应是（ ）
- A.继续等待胎盘剥离
 - B.按压宫底用手牵拉脐带
 - C.按摩子宫刺激子宫收缩
 - D.徒手剥离胎盘后取出
 - E.静注缩宫素 20U
- 82.患者，女性，24 岁，初孕妇，妊娠 38 周，在临产过程中，出现烦躁不安，下腹疼痛难忍，拒按，排尿困难。首先考虑的诊断是（ ）
- A.妊娠合并急性阑尾炎
 - B.先兆子宫破裂
 - C.前置胎盘
 - D.胎盘早剥
 - E.先兆早产
- 83.初产妇，临产后静脉滴注缩宫素，破膜后不久突然出现烦躁不安.呛咳.呼吸困难.紫绀，数分钟后死亡。本例最可能的诊断应是（ ）
- A.重度子痫前期
 - B.低纤维蛋白原血症
 - C.羊水栓塞
 - D.Ⅲ度胎盘早剥
 - E.子宫破裂
- 84.患者女性，足月产后 3 天，出现下腹痛，低热，恶露多，有臭味，子宫底脐上一指，子宫体软。考虑其最可能的病理是（ ）
- A.急性子宫内膜炎
 - B.急性子宫肌炎
 - C.急性输卵管炎
 - D.急性盆腔结缔组织炎
 - E.盆腔腹膜炎
- 85.产妇，31 岁，产后 2 周，下肢肿胀，疼痛，皮肤紧张.发白，该产妇可能发生的产后并发症是（ ）
- A.产后贫血
 - B.产后下肢血栓性静脉炎
 - C.产后高血压
 - D.产后关节炎
 - E.产后糖尿病
- 86.产妇，29 岁，顺产后 10 天，仍有较多阴道流血，体温正常。导致该患者晚期产后出血最可能的原因是（ ）
- A.子宫复旧不全
 - B.子宫胎盘附着面感染
 - C.蜕膜残留
 - D.绒毛
 - E.胎盘.胎膜残留
- 87.某产妇，10 日前顺产一女婴。现出现低热，恶露多有臭味，查宫底位于耻骨联合上一横指，有明显压痛，B 型超声检查提示宫腔内有残留组织，对该患者错误的处理是（ ）
- A.监测各项生命体征
 - B.取宫腔分泌物行细菌培养
 - C.静滴广谱抗生素
 - D.肌注缩宫素促进宫缩
 - E.立即刮宫清除残留组织
- 88.某产妇，产后 3 天，诉会阴部疼痛难忍，查体：会阴部肿胀，左侧切口红肿.有触痛，以下处理正确的是（ ）
- A.该产妇切口愈合不佳，应延期拆线
 - B.予 50%乙醇湿敷会阴，减轻肿胀
 - C.每日外阴擦洗 2~3 次，保持清洁.干燥
 - D.指导产妇取左侧卧位
 - E.指导产妇用 1:5000 高锰酸钾液坐浴
- 89.产妇，产后 3 天，下腹疼痛，低热，恶露多有臭味，该产妇宜采取的体位是（ ）
- A.侧卧位
 - B.仰卧位
 - C.半坐卧位

- D.头低足高位
E.俯卧位
- 90.患者，女性，60岁。无流产，早产1次，足月产3次，现存子女2人，生育史可描述为（）
A.1-0-3-2
B.1-0-2-3
C.3-1-0-2
D.3-0-1-2
E.3-2-0-1
- 91.患者女，35岁，已婚。主诉近日白带增多，外阴瘙痒伴灼痛1周。妇科检查：阴道内多量灰白泡沫状分泌物，阴道壁散在红斑点。有助于诊断的检查是（）
A.阴道分泌物悬滴检查
B.宫颈刮片
C.盆腔B超
D.诊断性刮宫
E.阴道镜检查
- 92.某孕妇，患有外阴阴道假丝酵母菌病，孕妇担心胎儿被感染，向护士咨询其正确用药方法是（）
A.阴道塞制霉菌素片
B.口服制霉菌素片
C.口服抗生素
D.全身用药
E.酸性溶液坐浴
- 93.患者，女性，38岁，因外阴瘙痒，灼痛，白带呈豆渣样就诊，医生诊断为外阴阴道假丝酵母菌病。关于该病的认识，患者认知错误的是（）
A.白色念珠菌是寄生在阴道、口腔、肠道的条件致病菌
B.常见于妊娠妇女、糖尿病患者及接受大量雌激素治疗的患者等
C.性交是该病的主要传播途径
D.阴道分泌物悬滴检查，找到芽孢和假菌丝可确诊
E.该病的典型症状是外阴瘙痒、灼痛，白带呈豆渣样
- 94.患者女性，60岁，患老年性阴道炎，该患者询问护士发病原因，护士告知直接影响阴道自净作用的激素下降，这个激素是（）
A.孕激素
B.雌激素
C.促黄体生成素
D.促卵泡素
E.促性腺激素释放激素
- 95.患者女性，29岁，外阴不适，白带增多。辅助检查：氨试验，有烂鱼样腥臭味。该患者所患疾病最可能是（）
A.细菌性阴道病
B.外阴阴道假丝酵母菌病
C.外阴瘙痒症
D.萎缩性阴道炎
E.滴虫性阴道炎
- 96.患者，女性，50岁，因白带增多，外阴不适就诊，医生诊断为萎缩性阴道炎，给予局部用药。下列哪个溶液适合对该患者进行阴道灌洗（）
A.1%乳酸溶液
B.2%乳酸溶液
C.2~4%碳酸氢钠溶液
D.5%醋酸溶液
E.0.9%氯化钠溶液
- 97.患者，女性，30岁，因稀薄泡沫状白带增多就诊，医生诊断为滴虫性阴道炎，给予局部用药。护士对该患者进行健康指导，下列说法错误的是（）
A.养成良好的卫生习惯，保持外阴清洁
B.内裤及洗涤用物要煮沸5~10分钟消毒，以免重复感染
C.指导患者正确用药，并在下次月经后复查白带，阴性为治愈
D.性伴侣同时治疗
E.治疗期间禁止性生活
- 98.患者女性，37岁，已产，医生诊断为宫颈中度糜烂，拟予微波治疗。患者询问治疗的时间，护士告知最佳时间是（）
A.月经来潮前3~7天
B.排卵期
C.无时间限制
D.确诊后

- E.月经干净后 3~7 天
- 99.患者女性, 35 岁, 已产, 医生诊断为宫颈重度糜烂, 给予微波治疗。患者询问治疗后禁止性生活和盆浴的时间, 护士应回答 ()
- 1~2 周
 - 2~3 周
 - 3~6 周
 - 4~8 周
 - 6~12 周
- 100.患者女性, 32 岁。尚未生育, 体检时发现宫颈中度糜烂, 针对该患者, 最合适的处理是 ()
- 门诊随访观察
 - 局部药物治疗
 - 口服抗生素
 - 排除早期宫颈癌后进行物理治疗
 - 宫颈锥切术
- 101.患者, 女, 37 岁, G2P1。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏Ⅲ级。患者询问检查结果的意义, 正确的解释是 ()
- 轻度炎症
 - 重度炎症
 - 可疑癌症
 - 高度可疑癌症
 - 癌症
- 102.患者, 女性, 40 岁, 宫颈刮片报告显示为“高度可疑癌”, 需要进一步做宫颈活检。关于宫颈活检哪项是错误的 ()
- 是确诊宫颈癌最有效的方法
 - 钳取宫颈病变区边缘组织为宜
 - 碘试验着色区域活检诊断价值高
 - 宜多点取材
 - 标本固定送病检
- 103.患者, 40 岁, 女, 平素月经周期规律, 经量中等, 经期 3~4 天, 普查发现子宫肌瘤。患者咨询有关信息, 下列回答不妥的是 ()
- 子宫肌瘤是良性肿瘤, 其发生和生长主要与雌激素长期刺激有关
 - 为防止恶变, 一经确诊即应手术
 - 月经期间应多休息, 避免疲劳
 - 肌瘤伴经量过多致贫血者可服用铁剂
 - 年轻患者可行肌瘤摘除术, 保留生育功能
- 104.患者, 女性, 58 岁, 已绝经 3 年, 近 10 天出现不规则阴道流血, 应首先考虑 ()
- 功血
 - 子宫肌瘤
 - 生殖道炎症
 - 生殖道恶性肿瘤
 - 多囊卵巢综合征
- 105.53 岁妇女, 绝经 4 年, 阴道流脓血样物伴有臭味月余。妇科检查子宫稍大、稍软, 有压痛, 双附件未触及异常。本例最有价值的处置是 ()
- 检查血、尿常规
 - 宫颈刮片细胞学检查
 - 阴道分泌物涂片查病原体
 - 分段诊刮活组织检查
 - 静滴广谱抗生素消炎治疗
- 106.27 岁妇女, 停经近 3 个月, 阴道少量流血 5 日。查子宫如妊娠 4 个月大, 软, 双附件区各有 5 Cm×5 Cm×3 Cm 囊性肿物, 本例应考虑是 ()
- 先兆流产
 - 难免流产
 - 葡萄胎
 - 早孕合并卵巢囊肿
 - 先兆流产合并卵巢囊肿
- 107.患者, 女性, 28 岁, 已婚, 因足月产后一年出现不规则阴道出血就诊, 医生诊断为绒毛癌, 给予化疗。关于化疗的护理措施, 下列叙说正确的是 ()
- 根据体重正确计算及调整药量
 - 化疗药物应现用现配, 一般常温下不超过 2 小时
 - 保护静脉, 从近端开始, 有计划地穿刺
 - 静脉点滴时如发现药物外渗, 应立即停止滴入, 局部热敷, 促进药液吸收
 - 用药期间若白细胞低于 $2.0 \times 10^9/L$

9/L 应停药

108.患者,女性,55岁,宫颈癌根治术后2天,患者询问护士其尿管何时可拔出,护士的回答是()

- A.1~3天
- B.2~5天
- C.3~7天
- D.7~14天
- E.2~3周

109.一子宫肌瘤患者,行子宫全切术,护士为其进行术后指导,告知患者术后阴道残端肠线吸收,可致阴道少量出血,大约在术后()

- A.1~2天出现
- B.1~2周出现
- C.3~4天出现
- D.3~4周出现
- E.5~6天出现

110.患者,女性,子宫肌瘤,定于周四上午在连续硬膜外麻醉下行次全子宫切除术,周三需做的术前准备不包括()

- A.皮肤准备
- B.测量生命体征
- C.抽血做血型鉴定及交叉配血试验
- D.心理护理
- E.留置尿管

111.患者,女性,30岁,卵巢良性肿瘤,准备行经腹卵巢肿瘤切除术,术前准备不正确的是()

- A.术前1天备皮,范围为上至剑突,两侧至腋中线,下至大腿上1/3及外阴部皮肤
- B.术前3天每日阴道冲洗2次
- C.术前8小时禁食,4小时禁饮
- D.术前半小时安置导尿管
- E.为保证良好的休息,术前1天晚上睡前可给予适量镇静剂

112.某女,35岁已婚妇女,近年来,月经周期30~32天,月经持续10~15天,经量时多时少。基础体温呈双相,为明确诊断需行刮宫术,时间应在()

- A.月经来潮前1周
- B.月经来潮12小时内
- C.月经第3天
- D.月经第5天
- E.月经来潮24小时内

113.患者,女性,38岁,已婚,自然流产1次,2年未避孕,未怀孕,月经周期正常,经期延长,量正常,医生告知需做诊刮术。患者询问护士诊刮目的是()

- A.确定有无排卵及黄体功能
- B.改善子宫内环境
- C.防止感染
- D.了解子宫大小
- E.促进子宫收缩

114.李女士,48岁,已婚,近一年月经紊乱,没有上医院就诊过。此次经量多且已持续10日,遂来就诊。检查子宫稍大,阴道内有较多活动性出血。本例止血措施应选择()

- A.给予氨甲苯酸
- B.给予大剂量己烯雌酚
- C.给予大剂量黄体酮
- D.给予大剂量丙酸睾酮
- E.立即行刮宫术

115.李女士,48岁,近半年出现月经紊乱就诊,医生诊断为围绝经期综合征。护士对其进行宣教,下列叙述错误的是()

- A.卵巢功能衰退是引起围绝经期综合征的主要原因
- B.围绝经期妇女都会出现围绝经期综合征
- C.潮热、出汗是雌激素降低的特征性表现
- D.可有阴道分泌物减少、张力性尿失禁等表现
- E.雌激素下降可使血胆固醇水平升高

116.王女士,32岁,已婚,近半年来月经表现为周期正常,经期延长,达10天以上,在患者月经第6日刮宫,见到分泌期反应的内膜,应考虑是()

- A.子宫内膜单纯型增生
- B.子宫内膜不规则脱落
- C.黄体功能不足
- D.萎缩型子宫内膜

- E.子宫内膜复杂型增生
- 117.李女士, 30岁, 已婚, 近一年来月经频发, 周期缩短, 基础体温双相型, 高温持续时间约 10 天, 初步考虑是 ()
- 子宫内膜单纯型增生
 - 子宫内膜不规则脱落
 - 黄体功能不足
 - 萎缩型子宫内膜
 - 子宫内膜复杂型增生
- 118.张某, 20岁, 未婚少女, 18岁初潮, 月经周期不规则, 2~3个月来潮一次, 每次经期达 10 余日, 量多, 无痛经, B 超显示盆腔无异常。本例恰当诊断应是 ()
- 月经过多
 - 黄体功能不足
 - 子宫内膜不规则脱落
 - 无排卵性功血
 - 以上都不是
- 119.患者, 女性, 16岁, 因月经不规律就诊, 诊断为无排卵性功血, 关于无排卵性功血的描述错误的有 ()
- 多见于青春期和绝经过渡期
 - 常见症状为子宫不规则出血
 - 出血期常伴腹痛
 - B 超检查子宫及双侧附件无异常
 - 基础体温呈单相型
- 120.李女士, 1年前阴道分娩一女婴, 产时出血约 800ml。现产后已 1年, 月经仍未恢复, 可能的问题是 ()
- 子宫性闭经
 - 卵巢性闭经
 - 垂体性闭经
 - 下丘脑性闭经
 - 肾上腺性闭经
- 121.患者, 女性, 34岁, 继发性闭经, 连续测基础体温 3个月, 均呈双相型, 提示闭经原因在于 ()
- 子宫
 - 卵巢
 - 垂体
 - 下丘脑
 - 其他内分泌腺
- 122.李某, 19岁未婚少女, 主诉剧烈痛经, 于月经来潮时需服强镇痛药并卧床。平时月经周期规律, 基础体温呈双相型曲线。肛查除子宫稍小外余未见异常。本例最可能的诊断是 ()
- 子宫内膜炎.子宫肌炎
 - 子宫腺肌病
 - 子宫肌瘤
 - 原发性痛经
 - 输卵管炎
- 123.患者, 女性, 28岁, 痛经 3年且逐渐加重, 2年前因不孕做过输卵管通液治疗, 子宫较正常略大, 后位, 不活动, 右侧触及 4×4×3 Cm 大的痛性包块, 与子宫粘连, 双宫骶韧带均触及豆粒大痛性结节, 本病首先考虑为 ()
- 陈旧性宫外孕
 - 生殖器结核
 - 慢性盆腔炎
 - 子宫内膜异位症
 - 输卵管卵巢囊肿
- 124.患者女, 45岁, 因“继发性痛经逐渐加重 10年”就诊。双侧卵巢囊性增大, 考虑为子宫内膜异位症。为进一步明确诊断, 首选的检查方法是 ()
- 双合诊
 - 三合诊
 - 腹腔镜
 - C A125
 - 盆腔 B 超
- 125.患者女性, 60岁。自诉腰骶部酸痛, 劳累后尤其明显。嘱患者平卧用力向下屏气时, 发现宫颈外口距处女膜缘 < 4 Cm, 未达处女膜缘。该患者属于 ()
- 子宫脱垂 I 度轻型
 - 子宫脱垂 I 度重型
 - 子宫脱垂 II 度轻型

- D.子宫脱垂Ⅱ度重型
E.子宫脱垂Ⅲ度
- 126.患者女性, 50岁, 子宫脱垂Ⅰ度轻型, 护士指导患者盆底肌肉组织锻炼的方法为 ()
A.下肢运动
B.收缩肛门的运动
C.仰卧起坐
D.俯卧撑
E.上肢运动
- 127.患者, 女性, 结婚2年未育, 医生诊断不孕症, 为明确原因, 要求患者测基础体温, 有关基础体温的描述, 错误的一项是 ()
A.无排卵周期呈单相型
B.有排卵周期呈双相型
C.受雌激素影响基础体温上升 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$
D.需连续测3个月以上
E.睡眠不足会影响结果
- 128.患者, 女性, 29岁, 结婚三年未孕, 为明确其卵巢功能, 可做下列哪个检查 ()
A.宫颈刮片
B.输卵管通液术
C.性交后试验
D.阴道分泌物检查
E.宫颈粘液检查
- 129.李女士, 42岁, 患慢性肾炎多年。半年前曾因早孕行人工流产术, 现要求避孕指导。本例选择最恰当的避孕措施应是 ()
A.安全期避孕
B.口服短效避孕药
C.皮下埋植避孕
D.避孕套避孕
E.行输卵管结扎术绝育
- 130.某妇女向医护人员咨询避孕药的相关知识, 告知其使用避孕药后可能出现的副作用不包括 ()
A.食欲减退.恶心.呕吐
B.乳房胀痛
C.月经量增多
D.体重增加
E.色素沉着
- 131.患者女性, 30岁。放置宫内节育器后3天, 有少量阴道流血, 自觉下腹轻度不适就诊。该患者最合适的处理是 ()
A.立即取出宫内节育器
B.应用抗生素, 待阴道流血停止后取环
C.暂不予处理, 观察1周后, 如症状不消失再就诊
D.常规消毒, 探查节育器位置是否正确
E.阴道B超下观察节育器位置是否正确
- 132.王女士, 30岁, 育有2孩, 来医院咨询宫内节育器的相关知识, 下列叙述错误的是 ()
A.常规放置时间为月经来潮后3~7天无性交
B.放置宫内节育器后可能出现经量增多, 腰酸等副作用
C.放置术后1周内避免重体力劳动
D.放置术后2周内禁止盆浴及性生活
E.术后出现明显腹痛.发热时应随时就诊
- 133.李女士, 因停经7周行人工流产术。术中出现心动过缓、血压下降、面色苍白、出汗、胸闷等。本例正确处置应是 ()
A.立即输液并输血
B.静脉注射阿托品
C.肌注肾上腺素
D.静脉滴注间羟胺
E.终止手术, 待病情好转再进行
- 134.王女士, 意外怀孕, 目前孕50天, 要求终止妊娠, 予以负压吸宫术。下列护理措施错误的是 ()
A.如患者在术中出现心动过缓.面色苍白.出冷汗等情况, 应暂停操作, 给予吸氧, 异常情况排除后方可继续手术
B.术后在观察室休息观察30分钟
C.嘱患者术后注意保持外阴清洁
D.嘱患者注意观察阴道流血和腹痛情况, 如出血多于月经量并伴有腹痛应及时就诊
E.嘱患者术后禁盆浴和性生活1个月

- 135.王女士, 30 岁, 负压吸宫术后, 不规则出血 15 天, 经抗菌素及宫缩剂治疗无效, 子宫稍大而软, 宫口开, 应首先考虑 ()
- 子宫内膜炎
 - 吸宫不全
 - 宫腔粘连
 - 月经不调
 - 子宫复旧不全
- 136.李某, 女 38 岁, 反复发作的前庭大腺炎症, 对于前庭大腺的描述错误的是 ()
- 位于大阴唇内侧
 - 一般检查时不能触及
 - 感染后腺管口闭塞可形成囊肿或脓肿
 - 又称巴氏腺
 - 大阴唇左右各一个腺体
- 137.王某, 女性 32 岁, 反复发作前庭大腺脓肿。关于前庭大腺位置正确的是 ()
- 小阴唇后部
 - 尿道后壁
 - 大阴唇后部
 - 阴道内侧壁
 - 阴道前庭内
- 138.胡某, 女性 27 岁, 常规婚前检查, 有关大阴唇的描述, 错误的是 ()
- 起自阴阜, 止于会阴
 - 两侧大阴唇前端为子宫圆韧带的起点
 - 皮层内有皮脂腺和汗腺
 - 有很厚的皮下脂肪层
 - 当局部受伤, 易发生出血, 可形成大阴唇血肿
- 139.徐某, 女性 25 岁, 常规婚前检查。有关外生殖器的解剖, 正确的是 ()
- 大阴唇损伤后极易形成囊肿
 - 小阴唇损伤后极易形成血肿
 - 前庭大腺分泌黏液起润滑作用
 - 阴蒂富含血管故也有勃起作用
 - 小阴唇起自阴阜, 止于会阴
- 140.陈某, 女性 26 岁, 常规婚前检查, 有关阴道的作用, 错误的是 ()
- 性交器官
 - 后穹隆是诊断疾病或手术的途径
 - 月经血排出通道
 - 腺体能分泌黏液润滑阴道口
 - 是胎儿娩出的通道
- 141.患者, 19 岁, 骑自行车不慎跌倒伤及外阴部位, 如出现外阴血肿最易发生在 ()
- 小阴唇
 - 会阴部
 - 大阴唇
 - 阴阜部
 - 阴蒂部
- 142.吴某, 女 24 岁, 第一胎孕 38 周, 医生检查跨耻征阳性, 骨盆入口平面狭窄, 入口平面的后端是 ()
- 第五腰椎棘突下
 - 骶骨下端
 - 骶尾关节
 - 骶骨岬前缘
 - 坐骨棘
- 143.28 岁女, 诊断为不孕症, 监测雌激素水平, 雌激素的生理作用正确的是 ()
- 降低妊娠子宫对催产素的敏感性
 - 使子宫内膜增生
 - 使宫颈黏液减少变稠, 拉丝度减少
 - 使阴道上皮细胞脱落加快
 - 以上都不是
- 144.付某, 17 岁, 女, 第二性征发育不明显。可促进乳房发育, 使乳腺管增生的激素是 ()
- 雌激素
 - 孕激素
 - 雄激素
 - 胎盘生乳素
 - 生乳素抑制激素
- 145.黄某, 14 岁, 女, 月经初潮, 月经周期不规律, 经量增多, 正常月经量大约是 ()
- 10 ~ 20ml

- B.20 ~ 60ml
C.60 ~ 70ml
D.80 ~ 90ml
E.100 ~ 120ml
146. 周某，女性，常规婚前检查。妇女一生中历时最长的阶段是（ ）
A. 新生儿期
B. 青春期
C. 性成熟期
D. 更年期
E. 老年期
147. 刘某，女 28 岁，第一胎孕 37 周，医生测量骨盆，骨盆的分界线是（ ）
A. 耻骨联合上缘、髂耻缘与骶岬上缘的连线
B. 耻骨联合上缘、髂嵴与骶岬下缘的连线
C. 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬中部的连线
D. 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬下缘的连线
E. 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线
148. 方某，女 34 岁，第一胎孕 38 周，医生测量骨盆，正常骨盆的形态是（ ）
A. 骨盆的 3 个假想平面均呈纵椭圆形
B. 骨盆的入口和中骨盆平面为纵椭圆形
C. 骨盆的入口平面呈横椭圆形
D. 骨盆的 3 个假想平面均呈横椭圆形
E. 骨盆的入口及出口平面呈纵椭圆形
149. 何某，32 岁女，第一胎阴道分娩，胎儿、胎盘娩出顺利。关于胎盘的描述错误的是（ ）
A. 胎盘由底蜕膜、叶状绒毛膜、羊膜组成
B. IgG 不可通过胎盘
C. 妊娠 8 ~ 10 周起合成雌激素和孕激素
D. 胎盘合成人绒毛膜促性腺激素 hCG 并在孕 8 ~ 10 周达高峰
E. 足月妊娠胎盘的母面粗糙，子面光滑
150. 黄某，31 岁，第二胎孕 16 周，下列哪一项不是妊娠后出现的变化（ ）
A. 心排量增加
B. 心率加快
C. 心尖部可闻及舒张期杂音
D. 膈肌上抬，心脏移位
E. 大血管扭曲
151. 林某，女 25 岁，第一胎，有关胎儿发育的特征错误的是（ ）
A. 孕 8 周末 B 超可见胎心搏动
B. 孕 16 周末孕妇偶感胎动
C. 孕 18 ~ 20 周开始出现排尿及吞咽运动
D. 孕 24 周末胎儿身长为 35 Cm
E. 孕 40 周末胎儿发育成熟
152. 邓某，女 24 岁，第一胎，B 超检查羊水量正常。有关羊水描述正确的是（ ）
A. 羊水是静止的、澄清透明的
B. 羊水呈弱碱性，pH 为 7.0
C. 羊水中含有胎脂、毛发等，不含激素
D. 妊娠足月羊水量约为 800 ~ 1000ml
E. 孕 36 ~ 38 周羊水量最少
153. 某孕妇流产娩出胎儿约 1000g，身长约 35 Cm，估计孕周约（ ）
A. 16 周
B. 20 周
C. 24 周
D. 28 周
E. 32 周
154. 林某，女性，27 岁。已婚，既往月经规律，因月经过期 10 天而就诊，要求明确是否怀孕，对确诊帮助最大的检查是（ ）
A. 基础体温
B. 免疫法测定 HCG（人绒毛膜促性腺激素）
C. 测宫底高度
D. 测孕激素
E. 宫颈黏液涂片镜检
155. 某初孕妇，月经周期约 28 天。已停经一段时间，末次月经及胎动时间记不清，无明显早孕反应。用尺测量：耻骨联合上子宫长度为 26 Cm。听诊：胎心音良好。估计现妊娠周数为（ ）
A. 20 周末
B. 24 周末

- C.28 周末
D.32 周末
E.36 周末
- 156.王某, 29 岁女, 第一胎孕 38+2 周临产, 检查时发现胎儿矢状缝在母体骨盆入口左斜径上, 可能的胎方位是 ()
A.ROP、ROA
B.LOP、ROA
C.ROA、LOT
D.LOA、ROP
E.ROT、LOP
- 157.胡某, 33 岁孕 27 周, 常规产科检查, 不属于产前检查项目的是 ()
A.全身检查
B.询问病史
C.推算预产期
D.了解上一次检查结果
E.胸部 X 线检查
- 158.张某, 32 岁女, 第一胎孕 32 周, 产科检查, 胎儿枕右前位, 胎心音的听诊部位在 ()
A.脐下左侧
B.脐下右侧
C.脐上左侧
D.脐上右侧
E.脐周
- 159.患者, 女性, 32 岁, 孕 20 周, 末次月经为 2018 年 12 月 4 日, 已建立围产期保健卡, 今来院做产前系列检查。产前检查的时间间隔正确的是 ()
A.自 20 周起每 4 周 1 次至分娩
B.自 20 周起每 2 周 1 次至分娩
C.20~36 周期间每 2 周 1 次, 自 36 周起每周 1 次
D.28~36 周期间每 2 周 1 次, 自 36 周起每周 1 次
E.20~36 周期间每 4 周 1 次, 自 36 周起每 2 周 1 次
- 160.李某, 女 29 岁, 第一胎 39 周不规则宫缩, 胎膜破, 处理错误的是 ()
A.破膜后立即听胎心音
B.记录破膜时间
C.观察羊水性状
D.胎头高浮者, 需抬高床尾
E.破膜超过 24 小时, 需给予抗生素
- 161.刘某, 女 26 岁, 第一胎 37 周, 枕左前位胎头进入骨盆入口, 其衔接径线是 ()
A.枕颈径
B.枕额径
C.枕下前凶径
D.双顶径
E.双颞径
- 162.吴某, 女 31 岁, 第一胎 39 周临产, 第一产程护理措施, 错误的是 ()
A.询问病史
B.产科检查
C.观察产程进展
D.指导产妇合理进食
E.指导产妇正确运用腹压
- 163.伍某, 25 岁, 初孕妇, 孕 36+2 周, 规律宫缩 6h, 阴道流水 2 小时入院, 查宫口开大 6 Cm, 试纸变为蓝色, 胎头尚未入盆, 以下护理措施正确的是 ()
A.温肥皂水灌肠
B.每 4h 观察一次宫 1 缩
C.每 4h 听一次胎心
D.注意观察羊水的性状
E.让产妇沐浴
- 164.付某, 女 32 岁, 第一胎 40 周, 剖宫产一男婴, 对于产妇恶露的观察, 正确的是 ()
A.浆液性恶露持续 1 周左右
B.白色恶露含有大量的白细胞、红细胞及退化蜕膜
C.血性恶露量多色鲜红, 含大量血液和坏死蜕膜组织
D.正常恶露有血腥气且有臭味
E.产褥晚期有较多的红色恶露出现属正常现象
- 165.某女, 28 岁, 生育史: 0-0-0-0, 停经 4 个月, 阴道流血 2 天, 血量超过月经量, 今晨下腹部阵发性疼痛加剧, 阴道曾有块状物排出。检查: 宫口开, 子宫如孕 2 个月大小, 尿妊娠试验阳性, 此诊断为 ()
A.先兆流产

- B.不完全流产
C.完全流产
D.难免流产
E.稽留流产
166. 张某，女，32岁，42周妊娠，规律宫缩7小时入院。平时月经规律。产科检查：胎心122次/分，宫口开大1cm，S=0，胎心监护见晚期减速。此时应采取的最佳方案是（）
- A.指导孕妇积极休息，鼓励营养摄入
B.鼓励产妇左侧卧位，给予氧气吸入
C.可经阴道试产，等待自然分娩
D.可静脉点滴催产素引产
E.应立即剖宫产结束分娩，并做好抢救新生儿的准备
167. 子痫患者的护理措施中，错误的是（）
- A.专人护理
B.安置于单人间
C.防止损伤
D.保持呼吸道通畅
E.按时给口服药
168. 某女，32岁，G1P0，未避孕，停经50天，少量阴道出血3天，突然右下腹剧烈撕裂样疼痛。检查：血压80/40mmHg，右下腹压痛、反跳痛明显，但肌紧张不明显。妇科检查：后穹隆穿刺抽出不凝血2ml，宫颈举痛(+)，宫口闭，子宫正常大小、有漂浮感，双侧附件触诊不满意，最可能的诊断是（）
- A.急性阑尾炎
B.输卵管妊娠
C.卵巢囊肿扭转
D.黄体破裂
E.先兆流产
169. 某女，30岁，生育史：1-0-0-0，孕38周，因摔伤后感剧烈腹痛伴少量阴道流血就诊。检查：血压150/110mmHg，子宫大小与妊娠月份相符，硬如木板、有压痛，胎心音90次/分，胎位不清，最大的可能是（）
- A.胎盘早剥
B.先兆流产
C.前置胎盘
D.胎儿宫内窘迫
E.先兆子宫破裂
170. 门诊护士做妇女保健健康指导，预防子宫脱垂的主要措施为（）
- A.提倡晚婚晚育
B.正确处理产程，提高助产技术
C.做产后保健操
D.积极治疗慢性咳嗽
E.绝经妇女用雌激素替代治疗
171. 患者，女33岁不孕症，诊断为子宫内膜异位症，最佳的辅助检查方法是（）
- A. CA125值测定
B.诊断性刮宫
C.宫腔镜检查
D.腹腔镜检查
E. B型超声检查
172. 女性的防癌普查，最常用的宫颈癌筛查方法是（）
- A.阴道镜检查
B.宫颈刮片检查
C.妇科检查
D. B超检查
E.宫颈活组织检查
173. 患者，39岁，近5个月来月经量增多，经期延长，常出现头晕乏力。妇科检查：子宫颈口有一个4cm×3cm×2cm肿瘤，子宫增大如孕40天，子宫表面光滑，活动好，附件(-)，B超提示子宫肌瘤。应考虑为（）
- A.肌壁间肌瘤
B.黏膜下肌瘤
C.浆膜下肌瘤
D.宫颈腺体囊肿
E.多发性肌瘤
174. 张某，29岁，女性，咨询口服避孕药避孕，下列情况可以使用是（）
- A.子宫肌瘤
B.月经量多
C.糖尿病

- D.乳房肿块
- E.甲状腺功能亢进

175.产妇，28岁，足月剖宫产一健康女婴，产后要采用宫内节育器避孕。放置宫内节育器的主要避孕原理为（）

- A.抑制卵巢排卵
- B.阻止精子进入宫腔及输卵管
- C.干扰受精卵着床
- D.影响子宫内膜的发育
- E.干扰下丘脑-垂体-卵巢轴

(176~177 题共用题干)

女，25岁，39周妊娠，规律性腹痛4小时入院。阴道检查：宫口开大6cm，S=0，羊膜囊张力大，胎头矢状缝与骨盆横径相一致，小囟在9点。宫缩30~40秒/2~3分。

176.此时最佳的处理措施是（）

- A.静脉点滴催产素加强宫缩
- B.地西洋静脉注射
- C.人工破膜
- D.宫颈封闭
- E.哌替啶100mg肌肉注射

177.此时的胎位是（）

- A.LOA（枕左前）
- B.LOT（枕左横）
- C.ROA（枕右前）
- D.ROT（枕右横）
- E.ROP（枕右后）

(178~179 题共用题干)

孕妇，27岁，第1胎，孕期检查情况正常。因临产入院待产。现临产4小时。检查：血压正常，宫缩持续30秒，间歇4~5分钟，胎心140次/分；阴道检查宫口开大2cm，未破膜，头先露在坐骨棘水平。

178.此时护理措施，不正确的为（）

- A.给予半流质饮食
- B.创造温馨待产环境
- C.劝导产妇绝对卧床休息
- D.指导产妇排尿1次/2~4小时
- E.在宫缩间歇时听胎心1次/0.5~1小时

179.临产12小时后，产妇进入第二产程，检查：宫缩持续45秒，间歇1分钟。听取胎心应每隔（）

- A.1次/10分钟
- B.1次/15分钟
- C.1次/20分钟
- D.1次/25分钟
- E.1次/30分钟

(180~181 题共用题干)

某产妇，产后10天，无合并症。

180.其子宫底的位置应在（）

- A.脐上一横指
- B.脐下一横指
- C.脐耻连线中点
- D.耻骨联合上一横指
- E.耻骨联合下

181.该产妇的恶露颜色应该是（）

- A.鲜红色
- B.淡红色
- C.白色
- D.暗红色
- E.黄绿色

(182~183 题共用题干)

王某，女，26岁，生育史：0-0-1-0，于妊娠早期有早孕反应，尿hCG阳性。于妊娠17周时感觉胎动。B超显示单胎，头位，见血管搏动。现为妊娠26周。近2周来自觉胎动消失、腹部不再增大而来院就诊。检查：宫底平脐，未闻及胎心B超检查未见胎心搏动和胎动。实验室检查正常，此时首选的治疗方法应是（）

- A.中期妊娠引产
- B.雌激素+刮宫
- C.雌激素+刮宫+抗感染
- D.钳刮+抗感染

E.肌注催产素

183.最需要的实验室检查是 ()

- A.血常规
- B.血脂
- C.肾功能
- D.肝功能
- E.凝血功能检查

(184~185 题共用题干)

某初产妇, 38+4 周孕, 宫缩每 3~4 分钟一次, 每次持续 30~40 秒, 检查: 宫口开大 1cm, 先露平坐骨棘平面, 已破膜, 羊水Ⅲ度, 胎心监护显示 O CT 阳性。

184.针对该产妇, 应采取的措施是 ()

- A.立即进行剖宫产
- B.继续严密观察
- C.静脉滴注催产素
- D.鼓励产妇屏气用力
- E.吸氧后继续观察

185.新生儿出生后, Apg Ar 评分为 4 分, 首选的措施是 ()

- A.建立呼吸
- B.清理呼吸道
- C.维持正常循环
- D.药物治疗
- E.保暖

(186~187 题共用题干)

某孕妇, 28 岁, G1P0, 血压 150/90mmHg, 以往无高血压病史, 孕 28 周产前检查诊断为妊娠期高血压疾病, 孕妇由于身体无明显不适, 因而未引起重视。

186.医务人员对此孕妇的健康教育应是 ()

- A.讲解妊娠期高血压疾病相关知识
- B.平卧位休息
- C.限制食盐的摄入
- D.每天补充钙剂 5g
- E.住院治疗

187.对此孕妇, 你认为护理诊断主要是 ()

- A.知识缺乏
- B.焦虑
- C.体液过多——水肿
- D.有受伤的危险, 与发生抽搐有关
- E.有窒息的危险, 与发生抽搐有关

(188~189 题共用题干)

某女, 26 岁, 停经 45 天, 因急性腹痛收入院。检查: 急性失血性病容, 血压 80/50mmHg, 腹部有明显压痛及反跳痛, 叩诊有明显移动性浊音。初步诊断为异位妊娠。

188.目前主要的护理问题是 ()

- A.有感染的危险
- B.恐惧
- C.潜在并发症——出血性休克
- D.有效循环血量的改变
- E.躯体移动障碍

189.为进一步确诊需做的检查项目是 ()

- A. B 超
- B. HCG 测定
- C.腹腔镜检查
- D.后穹隆穿刺
- E.诊断性刮宫

(190~191 题共用题干)

经产妇, 妊娠 37 周, 阴道多量流血 5 小时入院。查血压 90/60mmHg, 脉搏 102 次/分。无宫缩, 宫底剑突 2 指, 臀先露, 胎心 94 次/分。

190.最恰当的处理是 ()

- A.期待疗法
- B.外倒转术
- C.人工破膜
- D.立即剖宫产
- E.药物引产

191.最可能的诊断是 ()

- A.先兆临产

- B.正常产程
- C.前置胎盘
- D.胎盘早剥
- E.晚期流产

(192~193 题共用题干)

某女，26岁。停经39+4周，自感胎动减少半天入院。查体：胎心120次/分，宫口开大约1cm，胎头位置S=-1，宫缩不规律。

- 192.与胎儿窘迫的预防无关的是 ()
- A.积极防治妊娠期高血压疾病、贫血等
 - B.孕晚期、分娩期多取侧卧位
 - C.孕晚期应注意休息预防胎膜早破、脐带脱垂
 - D.第二产程不宜超过2小时
 - E.少运动，保证休息

193.此时应首选的检查是 ()

- A. B超
- B. OCT
- C. NST
- D.连续测定E3
- E.胎儿心电图监测

(194~195 题共用题干)

某女，28岁，孕3产0，妊娠34周。第一胎人工流产，第二胎为脊柱裂畸形，于妊娠24周时引产。此次妊娠早期无异常情况。妊娠32周时B超检查提示：羊水偏多，胎儿大于妊娠月份，未见明显畸形。孕妇体型肥胖，有多饮、多尿、多食史。

194.首选何种治疗方法 ()

- A.双胍类药物
- B.磺脲类药物
- C.中药治疗
- D.控制饮食
- E.肾上腺皮质激素

195.为明确诊断，首选采取下列哪一项检查 ()

- A.测定尿蛋白
- B.肝肾功能
- C. OGTT 试验
- D.脂蛋白测定
- E.血清hpl测定

196.某葡萄胎患者，24岁。妇科检查黄素化囊肿直径约为5cm。下列各项处理措施正确的是 ()

- A.当发生黄素囊肿扭转时应手术切除一侧卵巢
- B.一经发现应立即切除
- C.一般情况下不需要处理
- D.一经发现应在B超下行穿刺术
- E.应切除囊肿及同侧卵巢

197.某女，32岁。39+6周妊娠，规律宫缩10小时。阴道检查示：胎膜已破，羊水清，S=-1，宫口开大6cm。4小时后阴道检查宫口无进展。此时应考虑为 ()

- A.潜伏期延长
- B.活跃期延长
- C.活跃期停滞
- D.第二产程延长
- E.滞产

(198~199 题共用题干)

某女，生育史：0-0-0-0，第一胎，孕38周。今晨突然发生阵发性腹痛来院。检查：宫颈扩张3cm，于当日下午4点娩出4000g男婴，立即发生阴道出血500ml，色鲜红、能凝固。15分钟后胎盘娩出，胎盘、胎膜完整，检查宫体硬，宫底平脐。

198.该产妇产后2小时观察内容哪一项除外 ()

- A.生命体征是否平稳
- B.膀胱充盈度
- C.宫缩是否良好
- D.会阴有无血肿及阴道有无出血
- E.2小时的出入液量

199.目前最主要的止血措施是 ()

- A.立即检查并逐层缝合软产道
- B.腹部——阴道双手按摩子宫
- C.肌肉注射催产素
- D.阴道填塞纱布局部止血

E.腹部即刻放置砂袋压迫止血

(200~201 题共用题干)

某女，顺产。产后 10 天，血性恶露持续不断，入院前 4 小时突然阴道流血多，约 200ml。检查：子宫底耻骨联合上 3 横指，轻压痛，宫颈口容 2 指，有血块堵塞。

200.女性 28 岁，阴道分娩后发生晚期产后出血，关于其定义的解释正确的是 ()

- A.胎儿娩出后至产褥期内发生的子宫大量出血
- B.分娩 48 小时后至产褥期内发生的子宫大量出血
- C.胎儿娩出后至产后 10 天内发生子宫大量出血
- D.分娩 24 小时后至产褥期内发生的子宫大量出血
- E.胎盘娩出后至产后 6 周内发生的子宫大量出血

201.下列不正确的处理措施是 ()

- A.子宫切除
- B.应用抗生素
- C.清宫术
- D.支持疗法
- E.加用宫缩剂

(202~203 题共用题干)

患者，32 岁，7 天前到公共浴池洗盆浴后，外阴痒。检查：白带多，稀薄黄色，呈泡沫状，阴道壁充血，宫颈光滑。

202.可能的诊断是 ()

- A.假丝酵母菌性阴道炎
- B.幼女性阴道炎
- C.滴虫性阴道炎
- D.老年性阴道炎
- E.宫颈糜烂

203.为确定诊断进一步检查是 ()

- A.双合诊
- B.三合诊
- C.肛-腹诊检查
- D.尿常规
- E.白带悬滴镜检

(204~205 题共用题干)

某女，32 岁，结婚 5 年未孕，月经一直不规律，医生考虑为无排卵性功血。根据患者的月经史。

204.下列哪一种情况符合其诊断 ()

- A.周期正常，经量时多时少
- B.周期正常，经期延长，经量多
- C.周期紊乱，经期长短不一，经量时多时少
- D.周期缩短，经量时多时少
- E.周期缩短，经期延长

205.下列哪一种辅助检查结果符合其诊断 ()

- A.基础体温呈双相型
- B.月经前宫颈黏液可见椭圆形细胞
- C.月经来潮 6 小时内刮宫，见增生期子宫内膜
- D.月经中期宫颈黏液见羊齿状结晶
- E.月经前激素测定黄体酮为正常水平

(206~207 题共用题干)

患者女性，45 岁，近期月经紊乱，潮热，出汗，情绪低落，记忆力减退。诊断为：围绝经期综合征。患者要求补充雌激素替代疗法。

206.告知患者激素替代疗法的禁忌证是 ()

- A.不明原因的子宫出血
- B.骨质疏松
- C.冠心病
- D.子宫肌瘤切除
- E.冠心病一级预防

207.建议患者每年进行一次 ()

- A.TCT 检查
- B.血常规检查
- C.阴道镜检查
- D.宫腔镜检查
- E.尿常规检查

(208~209 题共用题干)

张女士，56 岁，孕 2 产 2，主诉腰骶部酸痛，有下坠感。妇科检查：嘱病人平卧向下屏

气用力，发现宫颈外口达处女膜缘。

208.子宫脱垂分度为（ ）

- A. I 度轻型
- B. I 度重型
- C. II 度轻型
- D. II 度重型
- E. III 度

209.对该病人采取的护理措施不正确的是（ ）

- A.多卧床休息，勿长期站立
- B.教会病人作盆底肌肉的运动锻炼
- C.消除慢性咳嗽、便秘等诱因
- D.症状加重时可使用子宫托
- E.做好术前准备，立即手术治疗

(210~211 题共用题干)

陆某，27岁，孕1产0。既往月经规律。2年前，自人工流产后出现痛经并逐渐加重，未避孕而未再孕。妇科检查：子宫后倾固定、正常大小，盆腔后部扪及触痛性结节。

210.该病人最大可能为（ ）

- A.功能失调性子宫出血
- B.原发性痛经
- C.盆腔炎
- D.子宫内膜异位症
- E.子宫肌瘤

211.该病的预防措施不正确的是（ ）

- A.经期尽量不做妇科检查
- B.输卵管通畅术应于月经前3~7日进行
- C.经期避免剧烈运动
- D.宫颈管粘连引起经血潴留，及时手术治疗
- E.多次妊娠、流产、剖宫产为可能诱因

(212~213 题共用题干)

经产妇，36岁，宫颈糜烂III度近5年，近4个月出现腰骶部酸痛，性生活后阴道有少量出血。

212.可疑宫颈癌的症状是（ ）

- A.宫颈糜烂III度
- B.腰骶部酸痛
- C.经产妇
- D.性生活后阴道出血
- E.生育年龄

213.宫颈癌的发病因素与下列哪一个无关（ ）

- A.早婚、早育
- B.慢性宫颈炎
- C.性病病毒
- D.晚婚、晚育
- E.性生活紊乱

(214~215 题共用题干)

患者，50岁，护理评估发现，子宫肌瘤4年，近5个月来，下腹部胀痛、尿频，排尿后自己能摸到增大的肿块。妇科检查：子宫底表面触及拳头大小包块，医生建议手术，患者十分害怕手术和担心预后。

214.该患者可能是（ ）

- A.黏膜下肌瘤
- B.浆膜下肌瘤
- C.宫颈黏膜下肌瘤
- D.肌壁间肌瘤
- E.以上都是

215.该患者目前存在的主要护理问题是（ ）

- A.组织灌注量不足
- B.手术并发症
- C.恐惧
- D.有感染的危险
- E.活动无耐力

216.患者女,31岁,孕39+5周,临产。骨盆外测量22cm、26cm、19cm、9cm,决定先试产。试产3小时后,产妇阴道流出浅绿色浑浊羊水,提示（ ）

- A. 宫内感染
- B. 胎儿窘迫

- C. 胎盘早剥
- D. 胎儿死亡
- E. 先兆子宫破裂

217.患者，女性，34岁。孕16周时出现心慌、气短，经检查发现心功能Ⅱ级。经过增加产前检查次数，严密监测孕期等，目前孕37周，自然临产。针对该产妇的护理措施错误的是（ ）

- A.严密观察产程进展，防止心力衰竭
- B.缩短第二产程
- C.胎儿娩出后，立即在产妇腹部放置沙袋
- D.给予生理和情感支持
- E.静脉注射麦角新碱预防产后出血

218.一位老年性阴道炎患者向护士复述关于对该病的认识，下列错误的是（ ）

- A.可加用己烯雌酚局部治疗
- B.常为一般化脓性细菌的混合感染
- C.可用碱性溶液冲洗阴道
- D.阴道上皮变薄，糖原含量减少
- E.如有血性白带，需做防癌检查

四、儿科护理

（一）单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1.女婴，足月顺产，3个月，奶粉喂养，家长主诉经常出现腹泻、呕吐。奶粉喂养比母乳喂养者更容易发生腹泻，与奶粉中缺乏以下哪一项免疫物质有关（ ）

- A.蛋白质
- B.脂肪
- C.糖
- D.母乳中分泌型 Ig A
- E. 母乳中乳铁蛋白高

2.男婴，足月顺产，出生体重 3.5Kg，出院时家长问 3 个月时，正常体重是多少（ ）

- A.5Kg
- B. 6Kg
- C. 7kg
- D. 8Kg
- E. 9Kg

3.女婴，孕 37 周剖宫产，出生体重 2.5Kg，现出生 3 天，母乳喂养，出院时，妈妈问护士宝宝出院后吃什么奶最好（ ）

- A.母乳
- B.早产儿奶粉
- C.新生儿奶粉
- D.水解奶粉
- E.乳库奶

4.男婴，15 个月，体格检查时，检测报告为前囟未闭合，后囟、骨缝已闭合，妈妈很焦虑，问护士大宝 12 个月已闭合，为什么小宝 15 个月还未闭合？你回答妈妈前囟正常闭合的年龄为（ ）

- A.6~12 个月
- B.9~15 个月
- C.12~18 个月
- D.15~21 个月
- E.18~24 个月

5.女婴，8 个月，最近时有烦躁、流涎，抓食。妈妈问隔壁邻居家宝宝 5 个月就出牙了，我家宝宝为什么还没出牙。你告诉妈妈正常的出牙时间为（ ）

- A.4~6 个月
- B.7~9 个月
- C.10~12 个月
- D.4~10 个月
- E.6~12 个月

6.男婴，18 个月，体格检查时妈妈问为什么近 6 个月没有 1 岁内长得快，你的回答是其中生长发育最快的阶段为（ ）

- A.胎儿期
- B.新生儿期
- C.婴儿期
- D.幼儿期

- E.青春期
- 7.女孩, 11 岁, 发现乳房出现膨胀感觉, 很焦虑。最可能是 ()
- A.学龄前焦虑
 - B.乳房开始发育
 - C.升学压力所致
 - D.自我形象改变
 - E.爱美心理所致
- 8.男孩, 5 岁, 出生体重 3.0Kg, 营养发育中等, 其合理的体重、身高分别为 ()
- A.14Kg 105cm
 - B. 16Kg 110cm
 - C. 18Kg 115cm
 - D. 20Kg 120cm
 - E. 22Kg 125cm
- 9.女孩, 2 岁, 来儿童保健体检, 其正常头围为 ()
- A.44cm
 - B.46cm
 - C.48cm
 - D.50cm
 - E.52cm
- 10.男孩, 1 岁, 来儿童保健检查, 其正常胸围为 ()
- A.44cm
 - B.46cm
 - C.48cm
 - D.50cm
 - E.52cm
- 11.女婴, 4 个月, 全母乳喂养, 儿童保健检查时, 妈妈想知道什么时候可以添加辅食 ()
- A.4 个月
 - B.6 个月
 - C.8 个月
 - D.10 个月
 - E.12 个月
- 12.男婴, 10 个月, 母乳喂养, 已添加辅食, 儿童保健检查时, 指导妈妈母乳喂养到 ()
- A.10 个月
 - B.12 个月
 - C.16 个月
 - D.20 个月
 - E.24 个月及以上
- 13.女婴, 24 小时, 指导妈妈正确母乳喂养, 其中错误的是 ()
- A 根据宝宝需求喂奶
 - B.1 天至少 8 次
 - C.10~12 次属正常
 - D.夜间至少 2 次
 - E.3~4 小时 1 次
- 14.男婴, 足月顺产 3 天, 准备出院。以下哪一项是不正确的 ()
- A.妈妈亲自让宝宝吸吮乳房
 - B.每次尽量吸空乳房
 - C.按需喂养
 - D.乳房胀满时喂奶
 - E.保持愉快心情
- 15.女婴, 8 个月, 母乳喂养中, 已添加菜泥、鱼泥辅食。妈妈问还需添加什么食物 ()
- A.肉末
 - B.馒头
 - C.饭
 - D.面包
 - E.蛋糕
- 16.女婴, 足月顺产, 3 天, 准备出院。妈妈问给宝宝洗澡时, 房间温度多少适宜 ()
- A.26°C ~ 28°C
 - B. 28°C ~ 30°C
 - C. 30°C ~ 32°C
 - D. 32°C ~ 34°C
 - E. 35°C, 接近人体皮肤温度
- 17.女婴, 足月顺产, 3 天, 准备出院。妈妈问给宝宝洗澡时, 水温多少适宜 ()
- A.32°C ~ 34°C
 - B. 34°C ~ 36°C

- C. 37°C ~ 39°C
D. 39°C ~ 41°C
E. 43°C ~ 45°C
18. 女婴，胎龄 41 周，出生体重 4100 克，属于 ()
A. 过期产儿、体重正常
B. 足月儿、体重正常
C. 过期产儿、巨大儿
D. 出生体重与胎龄相符的适于胎龄儿
E. 足月儿、巨大儿
19. 女婴，胎龄 38 周，出生体重 2700 克，身长 49cm, Apg Ar 评分 9 分。该宝宝属于 ()
A. 正常足月新生儿
B. 早产儿
C. 低出生体重儿
D. 新生儿窒息
E. 高危儿
20. 女婴，正常足月新生儿，出生 4 小时吃到母乳，母乳喂养良好，出生后几天可能排完胎粪 ()
A. 1~2 天
B. 2~3 天
C. 3~4 天
D. 4~5 天
E. 5~6 天
21. 女婴，足月顺产，3 天，准备出院。出院指导时告诉妈妈，以下是促进母婴感情做法，除外 ()
A. 母乳喂养
B. 环抱宝宝
C. 肌肤接触
D. 多与宝宝说话交流
E. 分房睡
22. 女婴，足月顺产，5 天，妈妈给宝宝换尿布时发现尿布少量血丝，宝宝反应良好。最可能是宝宝出现哪一项生理性情况 ()
A. 血尿
B. 阴道破损
C. 便血
D. 假月经
E. 臀部皮肤破损
23. 男婴，足月顺产，出生体重 3.5Kg。出院后第 2 天 (出生后第 5 天) 因发现体重为 3.3 Kg 低于出生时体重而担忧。向妈妈解释属于生理性体重下降期，恢复出生体重一般在出生后 ()
A. 7 天
B. 10 天
C. 12 天
D. 14 天
E. 21 天
24. 男婴，胎龄 35 周，剖腹产。妈妈询问换尿布时发现阴囊没有摸到睾丸，很焦虑。你的解释是 ()
A. 大部分早产儿睾丸还没下降到阴囊
B. 缺乏睾丸
C. 阴囊大睾丸小
D. 家长太紧张
E. 没问题，正常的
25. 男婴，胎龄 33 周，剖宫产，体重 1800 克，予置暖箱。家长问宝宝什么时候可以出保暖箱回到妈妈身边。你的解释是等宝宝情况良好，体重增长至 ()
A. 1900g
B. 2000g
C. 2100g
D. 2300g
E. 2500g
26. 女婴，胎龄 36 周，顺产，反应良好，抱回妈妈身边。妈妈问什么时候可以喂奶 ()
A. 即刻
B. 30 分钟
C. 60 分钟
D. 2 小时
E. 3 小时
27. 女婴，胎龄 36 周，顺产，出生 5 天，母乳喂养后溢奶，建议喂奶后给予 ()

- A.平卧位
B.右侧卧位
C.左侧卧位
D.半卧位
E.右侧半卧位
- 28.女婴，胎龄 36 周，顺产，5 天准备出院。妈妈问出院后主要观察宝宝什么内容。以下哪项是错误的（ ）
A.吃奶情况
B.大便次数、颜色
C.小便次数、量
D.乳房饱满
E.体重
- 29.男婴，出生后 1 分钟内评估时，哭声响，面色红润，躯干皮肤红色，四肢屈曲，活动正常，四肢皮肤青紫。弹足底时有哭声，测心率为 110 次/分，其 Apg Ar 评分为（ ）
A.10 分
B.9 分
C.8 分
D.7 分
E.6 分
- 30.小儿男，体重 9.6kg，身长 75cm，头围 46cm，胸围 46cm，其年龄应是（ ）
A.8 个月
B.10 个月
C.12 个月
D.14 个月
E.16 个月
- 31.女婴，出生时诊断窒息，立即心肺复苏。给予胸外心脏按摩时，操作者采用双拇指法，其双拇指应放置在其胸骨线（ ）
A.上 1/3 处
B.上 1/3 处与中 1/3 处
C.中 1/3 处
D.中 1/3 与下 1/3 处
E.下 1/3 处
- 32.女婴，出生时诊断窒息，立即心肺复苏。给予胸外心脏按摩时，按压频率为（ ）
117
A.100 次/分
B.110 次/分
C.120 次/分
D.130 次/分
E.140 次/分
- 33.男婴，胎龄 41 周，体重 4200g。因出生时臀位，分娩时产钳助产。出生 1 分钟 Apg Ar 评分为 8 分。现出生后 12 小时，嗜睡，呼吸不规则，有时尖叫，不想吃奶。最可能出现了（ ）
A.窒息
B.颅内出血
C.败血症
D.缺氧缺血性脑病
E.过期产儿
- 34.男婴，胎龄 41 周，体重 4200g。因出生时臀位，分娩时产钳助产。出生 1 分钟 Apg Ar 评分为 8 分。现出生后 12 小时，嗜睡，呼吸不规则，有时尖叫，不想吃奶。诊断为颅内出血。以下哪项护理措施是错误的（ ）
A.抬高头肩 15~30°
B.保持安静
C.减少搬动
D.专人护理
E.多拍背
- 35.男婴，胎龄 41 周，体重 4200g。因出生时臀位，分娩时产钳助产。出生 1 分钟 Apg Ar 评分为 8 分。现出生后 12 小时，嗜睡，呼吸不规则，有时尖叫，不想吃奶。诊断为颅内出血。合适的体位是抬高头肩（ ）
A.5°~10°
B.10°~15°
C.15°~20°
D.20°~25°
E.15°~30°
- 36.女婴，足月顺产，4 天，发现头面部、胸腹部皮肤黄染、哭声响、母乳喂养好，吸吮有力，尿量多，大便黄色伴少量绿色。最可能发生（ ）

- A.生理性黄疸
B.病理性黄疸
C.溶血
D.肝脏疾病
E.胆道闭锁
- 37.女婴，足月顺产，4天，发现头面部、胸腹部皮肤黄染、哭声响、母乳喂养好，吸吮有力，尿量多，大便黄色伴少量绿色。诊断为生理性黄疸，喂养指导正确的是（ ）
A.停母乳喂养
B.继续母乳喂养
C.混合喂养
D.奶粉喂养
E.喂糖水
- 38.男婴，足月顺产，现出生12小时，出现皮肤、巩膜黄染，吸吮困难，反应差。母亲为Rh(-)性，父亲和宝宝血型无记录。查宝宝血型为Rh(+)性。可能出现（ ）
A.生理性黄疸
B. A BO 溶血
C. Rh 溶血
D.肝脏疾病
E.胆道疾病
- 39.患者，男，3岁。进食豆粒时不慎呛咳，随即出现呼吸困难，面色发绀，神志不清。护士应采取的护理措施是（ ）
A. 给予吸氧
B. 人工呼吸
C. 用吸痰器清理呼吸道
D. 将患儿平卧，头偏向一侧
E. 做好协助气管取异物的准备
- 40.女婴，因下雪封路，急产于家中。胎龄35周，出生体重不详，出生12小时换尿布时发现两下肢及臀部皮肤水肿并硬，未吃奶，哭声弱，送医院。最可能的诊断是（ ）
A.体温低下
B.败血症
C.新生儿水肿
D.早产儿
E.新生儿寒冷损伤综合征
- 41.女婴，因下雪封路，急产于家中。胎龄35周，出生体重不详，出生12小时换尿布时发现两下肢及臀部皮肤水肿并硬，未吃奶，哭声弱，送医院。硬肿是主要观察指标，其发展顺序依次为（ ）
A.小腿—臀部—全身
B.小腿—大腿外侧—下肢—臀部
C.小腿—臀部—面部—全身
D.小腿—大腿外侧—臀部—面部
E.小腿—臀部—大腿外侧—面部
- 42.女婴，因下雪封路，急产于家中。胎龄35周，出生体重不详，出生12小时换尿布时发现两下肢及臀部皮肤水肿并硬，未吃奶，哭声弱，送医院，诊断为新生儿寒冷损伤综合征，肛温33℃，腋温34℃。入暖箱温度为（ ）
A.31℃
B.32℃
C.33℃
D.34℃
E.35℃
- 43.女婴，因下雪封路，急产于家中。胎龄35周，出生体重不详，出生12小时换尿布时发现两下肢及臀部皮肤水肿并硬，未吃奶，哭声弱，送医院，诊断为新生儿寒冷损伤综合征，置暖箱复温。指导妈妈保持泌乳的措施，除外（ ）
A.手挤乳方法
B.每天至少8次，其中晚上2次
C.鼓励家长送母乳到医院
D.母乳储存方法
E.断奶
- 44.男婴，足月顺产，出生体重3200g。生后10天，洗澡时发现脐窝有脓性分泌物，体温正常。用酒精处理脐部，合适的酒精浓度为（ ）
A.50~55%
B.60~65%
C.70~75%
D.80~85%
E.90~95%

- 45.女婴，早产，36周，出生体重2500g，出生哭声响，吃奶好。现生后7天。昨天开始吃奶少，四肢活动少，查体T37℃，脐部周围红肿，脐窝有分泌物。最可能诊断（）
- 脐炎
 - 败血症
 - 发热
 - 早产
 - 感染
- 46.女婴，36周，羊膜早破，剖宫产，出生第2天开始吃奶无力，第3天开始拒奶，哭声小，查体T38.5℃，脐部周围红肿，脐窝脓性分泌物，诊断为败血症。最适宜降温措施是（）
- 退热药
 - 酒精擦浴
 - 松开包被
 - 冷水灌肠
 - 保暖
- 47.女婴，36周，出生体重3200g，生后6天。近2天嗜睡，吃奶少，不哭，出汗多，查体：体温正常，肌张力差，皮肤轻度黄疸，体重2900g，母亲有糖尿病病史。诊断为新生儿低血糖。医嘱10%葡萄糖静脉注射，输液泵控制输液速度，准确观察记录病情变化，合理监测血糖的间隔时间为（）
- 30~60分钟
 - 1~2小时
 - 2~4小时
 - 4~6小时
 - 8小时
- 48.女婴，36周，出生体重3200g，出生6天，牛乳喂养，吃奶正常反应好，今天出现嘴角抽搐，查体正常，体重2900g，母亲有糖尿病病史，诊断为新生儿低钙血症，口服补充钙剂时，正确方法是（）
- 与牛奶搅拌送服
 - 先喂钙剂，然后立即喂奶
 - 先喂奶，然后立即喂钙剂在2次哺乳之间
 - 提倡母乳喂养，喂钙剂，温水搅拌送服
 - 与母乳搅拌送服
- 49.女婴，6个月时体重8kg，6个月后断奶，主要米糊、面喂养，断奶后至今3个月，前体重为8.5kg。诊断为I度营养不良，其皮下脂肪为（）
- 消失
 - <0.2cm
 - <0.4cm
 - 0.4~0.8cm
 - 0.8~1.0cm
- 50.女婴，6个月时体重8kg，6个月后断奶，主要米糊、面喂养，断奶后至今3个月，目前体重为8.5kg。诊断为I度营养不良，最常见的并发症为（）
- 缺铁性贫血
 - 干眼症
 - 上呼吸道感染
 - 支气管炎
 - 腹泻
- 51.女婴，6个月时体重8kg，6个月后断奶，主要米糊、面喂养，断奶后至今3个月，目前体重为8.5kg。诊断为I度营养不良，指导妈妈合理喂养的措施，除外（）
- 奶制品
 - 蛋黄
 - 肉末
 - 鱼泥
 - 汤水
- 52.男婴，足月顺产，出生体重3.5Kg，现4个月，人工喂养，体重9Kg。因多汗，易哭，睡眠时间短，枕秃来就诊。由于冬季11月出生，不外出晒太阳，未补充Vit D，最可能诊断是（）
- 维生素D缺乏性佝偻病
 - 正常
 - 摄入量小于需求量
 - 缺铁性贫血
 - 低钙血症
- 53.男婴，足月顺产，出生体重3.5Kg，现4个月，人工喂养，体重9Kg。因多汗，易哭，睡眠时间短，枕秃来就诊。由于冬季11月出生，不外出晒太阳，未补充Vit D，诊断为维生素D缺乏性佝偻病。检查最可能发现骨骼异常表现是（）
- 颅骨软化
 - 方颅
 - 肋串珠

- D.手镯
- E. O 型腿

54.男婴，足月顺产，出生体重 3.5Kg，现 4 个月，人工喂养，体重 9 Kg。因多汗，易哭，睡眠时间短，枕秃来就诊。由于冬季 11 月出生，不外出晒太阳，未补充 Vit D，诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。日光照射是最有效的治疗方法之一。而最合适的日光照射方法是（ ）

- A.强日光下照射
- B.夏天充分暴露皮肤直射
- C.冬天阳光房内照射
- D.春、秋季充分暴露皮肤户外照射
- E.充分暴露皮肤紫外线灯照射

55.男婴，足月顺产，出生体重 3.5Kg，现 4 个月，人工喂养，体重 9 Kg。因多汗，易哭，睡眠时间短，枕秃来就诊。由于冬季 11 月出生，不外出晒太阳，未补充 Vit D，诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。口服维生素 D 预防剂量是（ ）

- A.200U/天
- B.400U/天
- C.600U/天
- D.800U/天
- E.100U/天

56.男婴，4 个月，奶粉喂养，未添加 Vit D，近 2 周反复腹泻，今发现抽搐 2 次而就诊，抽搐时，眼球上翻，脸面抽动，神志不清，最可能诊断为（ ）

- A.维生素 D 缺乏性佝偻病
- B.高热惊厥
- C.维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- D.低血糖
- E.腹泻

57.男婴，4 个月，奶粉喂养，未添加 Vit D，近 2 周反复腹泻，今发现抽搐 2 次而就诊，抽搐时，眼球上翻，脸面抽动，神志不清，拟诊为 Vit D 缺乏性手足搐搦症，奶粉喂养比母乳喂养儿容易引发该病的机理是，除外（ ）

- A.含磷高
- B.钙磷比例失调
- C.不易消化吸收
- D.腹泻影响钙吸收
- E.阳光照射不足

58.男婴，4 个月，奶粉喂养，未添加 Vit D，近 2 周反复腹泻，今发现抽搐 2 次而就诊，抽搐时，眼球上翻，脸面抽动，神志不清，血清总钙为 1.7mmol/L (6.8mg/ DI)，巡视病房时，发现喉鸣音，最可能发生（ ）

- A.惊厥
- B.喉痉挛
- C.哮喘
- D.喉头水肿
- E.喉炎

59.男婴，4 个月，奶粉喂养，未添加 Vit D，近 2 周反复腹泻，今发现抽搐 2 次而就诊，抽搐时，眼球上翻，脸面抽动，神志不清，血清总钙为 1.7mmol/L (6.8mg/ DI)，巡视病房时，发现有喉鸣音，首先采取的措施是（ ）

- A.吸氧，解开衣领
- B.保持呼吸道通畅
- C.头侧向一侧
- D.通知医生
- E.遵医嘱，使用止痉药

60.男婴，2 个月，4Kg，纯母乳喂养，宝宝吸奶频繁，每隔 2~3 小时吃一次，而邻居 2 个月宝宝 3~4 小时喂奶粉一次。你合理解释是胃排空时间由食物种类不同而不同，母乳易消化吸收，排空时间是（ ）

- A.<1 小时
- B.1~2 小时
- C.2~3 小时
- D.3~4 小时
- E.>4 小时

61.男婴，4 个月，5Kg，纯母乳喂养，妈妈问什么时候可以添加辅食（ ）

- A.现在
- B.5 个月后
- C.6 个月后
- D.7 个月后
- E.8 个月后

62.女婴，3 个月，5.5Kg，奶粉喂养，发现口腔粘膜出现白色乳凝样物，喂水后仍然存在，

最可能诊断为 ()

- A.奶块
- B.鹅口疮
- C.口炎
- D.奶液附着
- E.正常现象

63.女婴, 3 个月, 5.5Kg, 奶粉喂养, 发现口腔粘膜出现白色乳凝样物, 喂水后仍然存在, 诊断为鹅口疮, 清洁口腔首选 ()

- A.2%碳酸氢钠
- B.2%过氧化钠
- C.10 万~20 万 u/ml 制霉菌素鱼肝油混悬剂
- D.5%碳酸氢钠
- E.5%过氧化钠

64.女婴, 3 个月, 5.5Kg, 奶粉喂养, 发现口腔粘膜出现白色红凝样物, 喂水后仍然存在, 诊断为鹅口疮, 清洁口腔后局部可以给予涂 ()

- A.2%碳酸氢钠
- B.2%过氧化钠
- C.10 万~20 万 u/ml 制霉菌素鱼肝油混悬剂
- D.5%碳酸氢钠
- E.3%过氧化钠

65.女婴, 3 个月, 5.5Kg, 奶粉喂养, 发现口腔粘膜出现白色乳凝样物, 喂水后仍然存在, 诊断为鹅口疮, 清洁口腔局部涂药后, 为了提高疗效, 嘱多久以后可以饮食 ()

- A.2 分钟
- B.5 分钟
- C.7 分钟
- D.10 分钟
- E.15 分钟

66.女婴, 3 个月, 5.5Kg, 奶粉喂养, 发现口腔粘膜出现白色乳凝样物, 喂水后仍然存在, 诊断为鹅口疮, 清洁口腔后局部涂药。嘱妈妈回家后消毒处理婴儿用过的奶具等, 方法是 ()

- A.2%碳酸氢钠浸泡 15 分钟——清水洗净——煮沸消毒 15 分钟
- B.2%碳酸氢钠浸泡 30 分钟——清水洗净——煮沸消毒 30 分钟
- C.5%碳酸氢钠浸泡 15 分钟——清水洗净——煮沸消毒 15 分钟
- D.5%碳酸氢钠浸泡 30 分钟——清水洗净——煮沸消毒 30 分钟
- E.5%碳酸氢钠浸泡 15 分钟——清水洗净——煮沸消毒 30 分钟

67.女婴, 3 个月, 5.5Kg, 奶粉喂养, 发现口腔粘膜出现白色乳凝样物, 喂水后仍然存在, 诊断为鹅口疮, 为了提高用药效果, 适宜口腔涂药时间是 ()

- A.餐前 30 分钟
- B.餐后 30 分钟
- C.餐前 1 小时
- D.餐后 1 小时
- E.餐后即刻

68.女婴, 足月顺产, 出生体重 3.5kg, 纯母乳喂养, 每天大便 6~8 次, 黄色稀便或糊状便, 现在 2 月, 体重 5.0Kg, 诊断为生理性腹泻。合适喂养指导是 ()

- A.暂禁食 4~6 小时
- B.继续母乳喂养
- C.改腹泻奶粉
- D.米汤
- E.口服补液

69.女婴, 足月顺产, 出生体重 3.5kg, 纯母乳喂养, 每天大便 6~8 次, 黄色稀便或糊状便, 现在 2 月, 体重 5.0Kg。查体发现臀部皮肤发红, 给予正确护理指导, 除外 ()

- A.便后选用柔软纱布, 用温水清洗
- B.先清洗会阴后清洗臀部
- C.选用柔软吸水性强的尿布
- D.换尿布时抬高臀部与尿布分离, 然后去除尿布
- E.换尿时, 快速将尿布从臀部抽离

70.男婴, 1.5 岁, 外出旅游 2 天后出现腹泻, 每天 7~10 次, 有黄色稀便、泡沫便, 今天呕吐 2 次、胃口差, 诊断为感染性腹泻。最可能原因是 ()

- A.病毒
- B.细菌
- C.真菌
- D.寄生虫
- E.肠道外感染

71.男婴, 1.5 岁, 外出旅游 2 天后出现腹泻, 每天 7~10 次, 有黄色稀便、泡沫便, 今天呕吐 2 次、胃

口差，诊断为感染性腹泻。查体：精神尚可，皮肤弹性良好，T37.8℃，最可能为（ ）

- A.轻度腹泻
- B.中度腹泻
- C.重度腹泻
- D.酸中毒
- E.大肠杆菌腹泻

72.男婴，1.5岁，外出旅游2天后出现腹泻，每天7~10次，有黄色稀便、泡沫便，今天呕吐2次、胃
口差，诊断为感染性腹泻。给予口服补液。指导家长口服补液正确方法，除外（ ）

- A.取约10ml小勺
- B.每次喂1/2小勺，约5ml
- C.待完全吞咽后，再喂第二勺，少量多次
- D.如有呕吐，则暂停稍等
- E.水温70℃

73.男婴，1.5岁，因腹泻重度脱水住院治疗，经补液后脱水情况改善。但患儿依然四肢无
力，查体腹胀，腱反射减弱，心音低钝，应考虑（ ）

- A.低血糖
- B.低血钙
- C.低血钾
- D.低血镁
- E.低血钠

74.男婴，1.5岁，因腹泻重度脱水住院治疗，经补液后脱水情况改善。但患儿依然四肢无
力，查体腹胀，腱反射减弱，心音低钝，诊断为低血钾。医嘱10%氯化钾加入无钾余液300ml
中。余液中最多加多少毫升（ ）

- A.3ml
- B.6ml
- C.9ml
- D.12ml
- E.15ml

75.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽
喉部充血，两肺清，诊断为上呼吸道感染。区分上下呼吸道的（ ）

- A.咽
- B.喉
- C.环状软骨
- D.气管
- E.左右支气管分叉

76.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽
喉部充血，两肺清，诊断为上呼吸道感染。指导家长首选降温措施是（ ）

- A.35%酒精擦浴
- B.50%酒精擦浴
- C.冰袋物理降温
- D.解开衣被散热降温
- E.大量喂水降温

77.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽喉部充血，两肺
清，诊断为上呼吸道感染。最容易引起的并发症是（ ）

- A.肺炎
- B.中耳炎
- C.扁桃体炎
- D.喉炎
- E.呼吸衰竭

78.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽
喉部充血，两肺清，诊断为上呼吸道感染。护理指导0.5%麻黄碱滴鼻时间是（ ）

- A.哺乳前30分钟
- B.哺乳后30分钟
- C.哺乳时即刻
- D.哺乳前10~15分钟
- E.哺乳后10~15分钟

79.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽
喉部充血，两肺清，诊断为上呼吸道感染。常见病因是（ ）

- A.气候变化
- B.照顾不良
- C.病毒感染
- D.细菌感染
- E.空气感染

80.男婴，生后15天，因发热家中测体温38.8℃，鼻塞，哭吵就诊。体检耳温39.1℃，咽

喉部充血，两肺清，诊断为上呼吸道感染。好发季节为（ ）

- A.全年
- B.春夏季
- C.夏秋季
- D.秋冬季
- E.冬春季

81.女孩，4岁，昨天参加幼儿园春游，今晨发热 $T38^{\circ}\text{C}$ ，咽痛，眼红肿，查体耳后淋巴结肿大，最可能诊断是（ ）

- A.急性上呼吸道感染
- B.咽炎
- C.疱疹性咽炎
- D.咽-结合膜热
- E.支气管炎

82.女孩，4岁，昨天参加幼儿园春游，今晨发热 $T38^{\circ}\text{C}$ ，咽痛，眼红肿，查体耳后淋巴结肿大，诊断为咽-结合膜热，最常见病原体是（ ）

- A.呼吸道合胞病毒
- B.流感病毒
- C.柯萨奇 A 组病毒
- D.柯萨奇 B 组病毒
- E.腺病毒

83.男孩，8岁，昨晚发热 $T38^{\circ}\text{C}$ ，今晨 39°C ，主诉咽痛，不想进食，来院就诊。查体咽部充血，悬雍垂周围有大小不等疱疹，2处溃疡。诊断为疱疹性咽峡炎。最常见的致病因素是（ ）

- A.呼吸道合胞病毒
- B.流感病毒
- C.柯萨奇 A 组病毒
- D.柯萨奇 B 组病毒
- E.腺病毒

84.男孩，8岁，昨晚发热 $T38^{\circ}\text{C}$ ，今晨 39°C ，主诉咽痛，不想进食，来院就诊。查体咽部充血，悬雍垂周围有大小不等疱疹，2处溃疡。诊断为疱疹性咽峡炎。指导家长开窗通风（ ）

- A.每天至少通风 1 次，每次 15 分钟
- B.每天至少通风 1 次，每次 30 分钟
- C.每天至少通风 2 次，每次 15 分钟
- D.每天至少通风 2 次，每次 60 分钟
- E.每天至少通风 2 次，每次 15~30 分钟

85.女婴，18月，3天前患“急性上呼吸道感染”，治疗中，昨天晚上出现气急，需要抱着睡，查体两肺有哮鸣音，以前有反复皮肤过敏。应给予体位是（ ）

- A.平卧位
- B.半卧位
- C.左侧卧位
- D.右侧卧位
- E.头低脚高位

86.男婴，6个月，因咳嗽，发热，呼吸急促就诊，医生诊断为“支气管肺炎”收入院。护理评估 $T39^{\circ}\text{C}$ ，呼吸 50 次/分，心率 120 次/分，予鼻导管氧气吸入，调节流量为（ ）

- A.0.5~1L/分
- B.1~1.5L/分
- C.1.5~2L/分
- D.2~2.5L/分
- E.2.5~3L/分

87.女婴，35周，体重 2000g，因早产收入院。入院检查后发现有室间隔缺损。妈妈回忆有感冒史。感冒最有可能发生在（ ）

- A.结婚前 2~8 周
- B.结婚后 2~8 周
- C.怀孕前 2~8 周
- D.怀孕后 2~8 周
- E.胚胎 2~8 周

88.男婴，10个月，来儿保体检，其正常心率为每分钟多少次（ ）

- A.130~150
- B.110~130
- C.90~110
- D.80~100
- E.70~90

89.男童，2岁，诊断为“法洛四联症”，为了暂时缓解缺氧情况，孩子走路活动时常采取（ ）

- A.蹲踞位

- B.半卧位
C.平卧
D.端坐位
E.直立位
- 90.男童, 2 岁, 诊断为“法洛四联症”, 走路出现“蹲踞位”时, 家长应采取的措施是 ()
A.强行拉起
B.抱起拍背
C.蹲踞位, 然后和孩子一起慢慢自然起立
D.平卧于地
E.蹲踞位
- 91.男童, 6 岁, 最近 3 天出现恶心呕吐, 不愿意上学, 查体发现咽红肿, T39°C。心电图显示 ST 段偏移, T 波倒置, 考虑“病毒性心肌炎”, 急性期应予卧床休息 ()
A.2 周
B.热退后 2 周
C.4 周
D.热退后 4 周
E.热退后 6 周
- 92.男童, 6 岁, 最近 3 天出现恶心呕吐, 不愿意上学, 查体发现咽红肿, T39°C。心电图显示 ST 段偏移, T 波倒置, 考虑“病毒性心肌炎”, 测量心率时, 应选择 ()
A.进食前
B.进食后
C.安静时
D.看动画片时
E.看动画片后
- 93.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 最可能原因是 ()
A.牛奶喂养
B.没有及时添加辅食
C.牛奶喂养和没及时添加辅食
D.生长过快
E.吸收不良
- 94.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 好发年龄为 ()
A.6~9 个月
B.6~12 个月
C.6~15 个月
D.6~18 个月
E.6~24 个月
- 95.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 诊断为“营养性缺铁性贫血”, 主要护理问题是 ()
A.营养失调
B.活动无耐力
C.并发感染
D.并发心力衰竭
E.与家长缺乏育儿知识有关
- 96.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 诊断为“营养性缺铁性贫血”。医嘱给予液体铁剂口服。口服液体铁剂最佳方法为 ()
A.滴管吸取, 直接滴到舌根部
B.加入牛奶中
C.加入肉米粥
D.与钙剂同服
E.加入奶茶中
- 97.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 诊断为“营养性缺铁性贫血”。医嘱给予液体铁剂口服。口服液体铁剂最佳时间为 ()
A.饭前 15 分钟 B.饭前 30 分钟
C.饭后 15 分钟
D.饭后 30 分钟
E.两餐之间
- 98.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 诊断为“营养性缺铁性贫血”。医嘱给予液体铁剂口服。有利于铁剂吸收的维生素是 ()
A.Vit A
B. VitB
C. VitC
D. VitD
E. Vit E

99.女婴, 8 个月, 牛奶喂养, 未添加辅食。体检时发现“缺铁性贫血”, 诊断为“营养性缺铁性贫血”。医嘱给予液体铁剂口服。口服铁剂后, 大便可变为 ()

- A. 黄糊状
- B. 水样便
- C. 蛋花汤样
- D. 柏油样
- E. 绿色便

100.女婴, 42 天, 母乳喂养。妈妈是长期素食, 最可能缺乏 ()

- A. VitA
- B. VitB1
- C. VitB12
- D. VitC
- E. VitD

101.女婴, 42 天, 母乳喂养。妈妈是长期素食, 指导妈妈改善饮食结构, 可以预防 ()

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼细胞性贫血
- C. 生理性贫血
- D. 血小板减少
- E. 溶血性贫血

102.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。最可能与什么感染有关 ()

- A. A 组乙型溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎双球菌
- D. 腺病毒
- E. 支原体

103.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。患儿应卧床休息 ()

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

104.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。待患儿水肿消退, 血压正常, 肉眼血尿消失后可 ()

- A. 在床上轻微活动
- B. 下床轻微活动
- C. 床上限制活动
- D. 下床限制活动
- E. 下床正常活动, 但应避免剧烈活动

105.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。经治疗可以出院并门诊随访。家长问何时可上学 ()

- A. ADDis 计数正常
- B. 血压正常
- C. 水肿消退
- D. 无肉眼血尿
- E. 红细胞沉降率正常

106.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。经治疗可以出院并门诊随访。家长问何时可以恢复正常生活 ()

- A. A D Dis 计数正常
- B. 血压正常
- C. 水肿消退
- D. 无肉眼血尿
- E. 红细胞沉降率正常

107.男童, 10 岁, 2 周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大 II 度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。护理要点中除了记录 24h 出入量, 一般多久测体重一次 ()

- A. 每周二次

- B.每周一次
- C.每日或隔日一次
- D.每二周一次
- E.每三周一次

108.男童, 10岁, 2周前因发热咽痛就医, 诊断为上呼吸道感染, 予抗炎治疗, 期间正常上学。今晨发现双腿水肿, 尿量减少, 查体: 咽部充血, 扁桃体肿大Ⅱ度, 无脓性分泌物, 诊断为急性肾炎。在严重少尿、水肿和循环充血期, 每日食盐量控制在 ()

- A.0.5~1g
- B.1~2g
- C.2~3g
- D.3~4g
- E.4~5g

109.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 拟诊断“肾病综合征”, 明确诊断至少还需要有下列哪一项依据 ()

- A.低蛋白血症
- B.高脂血症
- C.高蛋白血症
- D.低脂血症
- E.高血压

110.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 拟诊断“肾病综合征”, 以下哪一项尿液提示有“蛋白尿” ()

- A.尿液深
- B.尿液黄
- C.尿量少
- D.尿量多
- E.尿后泡沫多

111.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 低蛋白血症, 诊断为“肾病综合征”, 最常见并发症为 ()

- A.感染
- B.电解质紊乱
- C.血栓形成
- D.急性肾衰竭
- E.急性心力衰竭

112.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 低蛋白血症, 诊断为“肾病综合征”, 治疗本病首选药是 ()

- A.肾上腺糖皮质激素
- B.免疫抑制剂
- C.利尿剂
- D.白蛋白制剂
- E.抗凝剂

113.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 低蛋白血症, 诊断为“肾病综合征”, 患儿水肿期间, 除了记录24h出入量, 一般多久测体重一次 ()

- A.每天一次
- B.每周二次
- C.每周三次
- D.每周一次
- E.每二周一次

114.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 低蛋白血症, 诊断为“肾病综合征”, 用肾上腺糖皮质激素治疗期间, 应鼓励多吃含钾高食物如 ()

- A.香蕉
- B.苹果
- C.梨
- D.桃子
- E.西瓜

115.男童, 5岁, 因发现眼睑、阴囊水肿明显就诊, 尿液检查蛋白定性+++ , 红细胞++ , 低蛋白血症, 诊断为“肾病综合征”, 大量蛋白尿期间, 每天每公斤蛋白质摄入量多少为宜 ()

- A.1g
- B.2g
- C.3g
- D.4g
- E.5g

116.患者女性, 46岁, 右下肢因房屋倒塌被砖墙压住, 4小时后被救出。体检: 脉搏96次/分, 血压86/66/mmHg,

右肢体明显肿胀，有瘀斑。静脉输液应首选（ ）

- A.低分子右旋糖酐
- B.5%葡萄糖溶液
- C.3%高渗盐水溶液
- D.全血或血浆
- E.平衡液

117.患者女性，45岁。因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是（ ）

- A.休克
- B.窒息
- C.肺部感染
- D.肾衰竭
- E.脱水、酸中毒

118.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高，最接近诊断（ ）

- A.化脓性脑膜炎
- B.病毒性脑膜炎
- C.结核性脑膜炎
- D.化脓性脑炎
- E.病毒性脑炎

119.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高。脑脊液穿刺后，应给予患儿什么卧位（ ）

- A.去枕平卧
- B.头高脚低位
- C.头高脚高位
- D.左侧卧位
- E.右侧卧位

120.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高。脑脊液穿刺后，应给予去枕平卧多少小时（ ）

- A.1~2小时
- B.2~4小时
- C.4~6小时
- D.6~8小时
- E.8~10小时

121.女婴，8个月，因发热抽搐3次就诊，查体：T39.5℃，前囟饱满，精神萎，嗜睡，拟诊为“脑膜炎”，抽脑脊液时发现外观浑浊，压力高，巡视病房时，发现患儿烦躁不安，哭闹不止，呕吐，囟门饱满，四肢张力明显增高，最可能出现（ ）

- A.心衰衰竭
- B.惊厥
- C.呼吸衰竭
- D.脑疝
- E.脑积水

122.男童，6岁，外出旅游回家1周后，流涕，继而出现发热38℃，然后出现头痛嗜睡，脑脊液检查后诊断为“病毒性脑炎”，应给予以下护理措施，除外（ ）

- A.保持环境安静
- B.监测体温
- C.营养丰富饮食
- D.密切观察病情
- E.惊厥时平卧位，头后仰

123.女童，10岁，因发热39℃，咽痛，四肢大关节疼痛就诊，查体：咽部充血明显，扁桃体肿大Ⅱ度，周围充血明显，有“风湿热”病史，“风湿热”的关节炎表现错误的是（ ）

- A.红
- B.肿
- C.热
- D.痛
- E.畸形

124.女童，10岁，因发热39℃，咽痛，四肢大关节疼痛就诊，查体：咽部充血明显，扁桃体肿大Ⅱ度，周围充血明显，有“风湿热”病史，“风湿热”的关节疼痛表现时，给予以下护理措施，除外（ ）

- A.限制活动
- B.功能位

- C.热敷
- D.避免受压
- E.操作时动作轻柔

125.女童, 10 岁, 因发热 39℃, 咽痛, 四肢大关节疼痛就诊, 查体: 咽部充血明显, 扁桃体肿大 II 度, 周围充血明显, 有“风湿热”病史, “风湿热”患儿出现心肌炎及心力衰竭者, 应至少卧床休息 ()

- A.2 周
- B.4 周
- C.6 周
- D.8 周
- E.10 周

126.女童, 4 岁, 1 周前因发热、咽痛就医, 诊断为“上呼吸道感染”, 予治疗, 今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊, 考虑“过敏性紫癜”, 其发病最可能与下列哪一因素有关 ()

- A.上呼吸道感染
- B.食物过敏
- C.药物过敏
- D.体育活动受损
- E.环境因素

127.女童, 4 岁, 1 周前因发热、咽痛就医, 诊断为“上呼吸道感染”, 予治疗, 今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊, 诊断为“过敏性紫癜”, 皮肤紫癜消退一般需要 ()

- A.1~2 周
- B.2~4 周
- C.4~6 周
- D.6~8 周
- E.8~10 周

128.女童, 4 岁, 1 周前因发热、咽痛就医, 诊断为“上呼吸道感染”, 予治疗, 今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊, 诊断为“过敏性紫癜”, 为了及早发现, 早治疗对肾脏损害, 需要定期随访检查 ()

- A.血常规
- B.尿常规
- C.咽拭子培养
- D.C-反应蛋白
- E.24h 蛋白尿

129.女童, 4 岁, 1 周前因发热、咽痛就医, 诊断为“上呼吸道感染”, 予治疗, 今洗澡时发现臀部和下肢有皮肤紫癜就诊, 诊断为“过敏性紫癜”, 目前最主要护理诊断是 ()

- A.焦虑
- B.知识缺乏
- C.疼痛
- D.皮肤完整性受损
- E.体温异常

130.女婴, 11 个月, 因发热 2 天, 体温在 38℃~38.8℃。来院就诊, 查体咽部充血, 在下磨牙对应的颊粘膜上, 可见灰白色小点, 小点周围有红晕, 最符合名称为 ()

- A.颊粘膜斑
- B.麻疹粘膜斑
- C.奶块
- D.鹅口疮
- E.腮腺管颊粘膜斑

131.女婴, 11 个月, 因发热 2 天, 体温在 38℃~38.8℃。来院就诊, 查体咽部充血, 在下磨牙对应的颊粘膜上, 可见灰白色小点, 小点周围有红晕, 诊断为“麻疹”, 应密切观察患儿出疹情况, 其首先出现皮疹的部位是 ()

- A.四肢
- B.面
- C.胸
- D.腹
- E.耳后、发际

132.女婴, 11 个月, 因发热 2 天, 体温在 38℃~38.8℃。来院就诊, 查体咽部充血, 在下磨牙对应的颊粘膜上, 可见灰白色小点, 小点周围有红晕, 诊断为“麻疹”, 最常见的并发症是 ()

- A.口腔溃疡
- B.咽炎
- C.肺炎
- D.心肌炎
- E.脑炎

133.女婴, 11 个月, 因发热 2 天, 体温在 38℃~38.8℃。来院就诊, 查体咽部充血, 在下磨牙对应的颊

粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，当你巡视病房，发现患儿声音嘶哑、犬吠样咳嗽及吸气性呼吸困难时，最可能提示发生（ ）

- A.呼吸衰竭
- B.喉炎
- C.肺炎
- D.心肌炎
- E.脑炎

134.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，为家长宣教时，嘱回家应开窗至少（ ）

- A.10分钟
- B.20分钟
- C.30分钟
- D.40分钟
- E.60分钟

135.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，指导家长将患儿衣服及使用过的物品在阳光下暴晒至少（ ）

- A.30分钟
- B.60分钟
- C.90分钟
- D.120分钟
- E.150分钟

136.女婴，11个月，因发热2天，体温在 $38^{\circ}\text{C} \sim 38.8^{\circ}\text{C}$ 。来院就诊，查体咽部充血，在下磨牙对应的颊粘膜上，可见灰白色小点，小点周围有红晕，诊断为“麻疹”，告知家属3岁大宝至少在家里隔离观察（ ）

- A.1周
- B.2周
- C.3周
- D.4周
- E.6周

137.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，病原菌为（ ）

- A.麻疹病毒
- B.呼吸道合胞病毒
- C.水痘一带状疱疹病毒
- D.腮腺炎病毒
- E. A 组乙型溶血性链球菌

138.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，其高峰期可出现以下临床表现，除外（ ）

- A.疱疹
- B.斑疹
- C.斑丘疹
- D.出血性皮炎
- E.结痂

139.男童，4岁，晚上沐浴时发现躯干有红色皮疹，有些水泡，诊断为“水痘”，应给予哪些护理措施，除外（ ）

- A.柔软棉质衣服
- B.剪短指甲
- C.挑破水疱
- D.预防抓破皮肤
- E.监测体温

140.女童，8岁，因发热、咀嚼时嘴巴张开困难，左侧脸颊肿大就诊，诊断为“腮腺炎”，最常见的并发症为（ ）

- A.喉炎
- B.肺炎
- C.心肌炎
- D.脑膜脑炎
- E.睾丸炎

141.女童，8岁，因发热、咀嚼张开困难，左侧脸颊肿大就诊，诊断为“腮腺炎”，最常见的护理问题是（ ）

- A.体温过高
- B.疼痛
- C.知识缺乏
- D.活动受限

- E.摄入量不足
- 142.女童, 8 岁, 因发热、咀嚼张开困难, 左侧脸颊肿大就诊, 诊断为“腮腺炎”, 应给予以下护理措施除外 ()
- 控制体温
 - 口腔护理
 - 腮腺红肿局部给予冷敷
 - 腮腺红肿局部给予热敷
 - 呼吸道隔离
- 143.男童, 7 岁, 因发热、寒战、头痛就诊, 查体 $T40^{\circ}\text{C}$, 咽部红肿, 扁桃体红肿伴脓性分泌物, 舌苔有一层白色苔, 咽拭子培养为“ A 组乙型溶血性链球菌”, 诊断为“猩红热”, 一般于发热后多少小时开始出现皮疹 ()
- < 12 小时
 - 12 ~ 24 小时
 - 24 ~ 36 小时
 - 24 ~ 48 小时
 - 24 ~ 72 小时
- 144.男童, 7 岁, 因发热、寒战、头痛就诊, 查体 $T40^{\circ}\text{C}$, 咽部红肿, 扁桃体红肿伴脓性分泌物, 舌苔有一层白色苔, 咽拭子培养为“ A 组乙型溶血性链球菌”, 诊断为“猩红热”, 皮疹最先出现部位是 ()
- 耳后、颈部、上胸部
 - 发际、上胸部、背部
 - 颈部、胸部、背部
 - 胸部、背部、腹部
 - 躯干、四肢
- 145.男童, 7 岁, 因发热、寒战、头痛就诊, 查体 $T40^{\circ}\text{C}$, 咽部红肿, 扁桃体红肿伴脓性分泌物, 舌苔有一层白色苔, 咽拭子培养为“ A 组乙型溶血性链球菌”, 诊断为“猩红热”, 经治疗可出院, 嘱出院 2~3 周后来院复诊, 并带好尿液, 目的是观察是否有并发 ()
- 化脓性淋巴结炎
 - 急性肾小球肾炎
 - 风湿热
 - 关节炎
 - 中毒性心肌炎
- 146.女婴, 13 月, III 度营养不良, 因易出汗、呕吐、哭声低就诊, 病史: 在老家自然分娩, 3 个月后母亲带孩子跟随父亲外出打工, 未接种过任何疫苗。PPD 试验结果呈强阳性, 诊断为“结核病”, 预防小儿结核病流行的最有效的措施是 ()
- 及时隔离患儿
 - 规范抗结核治疗
 - 限制小儿流动
 - 及时接种卡介苗
 - 补充营养, 增强抵抗力
- 147.患儿, 男, 1 岁, 因发热、抽搐 1 次就诊, 查体 $T39.8^{\circ}\text{C}$, 其他正常, 引起这次抽搐最可能因素 ()
- 高热
 - 脑膜炎
 - 低血钾
 - 低血钙
 - 低血糖
- 148.患儿, 男, 1 岁, 因发热、抽搐 1 次就诊, 查体 $T39.8^{\circ}\text{C}$, 其他正常, 诊断为“高热惊厥”, 多见于男孩, 好发年龄为 ()
- < 6 个月
 - 6 ~ 12 个月
 - 6 ~ 18 个月
 - 6 ~ 24 个月
 - 6 ~ 36 个月
- 149.患儿, 男, 1 岁, 因发热、抽搐 1 次就诊, 查体 $T39.8^{\circ}\text{C}$, 其他正常, 诊断为“高热惊厥”, 常见护理问题除外 ()
- 急性意识障碍
 - 有窒息的危险
 - 有受伤的危险
 - 体温过高
 - 皮肤完整性受损
- 150.患儿, 男, 1 岁, 因发热、抽搐 1 次就诊, 查体 $T39.8^{\circ}\text{C}$, 其他正常, 诊断为“高热惊厥”, 指导家长, 如孩子发生“惊厥”时, 正确处理方法除外 ()
- 解开衣领

- B.松解衣服
 - C.家长保持镇定
 - D.抬高患儿头部 30°
 - E.头转向一侧
- 151.小儿发病率及死亡率最高的年龄期是 ()
- A.新生儿期
 - B.婴儿期
 - C.幼儿期
 - D.学龄前期
 - E.学龄期
- 152.青春期生长发育最大的特点是 ()
- A.体格生长加快
 - B.神经发育成熟
 - C.内分泌调节功能稳定
 - D.情绪波动大
 - E.生殖系统迅速发育, 趋向成熟
- 153.新生儿如患脑部疾病, 颅内压增高引起的脑膜刺激征不明显, 这是由于 ()
- A.新生儿各种反应低下
 - B.从母体获得 IgG 抗体, 缓解症状
 - C.该病的病理生理变化小
 - D.颅缝及囟门未闭, 起到缓冲作用
 - E.新生儿体液免疫强大
- 154.新生儿败血症最常见的感染途径是 ()
- A.脐部感染
 - B.皮肤感染
 - C.羊水穿刺
 - D.胎膜早破
 - E.产道感染
- 155.社区护士在新生儿护理的讲座中介绍婴儿对某些传染病有一定的抵抗力, 其主要是通过胎盘从母体获得 ()
- A.IgD
 - B.mIgD
 - C.SIgD
 - D.IgG
 - E.IgM
- 156.下列符合早产儿外观特点的是 ()
- A.皮肤红润, 胎毛少
 - B.耳壳软骨发育好
 - C.阴囊多皱襞
 - D.头发分条清楚
 - E.足底光滑, 纹理少
- 157.护士使用洋地黄药物治疗急性心力衰竭时, 以下哪项是错误的 ()
- A.每次用药前应测量患儿脉搏, 婴儿脉率小于 90 次/分应停药
 - B.注意严格按剂量给药
 - C.注意观察有无恶心、呕吐、色视等
 - D.同时给服钙剂以增强其作用
 - E.鼓励患儿进食含钾丰富的食物
- 158.患儿男, 6 岁, 2 周前发热, 在外院诊断为扁桃腺炎。近 3 天尿量减少, 尿液为浓茶色, 双眼睑水肿, 半小时前突然头痛、呕吐, 视物模糊, 应首先采取哪项护理措施 ()
- A.24h 尿量测定
 - B.测血压
 - C.肾功能检查
 - D.查尿常规
 - E.立即用镇静、利尿药
- 159.胎儿可以通过母乳从母体获得 ()
- A.分泌型 IgA
 - B.IgM
 - C.IgG
 - D.IgE
 - E.IgD
- 160.以下属于小儿出生时存在, 但生后 3~4 个月消失的神经反射是 ()
- A.觅食反射
 - B.腹壁反射

- C.角膜反射
D.腱反射
E.吞咽反射
- 161.患儿女，2岁，化脓性脑膜炎。急诊入院时高热，牙关紧闭，口吐白沫，两眼上翻，全身肌肉痉挛，双手握拳，有痰鸣，头向后仰。护士护理该患儿最关键的措施是（ ）
A.立即静脉输入抗生素控制感染
B.立即止惊并清除口鼻腔分泌物，保持呼吸道通畅
C.给予安静的房间，尽量减少刺激
D.20%甘露醇静脉输液，防止脑水肿
E.迅速降温
- 162.患儿男，10个月，牛乳喂养，未加辅食。近1个月来面色苍白，肝肋下2cm，HB90g/L，红细胞体积小，中央浅染。正确的治疗措施是（ ）
A.维生素B12肌注
B.口服叶酸
C.口服铁剂
D.输血
E.保肝治疗
- 163.小儿出生后生长发育速度最快的时期是（ ）
A.新生儿期
B.婴儿期
C.幼儿期
D.学龄前期
E.学龄期
- 164.早产儿生理性黄疸胆红素最高不超过（ ）
A.340 μ mol/L
B.256.5 μ mol/L
C.205.2 μ mol/L
D.573 μ mol/L
E.118 μ mol/L
- 165.患儿，6岁，2周前发热，在外院诊断为扁桃体炎。近3天尿量减少，尿液为浓茶色，双眼睑水肿，半小时前突然头痛、呕吐，视物模糊，应首先采取哪项护理措施（ ）
A.24h尿量测定
B.测血压
C.肾功能检查
D.查尿常规
E.立即用镇静、利尿药
- 166.患儿女，3个月。因发热2天，抽搐1天就院，入院时体温39.3 $^{\circ}$ C，出现抽搐并伴有喷射性呕吐，查体：前囟饱满，双侧瞳孔反射不对称，脑膜刺激征阳性。实验室检查：白细胞2000 $\times 10^6$ /L，中性粒细胞为主，该患儿最可能的诊断的是（ ）
A.高热惊厥
B.电解质紊乱
C.低钙惊厥
D.癫痫发作
E.化脓性脑膜炎
- 167.新生儿期指脐带结扎开始至生后（ ）
A.满7天
B.满14天
C.满28天
D.满29天
E.满1个月
- 168.新生儿颅内出血的典型症状是（ ）
A.呼吸暂停，面色青灰或苍白
B.先表现兴奋，后出现抑制
C.全身硬肿，皮肤发凉
D.体温不升
E.牙关紧闭.面肌紧张
- 169.患儿男，6个月，支气管肺炎。半天来突然烦躁不安，口周发绀，有鼻翼扇动及三凹征。查体：呼吸72次/分，心率180次/分，心音低钝，两肺大量细湿啰音，肝肋下3.5cm，护士判断该患儿最可能并发了（ ）
A.脓胸
B.肺不张
C.脓气胸
D.肺大泡

- E.心力衰竭
- 170.患儿男, 5 岁。一周前流涕, 继之高热、头痛、嗜睡、精神异常、意识障碍, 口唇有疱疹, 白细胞正常, 实验室检查脑脊液基本正常。首先应考虑 ()
- A.结核性脑膜炎
 - B.化脓性脑膜炎
 - C.病毒性脑膜炎
 - D.脑脓肿
 - E.脑栓塞
- 171.婴儿期是指 ()
- A.出生~28 天
 - B.出生~12 个月
 - C.生后 13 个月~2 岁
 - D.出生~2 岁
 - E.1~3 岁
- 172.新生儿期感染后最常出现的症状是 ()
- A.哭闹
 - B.拒乳
 - C.黄疸
 - D.偏食
 - E.便血
- 173.患儿男, 3 岁。自幼青紫, 生长发育落后, 活动后喜蹲踞, 现突然发生晕厥、抽搐。护士应意识到孩子最可能的情况是 ()
- A.低钙抽搐
 - B.化脓性脑膜炎
 - C.高血压脑病
 - D.法洛四联症脑缺氧发作
 - E.低血糖
- 174.患儿女, 1 个月。发热 2 天、呕吐 5 次入院。查体: 患儿精神萎靡, 目光凝视, 脑膜刺激征阳性, 初步诊断为化脓性脑膜炎。其常见的病原菌是 ()
- A.大肠埃希菌
 - B.肺炎球菌
 - C.铜绿假单胞菌
 - D.流感嗜血杆菌
 - E.沙门菌
- 175.根据体重计算公式, 8 月龄小儿的标准体重为 ()
- A.6kg
 - B.7kg
 - C.8kg
 - D.9kg
 - E.10kg
- 176.能反映新生儿肺透明膜病的主要症状是 ()
- A.犬吠样咳嗽
 - B.体温降低
 - C.拒乳、呕吐
 - D.皮肤硬肿出现
 - E.进行性呼吸困难、发绀
- 177.患儿女, 7 岁。发热、咳嗽、咳痰 6 天, 不易咳出, 食欲差。查体: 体温 37.5℃, 呼吸 24 次/分, 心率 72 次/分, 肺部听诊少量湿啰音。护士应首先采取的护理措施是 ()
- A.立即降温
 - B.少食多餐
 - C.雾化吸入
 - D.氧气吸入
 - E.吸痰
- 178.患儿男, 4 岁。因家长怀疑孩子扁桃体发炎, 未到医院就诊多次自行给予“阿奇霉素”、“头孢克洛”、“罗红霉素”等药物治疗。7 天前出现发热、呕吐、腹泻, 粪便呈暗绿色, 量多, 混有粘液, 伴中毒症状, 诊断为“金黄色葡萄球菌肠炎”入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调 ()
- A.补充叶酸和维生素 B12
 - B.滥用抗生素的严重后果
 - C.不食生冷、不洁食物
 - D.保持患儿心情舒畅
 - E.增强患儿机体免疫力
- 179.最能反映小儿体格发育尤其是营养状况的指标是 ()

- A. 身高
 - B. 体重
 - C. 头围
 - D. 胸围
 - E. 牙齿
180. 使用暖箱可起关键作用的疾病是 ()
- A. 新生儿肺炎
 - B. 新生儿败血症
 - C. 新生儿破伤风
 - D. 新生儿肺透明膜病
 - E. 新生儿寒冷损伤综合征
181. 患儿女, 1 岁, 肺炎。今日突然出现烦躁不安、呼吸困难、发绀, 呼吸 65 次/分, 心率 160 次/分, 右肺叩诊鼓音, 听诊呼吸音减低, 肝肋下 2.5 cm, 胸片示纵膈向左移位, 护士判断该患儿最可能发生了 ()
- A. 脓胸
 - B. 肺不张
 - C. 心力衰竭
 - D. 气胸
 - E. 支气管异物
182. 患儿男, 3 个月, 母乳喂养, 腹泻 2 个月, 大便 3~6 次/日, 稀或糊状, 无脓血, 食欲好, 面部湿疹, 体重 5.6KG, 考虑该患儿是 ()
- A. 慢性腹泻
 - B. 迁延性腹泻
 - C. 生理性腹泻
 - D. 饮食性腹泻
 - E. 感染性腹泻
183. 下列计划免疫中属于基础免疫, 且初种年龄在 8 个月以上的是 ()
- A. 麻疹疫苗
 - B. 流感疫苗
 - C. 霍乱疫苗
 - D. 天花疫苗
 - E. 风疹疫苗
184. 对于新生儿窒息首要的处理措施是 ()
- A. 给氧
 - B. 刺激呼吸
 - C. 清理呼吸道
 - D. 保持血压正常
 - E. 加强营养
185. 早产儿, 出生后 4 小时出现呼吸困难、拒乳、口唇青紫, 三凹症明显, 两肺闻及湿啰音, 胸片示透亮区降低。护士制定的护理计划中最主要的护理诊断是 ()
- A. 有皮肤受损的危险
 - B. 活动无耐力
 - C. 营养不足
 - D. 气体交换受损
 - E. 有感染的危险
186. 患儿男, 4 岁。因家长怀疑孩子扁桃体发炎, 未到医院就诊多次自行给予“阿奇霉素”、“头孢克洛”、“罗红霉素”等药物治疗。7 天前出现发热、呕吐、腹泻, 粪便呈暗绿色, 量多, 混有粘液, 伴中毒症状, 诊断为“金黄色葡萄球菌肠炎”入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调 ()
- A. 补充叶酸和维生素 B12
 - B. 滥用抗生素的严重后果
 - C. 不食生冷、不洁食物
 - D. 保持患儿心情舒畅
 - E. 增强患儿机体免疫力
187. 幼儿期保健的重点是 ()
- A. 保暖及预防感染
 - B. 定期进行家访
 - C. 预防意外发生
 - D. 预防近视发生
 - E. 培养良好的品德
188. 对于蓝光疗法的护理措施应除外 ()
- A. 入箱前剪短指甲
 - B. 在皮肤上涂油膏保护皮肤
 - C. 暴露全身皮肤

- D.双眼佩戴遮光眼罩
E.男婴注意保护阴囊
189. 患儿女，1 岁。支气管肺炎入院，体温 39.7℃，脉搏 122 次/分，呼吸 25 次/分。医嘱：青霉素 40 万 U，IM，qid；Vit C 0.2g、止咳糖浆 5ml，口服，tid。帮助患儿服药的正确方法是（ ）
- A.先喂止咳糖浆，后喂维生素
B.喂止咳糖浆后多喂水
C.最后喂止咳糖浆不能喂水
D.在患儿咳嗽时喂药
E.吃奶后喂药并多喂水
190. 患儿女，日龄 5 D，因感染用抗生素治疗，进日发现口腔内有乳凝块样附着物，诊断为鹅口腔，清洁口腔应选用（ ）
- A.2%碳酸氢钠溶液
B.温开水
C.3%过氧化氢溶液
D.0.1%利凡诺溶液
E.生理盐水
191. 新生儿第一次接种乙肝疫苗在出生后不超过（ ）
- A.8 小时
B.10 小时
C.12 小时
D.24 小时
E.48 小时
192. 关于新生儿颅内出血的护理措施应除外（ ）
- A.保持安静，减少噪音
B.头肩部抬高 15~30 度，以减轻脑水肿
C.注意保暖，治疗护理尽量集中进行
D.护理操作轻、稳、准
E.经常翻身，防止肺淤血
193. 患儿男，6 岁，肾病综合征。入院时查体患儿面部、腹壁及双下肢明显水肿。实验室检查：胆固醇升高，血浆蛋白降低，尿蛋白（++++）。根据该患儿的情况，护士制定的首优护理诊断为（ ）
- A.呼吸形态改变
B.活动无耐力
C.有感染的可能
D.体液过多
E.有皮肤完整性受损的危险
194. 患儿女，11 个月。腹泻、呕吐入院，诊断为重型腹泻，补液 6h 后排尿，但出现精神萎靡、心音低钝，四肢无力，腹胀，肠鸣音减弱，应考虑为（ ）
- A.酸中毒
B.低血钠
C.低血钾
D.低血钙
E.低血镁
195. 接种活疫苗时，局部皮肤消毒应用（ ）
- A.0.5%碘伏
B.2%碘伏
C.2%碘酊
D.75%乙醇
E.2%碘酊+75%乙醇
196. 新生儿寒冷损伤综合征治疗和护理的关键是（ ）
- A.坚持母乳喂养
B.供给足够的液体
C.逐步复温，循序渐进
D.合理用药
E.蓝光疗法
197. 患儿男，1 岁，肺炎。鼻翼扇动、三凹征、口唇发绀、持续高热，经多种抗生素治疗无好转，该患儿感染的病原体可能是（ ）
- A.金黄色葡萄球菌
B.肺炎球菌
C.腺病毒
D.大肠埃希菌
E.流感嗜血杆菌
198. 护理法洛四联症患儿时，给予充足水分的主要目的是（ ）
- A.预防形成脑血栓

- B.预防并发肺感染
 - C.预防并发亚急性细菌性心内膜炎
 - D.预防心力衰竭
 - E.预防中枢神经系统感染
- 199.生长发育遵循的规律正确的是 ()
- A.自下而上
 - B.由远到近
 - C.由细到粗
 - D.由简单到复杂
 - E.由高级到低级
- 200.患儿,女,11岁,水塘边玩耍时不慎溺水,现意识丧失,呼吸停止,护理人员达到现场急救后应立即采取的处理措施是 ()
- A.人工呼吸
 - B.胸外心脏按压
 - C.清除口鼻腔分泌物和异物
 - D.建立静脉通路
 - E.寻求医生帮助
- 201.患儿男,3岁。发热10小时,体温39.5℃。来医院就诊时,突然发现双手紧握,两眼凝视,呼之不应,持续3分钟。查体:神智清楚,精神萎靡,颈软无抵抗。该患儿目前最重要的护理问题是 ()
- A.有窒息的危险与惊厥有关
 - B.有皮肤完整性受损的危险与惊厥有关
 - C.潜在并发症颅内高压
 - D.潜在并发症电解质紊乱
 - E.潜在并发症脑功能障碍
- 202.法洛四联症患儿突然缺氧发作,是由于 ()
- A.长期脑缺氧
 - B.并发脑血栓
 - C.并发脑脓肿
 - D.心力衰竭
 - E.肺动脉漏斗部肌肉痉挛
- 203.小儿头围与胸围大致相等的年龄是 ()
- A.出生时
 - B.6个月
 - C.1岁
 - D.1岁半
 - E.2岁
- 204.对于臀位出生的新生儿应防止其发生 ()
- A.新生儿肝炎
 - B.新生儿败血症
 - C.新生儿破伤风
 - D.新生儿颅内出血
 - E.新生儿肺炎
- 205.患儿女,1个月。发热2天,体温高达38.9~39.8℃,面色苍白、呻吟、呼吸困难,呼吸65次/分,心率180次/分,心音低钝,肝肋下2cm,双肺可闻及中量细湿啰音。右上肺叩诊稍浊,呼吸音减弱。胸片示双肺大小不等的片状阴影,右上肺大片浓密阴影,阴影内似有液气平,护士判断此患儿为 ()
- A.金黄色葡萄球菌肺炎
 - B.呼吸道合胞病毒肺炎
 - C.腺病毒肺炎
 - D.支气管哮喘
 - E.支原体肺炎
- 206.患儿男,8岁。双眼睑浮肿,尿少3天,以肾病综合征收入院。查体:双下肢水肿明显。实验室检查:血浆白蛋白27g/L,尿蛋白定性(+++)。目前患儿最主要的护理问题是 ()
- A.焦虑
 - B.知识缺乏
 - C.体液过多
 - D.有感染的危险
 - E.有皮肤完整性受损的危险
- 207.小儿第一次生长高峰发生于 ()
- A.婴儿期
 - B.幼儿期
 - C.学龄前期
 - D.学龄期
 - E.青春期

208.新生儿出现“马牙”或“板牙”，正确的处理是（ ）

- A.抗炎治疗
- B.挑破
- C.涂龙胆紫
- D.无需处理
- E.手术切除

209.患儿男，6个月，支气管肺炎。半天来突然烦躁不安、口周发绀、有鼻翼扇动及三凹征。

查体：呼吸 72 次/分，心率 180 次/分，心音低钝，两肺大量细湿啰音，肝肋下 3.5cm，护士判断该患儿最可能并发了（ ）

- A.脓胸
- B.肺不张
- C.脓气胸
- D.肺大泡
- E.心力衰竭

210.患儿女，1岁，人工喂养，未加辅食。近1个月出现反应迟钝，间断出现手、足、头震颤，面色苍黄。应采取的措施是（ ）

- A.维生素 B12 肌内注射
- B.口服叶酸
- C.口服铁剂
- D.输血
- E.口服脑复康

211.新生儿生理性体重下降的幅度为（ ）

- A.大于出生体重的 5%
- B.小于出生体重的 10%
- C.大于出生体重的 10%
- D.小于出生体重的 15%
- E.小于出生体重的 20%

212.早产儿应用暖箱保暖，暖箱温度调节的主要依据是（ ）

- A.胎龄
- B.精神状态
- C.季节及环境温度
- D.体重及日龄
- E.呼吸及心率

213.患儿女，2岁，因发热、咳嗽、咽痛3天入院。查体：急性面容，体温 39.2℃，咽后壁充血，双肺呼吸音略粗，无啰音。胸片显示肺纹理增多。最可能的诊断是（ ）

- A.急性上呼吸道感染
- B.急性喉炎
- C.急性支气管炎
- D.支气管肺炎
- E.大叶性肺炎

214.患儿男，2岁，因上呼吸道感染出现咳嗽、发热入院。现体温 39.3℃，半小时前突发抽搐，持续约1分钟后停止，呈嗜睡状。为避免再发抽搐，护理的重点是（ ）

- A.多晒太阳
- B.按时预防接种
- C.加强体格锻炼
- D.居室定期食醋熏蒸
- E.体温过高时应及时降温

215.婴儿营养不良最常见的病因是（ ）

- A.先天不足
- B.喂养不当
- C.缺乏锻炼
- D.疾病影响
- E.免疫缺陷

216.轻度新生儿窒息，Apg Ar 评分标准为（ ）

- A.0~3分
- B.3~5分
- C.4~7分
- D.5~8分
- E.6~9分

217.患儿女，7岁。发热、咳嗽、咳痰6天，痰液黏稠，不易咳出，食欲差。查体：体温 37.5℃，呼吸 24 次/分，心率 72 次/分，肺部听诊有少量湿啰音。护士应采取的护理措施是（ ）

- A.鼻导管吸氧
- B.给予镇咳药

- C.立即物理降温
- D.超声雾化吸入
- E.吸痰

218.患儿男, 5 岁, 因急性肾炎住院。现突发呼吸困难, 不能平卧, 咳粉红色泡沫痰, 心率增快, 肺部闻哮鸣音和湿啰音。你考虑患儿可能发生了 ()

- A.肺部感染
- B.严重循环充血
- C.急性肾衰竭
- D.胸腔积液
- E.急性溶血

219.维生素 D 在体内羟化的最后脏器是 ()

- A.皮肤
- B.骨骼
- C.肾
- D.肝
- E.脾

220.新生儿病理性黄疸最严重的并发症是 ()

- A.贫血
- B.败血症
- C.肝性脑病
- D.胆红素脑病
- E.肝炎

221.患儿女, 7 岁。发热、咳嗽、咳痰 6 天, 痰液黏稠, 不易咳出, 食欲差。查体: 体温 37.5°C, 呼吸 24 次/分, 心率 72 次/分, 肺部听诊有少量湿啰音。护士应提出的护理问题是 ()

- A.清理呼吸道无效
- B.低效性呼吸形态
- C.气体交换受损
- D.心输出量减少
- E.营养失调

222.患儿男, 3 岁。急性上呼吸道感染, 体温 39.5°C, 因全身抽搐就诊。为明确抽搐原因, 在收集患儿健康史应重点询问 ()

- A.喂养史
- B.生长史
- C.既往发作史
- D.过敏史
- E.药物史

(223~225 题共用题干)

患儿男, 3 岁。因咳嗽 3 天、喘憋 1 天入院。查体: 体温 38.6°C, 脉搏 120 次/分, 呼吸 50 次/分, 有呼气性呼吸困难, 两肺布满哮鸣音, 有少量粗湿啰音。诊断为哮喘性支气管炎。

223.患儿首优护理问题是 ()

- A.自理能力缺陷
- B.体温过高
- C.知识缺乏
- D.活动无耐力
- E.低效性呼吸形态

224.下列护理措施不正确的是 ()

- A.病室定时通风换气
- B.少量饮水
- C.定时为患儿拍背
- D.适当给予物理降温
- E.密切观察病情变化, 必要时吸氧

225.对于家长的健康教育, 应除外 ()

- A.介绍该病可能的发病原因
- B.指导药物服用的方法
- C.解释超声雾化吸入的作用
- D.介绍患儿的饮食注意点
- E.患儿烦躁时, 可应用镇静药物

(226~227 题共用题干)

4 个月女婴, 6.2kg, 母乳喂养, 未添加任何辅食, 大便 5~6 次/日, 黄色糊状便, 无臭味。大便细菌培养阴性。

226.护士考虑该患儿为 ()

- A.病毒性肠炎
- B.生理性腹泻

- C.迁延性腹泻
- D.真菌性肠炎
- E.消化不良

227.该患儿的治疗正确的是 ()

- A.庆大霉素
- B.利巴韦林
- C.氨苄西林
- D.诺氟沙星
- E.添加辅食及助消化药

(228~230 题共用题干)

患儿女, 2 岁。自幼青紫, 生长发育落后于同龄小儿, 反复上呼吸道感染, 现因发热、咳嗽 3 天入院。查体: 体温 38.5℃, 口唇发绀, 咽部充血, 双肺呼吸音粗, 无干湿啰音, 心率 136 次/分, 胸骨左缘 2~4 肋间可闻及 II~III 级喷射性收缩期杂音, 指(趾)端发绀明显, 有杵状指。

228.护士认为该患儿可能患的疾病是 ()

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

229.患儿入院后 1 小时, 因哭闹后突然晕厥、抽搐, 护士意识到可能出现了 ()

- A.脑缺氧发作
- B.脑脓肿
- C.脑血栓
- D.中毒性脑病
- E.脑出血

230.此时护士应首先采取下述哪一措施 ()

- A.吸氧
- B.镇静
- C.置患儿于膝胸卧位
- D.报告医生
- E.准备吗啡、心得安等抢救药品

231.患者, 男, 45 岁, 农民, 因在高温闷热环境下进行劳作, 近日出现全身乏力, 体温高达 40℃ 以上, 同时出现谵妄、抽搐, 皮肤无汗症状, 入院后诊断为热射病。请问其首要的治疗措施为 ()

- A.降温
- B.吸氧
- C.抗休克
- D.治疗脑水肿
- E.纠正水、电解质紊乱

232.患者, 男性, 55 岁。车祸造成多发性损伤, 急救车首先要处理的情况是 ()

- A.开放性骨折
- B.腹部外伤后肠管脱出
- C.外伤性大出血
- D.颅脑外伤
- E.膀胱破裂

五、基础护理

单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项, 选项中有一个答案是正确的, 参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂, 多选、少选或不选均不得分。

1.患者, 女性, 45 岁, 今日出院。护生为住院患者整理病案, 其中不属于护理病案的一项是 ()

- A.入院护理评估单
- B.病程记录单
- C.护理计划单
- D.健康教育计划单
- E.护理记录单

2.护士小王, 26 岁, 有四年的工作经历, 一天在为 66 岁乙肝患者抽血时, 不慎被穿刺针刺破手指, 流少量血。请问此时最恰当的处理措施是 ()

- A.冲洗、局部挤压、75%乙醇消毒
- B.近心端向远心端挤压、冲洗、消毒、敷贴、报告主管部门、评估、血清学检测
- C.报告主管部门、打预防针、生理盐水冲洗

- D.局部挤压、报告、打预防针
E.冲洗、包扎、报告
- 3.护士小李在手术室工作五年，经常上手术台做器械护士，鉴于这种工作性质，小李有发生哪些负重伤的危险（ ）
A.胃炎、腰椎间盘突出、恶性肿瘤
B.腰椎间盘突出症、静脉曲张、腰肌劳损
C.静脉曲张、腰椎间盘突出、恶性肿瘤
D.风湿性关节炎、腰肌劳损、静脉曲张
E.腰椎间盘突出、风湿性关节炎、肾炎
- 4.小张，女，静配室护士，今天要为患者配制化疗药物，配制前要做准备是（ ）
A.洗手、戴口罩、穿隔离衣
B.流动水洗手、戴手套、穿隔离衣
C.流动水洗手、戴一次性口罩、戴手套、穿隔离衣
D.流动水洗手、戴一次性口罩、戴面罩、戴手套、穿防水隔离衣
E.流动水洗手、戴手套、穿隔离衣、戴防护罩
- 5.患者，男性，65岁，在门诊候诊时，突然感到腹痛难忍，出冷汗，四肢冰冷，呼吸急促。门诊护士应（ ）
A.态度和蔼，劝其耐心等待
B.让患者平卧候诊
C.安排提前就诊
D.给予镇痛剂
E.请医生加快诊疗
- 6.患者，男性，54岁，因外伤右下肢骨折，大量出血，送至急诊科。在医生未到来之前，护士应立即（ ）
A.询问事故的原因
B.向保卫部门报告
C.为患者注射镇痛剂
D.安排观察床位，等待医生
E.为患者止血，建立静脉通路
- 7.患者，男性，35岁，因外伤引起多发性骨折伴创伤性休克。急诊科医生初步给予吸氧、静脉输液等处理后，需立即送往手术室，搬运时有关说法错误的是（ ）
A.可以采用四人搬运法搬运
B.搬运患者时动作轻稳、协调一致
C.推平车时车速适宜，护士应在患者脚端，便于观察病情
D.推平车进出门时，不可用车撞门
E.注意保暖，避免患者受凉
- 8.患者，男性，66岁，因呼吸道阻塞行气管切开，其病室环境应特别注意（ ）
A.调节温湿度
B.保持安静
C.加强通风
D.合理采光
E.适当绿化
- 9.患者，男性，56岁，因颅骨骨折行急诊手术，护士为其准备麻醉床，不符合要求的操作是（ ）
A.可将原有的备用床改铺为麻醉床
B.橡胶单及中单铺于床中部和床尾部
C.盖被纵向三折叠于门对侧床边
D.枕头开口背门并横立于床头
E.备麻醉护理盘、输液架等
- 10.患者，女性，27岁，因即将分娩，办理入院手续住院待产，对其处置措施不正确的是（ ）
A.孕妇不需用的物品交家属带回
B.嘱孕妇沐浴、更衣
C.孕妇钱物可由家属带回
D.住院处护士送孕妇入病区
E.与病区护士做好病情和物品的交接
- 11.患者，女性，40岁，胆囊切除术后1周，医嘱予以明日出院。护士应首先（ ）
A.通知患者及家属做好出院准备
B.通知患者办理出院手续
C.整理病历
D.指导结账
E.健康教育
- 12.患者，男性，45岁，因消化性溃疡住院手术，病区护士在实施入院护理时，不正确的措施是（ ）

- A.将备用床改为麻醉床
B.介绍病区环境
C.通知医生
D.测量 T、P、R、BP 并记录
E.指导正确留取常规标本
- 13.患者，男性，66 岁，入院诊断为风湿性心脏病合并心力衰竭。入院后患者出现烦躁不安，为防止患者受伤，护士为其应用保护具，下列关于保护具的使用，不妥的是（ ）
A.使用保护具时，应保持肢体及各个关节处于功能位
B.协助患者定期更换体位，保证患者安全、舒适
C.使用约束带时，下面必须垫衬垫，固定松紧适宜
D.若患者无不适主诉或无特殊情况，不需要放松约束带
E.记录使用保护具的原因、时间、观察结果、相应的护理措施等
- 14.患者，男性，22 岁，急性阑尾炎手术痊愈后出院，护士整理其出院病历时，首页应是（ ）
A.体温单
B.护理病历首页
C.病史首页
D.住院病历首页
E.手术记录首页
- 15.患者，男性，45 岁，因食管静脉曲张破裂出血，呕血后，感胸闷、心悸、呼吸急促、出冷汗、烦躁不安，脉细速，血压 70/50mmHg。护士应立即为其安置（ ）
A.半坐卧位
B.侧卧位
C.平卧位
D.俯卧位
E.中凹卧位
- 16.患者，女性，29 岁，妊娠 30 周，产前检查发现胎位不正（臀先露）。门诊护士指导其纠正胎位应采取（ ）
A.头低足高位
B.侧卧位
C.截石位
D.俯卧位
E.膝胸卧位
- 17.患者，男性，44 岁，1 个月来大便带血、消瘦，拟行直肠镜检查，应取的卧位是（ ）
A.左侧卧位
B.屈膝仰卧位
C.截石位
D.膝胸位
E.蹲位
- 18.患者，女性，37 岁，重度心力衰竭。患者表现乏力、呼吸困难，护士为其取端坐位，下列与不属于端坐卧位的作用一项是（ ）
A.使膈肌下降
B.利于呼吸活动
C.减少下肢血液回流
D.减轻心脏负担
E.增加心肌收缩力
- 19.患者，女性，26 岁，患阿米巴痢疾，医嘱给予灌肠治疗，药物灌肠时可采取（ ）
A.左侧卧位，保留灌肠
B.右侧卧位，保留灌肠
C.左侧卧位，小量不保留灌肠
D.右侧卧位，小量不保留灌肠
E.右侧卧位，大量不保留灌肠
- 20.患者，女性，40 岁，患泌尿系感染，医嘱做尿培养，患者神志清楚，一般情况尚可，护士在取尿标本的方法时可采用（ ）
A.留晨第一次尿 100ml
B.随机留尿 100ml
C.留取中段尿
D.收集 24h 尿
E.行导尿管留尿
- 21.患者，男性，32 岁，留置 PICC，护士小王戴无菌手套为患者换药，不正确的步骤是（ ）
A.戴手套前先洗手、戴口罩和工作帽
B.核对标签上的手套号码和灭菌日期
C.戴上手套的右手持另一手套的内面戴上左手
D.戴上手套的双手置腰部水平以上

- E.脱手套时, 将手套翻转脱下
- 22.患者, 男性, 56 岁, 诊断为病毒性肝炎, 其使用的票证、书信等物品宜采用的消毒方法是 ()
- 喷雾法
 - 压力蒸汽灭菌法
 - 擦拭法
 - 浸泡法
 - 熏蒸法
- 23.患者, 男性, 60 岁, 因骨折卧床 2 周。护士为其床上洗头过程中, 发现其面色苍白、出冷汗。护士应立即 ()
- 请家属协助洗发
 - 加快操作速度完成洗发
 - 边洗发边通知医生
 - 鼓励患者再坚持片刻
 - 停止操作, 让患者平卧
- 24.患者, 男性, 63 岁, 肾炎, 全身水肿, 体质虚弱不能自行翻身。下述预防压疮的护理措施中, 不妥的一项是 ()
- 保持皮肤清洁
 - 及时更换潮湿的床单
 - 每 2 小时变换 1 次体位
 - 骨突处垫橡皮气圈
 - 整理床单位时不拖拉患者
- 25.患者, 男性, 69 岁, 胃癌术后卧床 1 月, 近日骶尾部皮肤有破溃, 护士观察后认为是压疮溃疡期。其主要根据是 ()
- 皮下有硬结
 - 局部皮肤发红水肿
 - 有触痛感
 - 皮肤表面呈紫红色
 - 有脓性分泌物
- 26.护士巡视病房时, 发现张先生液体不滴, 注射部位肿胀, 主诉疼痛, 无回血, 这种情况可考虑为 ()
- 针头阻塞
 - 输液压力过低
 - 静脉痉挛
 - 针头脱出血管外
 - 针头斜面紧贴血管壁
- 27.患儿, 男性, 6 岁, 不慎将花生米吸气管。其不可能出现的临床表现是 ()
- 吸气费力
 - 呼气费力
 - 口唇发绀
 - 烦躁不安
 - 鼻翼扇动
- 28.患者, 女性, 40 岁, 发热, 咳嗽, 左侧胸痛, 患者多采取左侧卧位休息, 自诉此卧位胸部疼痛减轻, 呼吸道通畅。此时卧位性质属于 ()
- 主动卧位
 - 被动卧位
 - 被迫卧位
 - 习惯卧位
 - 特异卧位
- 29.患者, 男性, 55 岁, 因“风湿性心脏病、房颤”入院。护士为其测量脉率、心率的正确方法是 ()
- 先测脉率, 再测心率
 - 护士测脉率, 医生测心率
 - 一人同时测脉率和心率
 - 一人测脉率一人计时
 - 一人听心率, 一人测脉率, 同时测 1 分钟
- 30.患者, 女性, 51 岁, 近日头痛, 恶心、呕吐, 无发热。血压 150/93mmHg, 脉搏 46 次/分。此脉搏称为 ()
- 绀脉
 - 洪脉
 - 缓脉
 - 丝脉
 - 不整脉

- 31.患者, 男性, 60 岁, 就诊时突感胸闷心悸, 护士为其测脉时发现每隔 2 个正常搏动后出现 1 次过早搏动, 此现象称为 ()
- 不整脉
 - 二联律
 - 三联律
 - 间歇脉
 - 缓脉
- 32.患者, 男性, 67 岁, 主诉头晕, 测血压为 155/93mmHg。此患者属于 ()
- 高血压
 - 临界高血压
 - 低血压
 - 收缩压正常, 舒张压高
 - 收缩压舒张压均在正常范围内
- 33.患者, 男性, 33 岁, 肝硬化合并上消化道出血, 经对症治疗后出血停止, 病情好转。此患者需做大便隐血试验, 前三天应禁食 ()
- 白菜
 - 牛奶
 - 土豆
 - 豆皮
 - 羊血
- 34.患者, 女性, 22 岁, 需做胆囊造影检查, 检查前准备错误的一项是 ()
- 检查前 1 日晚餐进无脂肪、低蛋白的清淡饮食
 - 检查前 1 日午餐进无脂肪低蛋白的清淡饮食, 晚餐进高脂肪餐
 - 检查前当日早餐禁食
 - 检查时第一次摄片后如胆囊显影良好, 则进高脂肪餐, 以了解胆囊收缩功能
 - 检查前 3 日禁食牛奶、豆制品、糖类易产气食物
- 35.患者, 男性, 35 岁, 需做吸碘试验, 试验前 7 日不需禁食的食物是 ()
- 黄鱼
 - 带鱼
 - 目鱼
 - 牛肉
 - 鲳鱼
- 36.患者, 男性, 29 岁, II 度烧伤面积 50%, 宜采用 ()
- 少渣饮食
 - 高纤维素饮食
 - 高热量饮食
 - 高脂肪饮食
 - 低胆固醇饮食
- 37.患者, 男性, 56 岁, 因摔伤后骨折入院, 在急诊室给予输液、吸氧后, 准备用平车送入病房, 护送途中护士应注意 ()
- 观察输液、吸氧情况, 避免中断
 - 暂停输液、吸氧
 - 暂停吸氧, 输液继续
 - 暂停输液, 吸氧继续
 - 暂停护送, 待病情好转后再送入病房
- 38.患者, 男性, 58 岁, 尿毒症, 留置导尿管 12 小时引出尿液 180ml, 正确的护理评估是 ()
- 尿量正常
 - 多尿
 - 少尿
 - 尿潴留
 - 尿崩症
- 39.患者, 男性, 60 岁, 因“血尿待查”入院, 主诉排尿困难, 下腹疼痛难忍, B 超提示尿道结石。护士应 ()
- 注射利尿剂
 - 立即导尿
 - 轻轻按摩、热敷下腹部
 - 耐心鼓励患者自行排尿
 - 与医生联系, 对症处理
- 40.患儿, 男性, 3 岁, 肠道手术前准备行灌肠, 每次溶液量为 ()
- 50ml
 - 100ml
 - 150ml
 - 180ml

E.300ml

- 41.患者, 男性, 49 岁, 腹泻, 医嘱给予 0.5%新霉素溶液保留灌肠, 不正确的操作是 ()
- A.嘱患者先排尿、排便
 - B.安置左侧卧位
 - C.插入肛管 15~20cm
 - D.选择 20 号以下肛管
 - E.保留灌肠溶液 30 分钟
- 42.患者, 女性, 40 岁, 流行性感冒, 发热 39.5℃, 遵医嘱口服扑热息痛, 正确的用药指导是 ()
- A.保暖
 - B.多饮水
 - C.药物研碎服用
 - D.加强体育锻炼
 - E.睡前服药
- 43.患者, 男性, 32 岁, 脚底被铁锈钉刺伤, 遵医嘱注射破伤风抗毒素。皮试结果: 皮丘红、硬, 直径 1.5cm, 周围红晕达 6cm。采用脱敏注射, 下列正确的是 ()
- A.四等份分次注射
 - B.五等份分次注射
 - C.分 4 次注射剂量渐减
 - D.五等份剂量渐增
 - E.分 4 次注射剂量渐增
- 44.患者, 女性, 50 岁, 因急性支气管炎遵医嘱用青霉素治疗, 用药 9 日, 出现发热、关节肿痛全身淋巴结肿大、腹痛。应考虑为 ()
- A.消化系统过敏反应
 - B.皮肤过敏反应
 - C.血清样反应
 - D.合并流行性感冒
 - E.注射部位感染致全身反应
- 45.患者, 女性, 38 岁, 因肺炎入院, 根据医嘱进行输液治疗。在输液过程中患者突然主诉胸部异常不适, 伴有呼吸困难, 心前区可闻及一个响亮持续的“水泡声”。护士应考虑发生的情况是 ()
- A.右心衰竭
 - B.发热反应
 - C.过敏反应
 - D.肺水肿
 - E.空气栓塞
- 46.患者, 男性, 36 岁, 因车祸导致脾破裂急诊入院。面色苍白、四肢厥冷、血压 65/40mmHg、脉搏 150 次/分, 急需输血。输血过程中错误的护理措施是 ()
- A.认真听取患者的主诉
 - B.输血开始 15 分钟内, 速度宜慢
 - C.输入 2 袋以上血液时, 2 袋血之间需输入少量生理盐水
 - D.输入血液内不得随意加入药液
 - E.输血毕不需再输入生理盐水
- 47.患者, 男性, 54 岁, 因肝硬化, 食管静脉曲张破裂大呕血急诊入院。遵医嘱输血。在输血过程中, 患者出现手足抽搐、血压下降。此患者可能出现的情况是 ()
- A.过敏反应
 - B.溶血反应
 - C.发热反应
 - D.低体温反应
 - E.枸橼酸钠中毒反应
- 48.患者, 女性, 3 岁, 脚背被热水烫伤, 应立即采取的物理方法是 ()
- A.冷湿敷
 - B.热湿敷
 - C.热水袋
 - D.冰袋
 - E.乙醇拭浴
- 49.患者, 男性, 38 岁, 体温 39.6℃, 医嘱给予物理降温, 护士行乙醇拭浴, 置冰袋于头部是为了 ()
- A.防止脑水肿
 - B.防止头部充血
 - C.防止心律失常
 - D.提高脑组织对缺氧的耐受性
 - E.利于脑组织的恢复
- 50.患者, 男性, 15 岁, 打球致踝关节扭伤, 1 小时后的正确处理是 ()

- A.热敷
B.冷敷
C.用手搓揉
D.小夹板固定
E.红外线照射
- 51.患者，男性，56岁，慢性心力衰竭入院，护理人员在接待该患者时首先应（ ）
A.卫生处置
B.介绍医院的规章制度
C.立即护送患者入病区
D.通知医生做术前准备
E.了解患者有何护理问题
- 52.患者，男性，40岁，发热待查入院，高热 39.8℃，神志清楚。护士为其乙醇拭浴，错误的做法是（ ）
A.冰袋置头部，热水袋置足底
B.以拍拭方式进行
C.患者出现寒战，加速拭浴速度
D.禁拭后颈、心前区、腹部、足底
E.拭浴结束取出热水袋
- 53.患者，男性，45岁，最近2个月来出现厌食、恶心、腹胀、肝区不适，为明确诊断需做肝功能检验。下述采集标本的操作错误的步骤是（ ）
A.空腹采血
B.用干燥试管
C.采血后取下针头缓慢注入试管
D.血液泡沫不能注入试管
E.血液注入试管后用力摇动
- 54.患者，女性，22岁，高热2日，咽部肿痛，全身乏力。为明确诊断，需做咽拭子培养。下列操作错误的是（ ）
A.采集咽部及扁桃体分泌物
B.用无菌拭子培养管留取标本
C.患者进食半小时后采集
D.用长棉签蘸无菌生理盐水擦拭采集部位
E.培养管口应在酒精灯火焰上消毒
- 55.患者，男性，62岁，近3个月来，无明显原因体重下降7千克，出现刺激性咳嗽，持续痰中带血。既往有吸烟史30余年，怀疑支气管肺癌。需取痰找癌细胞确定诊断。用于固定痰内癌细胞的溶液应选用（ ）
A.1%过氧乙酸
B.浓盐酸
C.10%甲醛
D.50%乙醇
E.含氯石灰
- 56.患者，男性，70岁，慢性阻塞性肺气肿合并呼吸衰竭，在治疗过程中需定期做血气分析。护士在采集标本中错误的操作是（ ）
A.应采集动脉血
B.可用桡动脉或股动脉
C.抽吸肝素湿润注射器内壁后，余液全部弃去
D.右手持注射器，与动脉走向成 20°刺入
E.拔针后，立即将针尖斜面刺入软木塞
- 57.患者，男性，65岁，糖尿病，需留尿做尿糖定量检查。正确的尿标本采集方法是（ ）
A.留24小时尿
B.饭前留尿 100ml
C.随时留尿 100ml
D.留清晨第一次尿约 100ml
E.用中段尿法留尿 5ml
- 58.患者，女性，35岁，持续高热，怀疑败血症。护士为其采集血培养标本，错误的操作是（ ）
A.检查容器有无裂缝
B.采集时严格执行无菌技术操作
C.检查培养基是否足够
D.采血后即将针头插入培养瓶注入血液
E.血液注入培养瓶内应轻轻摇匀
- 59.患者，男性，62岁，慢性阻塞性肺气肿，呼吸困难，需给氧治疗。现氧流量为 2L/min，其氧浓度是（ ）
A.29%

- B.33%
C.37%
D.41%
E.45%
- 60.患者，女性，30岁，因酒精过量被送到医院就诊。患者意识清醒，能够配合，护士应首先采取的措施是（ ）
A.口服催吐法
B.注洗器洗胃法
C.硫酸镁导泻
D.漏斗胃管洗胃法
E.电动吸引洗胃法
- 61.患者，女性，35岁，持续高浓度用氧后出现氧中毒，其临床表现不包括（ ）
A.面色苍白
B.进行性呼吸困难
C.烦躁不安
D.恶心
E.瞳孔散大
- 62.患者，男性，65岁，右侧肢体偏瘫。对患者的肢体进行被动锻炼，其目的不包括（ ）
A.预防坠积性肺炎
B.防止肌肉萎缩
C.防止静脉血栓形成
D.防止关节僵硬
E.促进局部血液循环
- 63.患者，女性，32岁，误服敌百虫后需立即洗胃，不能选用的洗胃液是（ ）
A.碳酸氢钠
B.高锰酸钾
C.1%生理盐水
D.温开水
E.清水
- 64.患者，男性，70岁，肺源性心脏病合并呼吸衰竭，应用呼吸机抢救过程中，突然出现烦躁不安，皮肤潮红，浅表静脉充盈。应立即（ ）
A.应用呼吸兴奋剂
B.检查气道有无堵塞
C.减小氧流量
D.增加呼吸频率
E.减小潮气量
- 65.患者，女性，68岁，昏迷，痰多粘稠。在排痰的过程中可采用的护理措施不包括（ ）
A.缓慢滴入少量生理盐水
B.滴入化痰药物
C.叩拍胸背部
D.增加吸引器负压
E.使用超声雾化吸入
- 66.患者，男性，30岁，因高空作业时不慎坠落，现处于昏迷状态。观察病情时，不包括（ ）
A.瞳孔的变化
B.生命体征的变化
C.心理的变化
D.尿量的变化
E.意识的变化
- 67.患者，女性，59岁，因心绞痛发作需要吸氧治疗。在吸氧护理操作中，不正确的方法是（ ）
A.告诉患者及家属吸氧时禁止吸烟
B.用湿棉签清洁鼻孔
C.插入鼻导管后调节氧流量
D.记录用氧时间
E.告知患者及家属不能随意调节氧流量
- 68.患者，女性，60岁，直肠癌晚期，不正确的心理护理措施是（ ）
A.允许家属陪伴
B.回避患者的攻击性语言
C.让患者表达其愤怒
D.尽可能满足患者的需要
E.对患者否认期的行为进行顺势诱导
- 69.患者，男性，65岁，肝性脑病，目前处于昏迷状态，脉搏细速，呼吸微弱，肌张力丧失，血压下降。患者属于（ ）

- A.濒死期
B.接受期
C.忧郁期
D.临床死亡期
E.生物学死亡期
- 70.患者，女性，62岁，乳腺癌晚期，患者伤心悲哀，急于要求见亲朋好友和交代后事。该患者心理反应属于（ ）
A.接受期
B.忧郁期
C.协议期
D.愤怒期
E.否认期
- 71.患者，男性，70岁，肾衰竭，已进入临终状态。不妥的心理护理是（ ）
A.用亲切的语言安慰患者
B.尽量满足患者最后的愿望
C.允许家人陪伴
D.如实告诉患者病情
E.允许患者自由表达悲哀
- 72.患者，女性，56岁，胃大部切除术后，主诉伤口疼痛，医嘱给予“哌替啶 100mg，im，q6h，prn”。此医嘱属（ ）
A.临时医嘱
B.长期医嘱
C.临时备用医嘱
D.长期备用医嘱
E.指定时间的医嘱
- 73.患者，女性，32岁，医嘱予“地西洋 10mg，po，sos”，此医嘱属（ ）
A.临时医嘱
B.长期医嘱
C.临时备用医嘱
D.长期备用医嘱
E.立即执行医嘱
- 74.患者，男性，35岁，因遭歹徒抢劫致左上肢及胸部多处外伤，患者大量出血、呼吸急促、意识模糊，由同事送至急诊科抢救。急诊科护士在紧急处理中不妥的一项是（ ）
A.询问外伤原因
B.请陪伴者留下
C.安排观察病床，等待医生
D.迅速与公安部门联系
E.记录患者到达的时间
- 75.患者，男性，52岁，胸部外伤后急诊手术后入病区，护士为其准备床单位时正确的方法是（ ）
A.立即将备用床改为暂空床
B.将盖被三折于床尾
C.橡胶单和中单铺于床中部和床头部
D.将输液架置于床头正中
E.将枕头置于床头，开口背门
- 76.患者，男性，43岁，因颅脑外伤急诊入院，患者烦躁不安，面色苍白，四肢厥冷，血压76/46mmHg，脉搏110次/分钟。入院护理的首要步骤是（ ）
A.热情接待，介绍环境和制度
B.询问病史，了解健康问题
C.置休克卧位，测生命体征，建立静脉通道，通知医生
D.准备急救物品，等待值班医生
E.填写各种表格，完成入院护理评估单
- 77.患者，女性，53岁，因多发性子宫肌瘤住院，今上午拟在硬膜外麻醉下行全子宫切除术。术前准备做留置导尿时，护士应指导患者取（ ）
A.半坐卧位
B.头低足高位
C.去枕仰卧位
D.膝胸位
E.屈膝仰卧位
- 78.患者，女性，33岁，在硬膜外麻醉下行全子宫切除术。手术后，患者安返病房，此时应为其安置（ ）
A.头低足高位
B.半坐卧位

- C. 俯卧位
- D. 仰卧位
- E. 中凹卧位

79. 患者，男性，27岁，因发热、右上腹疼痛、巩膜黄染、食欲减退伴恶心呕吐3日就诊，初步诊断为病毒性肝炎，收入传染病区。夏先生病愈出院，护士小张为其做终末消毒处理，不正确的操作是（ ）
- A. 嘱患者沐浴后将换下的衣服带回清洗
 - B. 病室地面用3%含氯石灰液喷洒
 - C. 床及桌椅用0.2%过氧乙酸溶液擦拭
 - D. 被服类消毒后送洗衣房清洗
 - E. 病室用2%过氧乙酸溶液熏蒸
80. 患者，男性，32岁，因肺炎住院，长期使用抗生素治疗。该患者口腔粘膜可能出现（ ）
- A. 白喉杆菌感染
 - B. 链球菌感染
 - C. 真菌感染
 - D. 肺炎球菌感染
 - E. 大肠杆菌感染
81. 患者，男性，70岁，因心力衰竭住院已3周，体质虚弱。近日骶尾部皮肤发红有水泡，床位护士仔细观察后认为是压疮炎性浸润期。患者出现局部症状的主要原因是（ ）
- A. 局部受压过久
 - B. 营养缺乏
 - C. 缺少活动
 - D. 精神紧张
 - E. 心肌缺血
82. 患者，女性，75岁，发热2日。测体温39.7℃，皮肤潮红，脉搏加快，已用药物退热。患者大量出汗，应立刻给予的护理措施是（ ）
- A. 评估出入量
 - B. 擦干汗液，更换衣服
 - C. 测体温
 - D. 写护理记录单
 - E. 降低室温
83. 患者，男性，65岁，脑梗塞，右侧偏瘫。护士为其测量血压时选择左上肢的原因是（ ）
- A. 护士操作便利
 - B. 患者能配合活动
 - C. 右侧肢体循环不良
 - D. 右侧肢体不能配合测量
 - E. 右侧肢体肌张力增高，不能真实反映血压情况
84. 患者，男性，56岁，脑梗塞，左侧偏瘫。因右上肢输液，护士选择下肢测量血压，有关说法错误的是（ ）
- A. 取仰卧位或俯卧位
 - B. 袖带长约135cm，比上肢袖带宽2cm
 - C. 袖带上缘距腘窝3cm~5cm
 - D. 将听诊器胸件贴于腘动脉搏动最明显处
 - E. 测得的血压值比上肢高
85. 患者，女性，45岁，因胃部不适住院，护士为其做生命体征测量，在测量血压过程中，发现血压的搏动音听不清时，应重新测量，错误的方法是（ ）
- A. 将袖带内气体驱尽
 - B. 使汞柱降至“0”点
 - C. 稍等片刻再测第2次
 - D. 一般连测2~3次
 - E. 取其最高值
86. 患者，女性，56岁，因外伤致昏迷，需长期鼻饲。进行鼻饲操作，当胃管插至15cm时，应该（ ）
- A. 使患者的头后仰
 - B. 嘱患者做吞咽动作
 - C. 将患者头部托起，使下颌靠近胸骨柄
 - D. 置患者平卧位，头侧向护士一边
 - E. 加快插管动作，使胃管顺利插入
87. 患者，女性，44岁，明日行胃大部切除术，术前留置胃管，操作结束后，为证实胃管是否正确在胃内，进行检查时，错误的方法是（ ）
- A. 注入少量空气，同时听胃部有无气过水声
 - B. 抽吸出胃液
 - C. 注入少量温开水，同时听胃部有无气过水声

- D.胃管末端放入水杯有无气体逸出
E.抽吸出液体用石蕊试纸测试是否呈红色
- 88.患者，女性，29岁，习惯性便秘，因卵巢肿瘤住院择期手术。对其进行预防便秘知识宣教，不妥的指导是（ ）
- 养成按时排便的习惯
 - 选择膳食纤维丰富的饮食
 - 适当运动
 - 定时使用简易通便法
 - 保持精神愉快
- 89.患者，女性，56岁，下肢静脉曲张术后，术后患者发生了严重便秘，护士给予灌肠护理，记录单上“0/2E”，说明患者是（ ）
- 灌肠后排便 2 次
 - 灌肠前排便 2 次
 - 灌肠 2 次患者不配合
 - 灌肠 2 次未排便
 - 2 次灌肠操作均失败
- 90.患者，女性，43岁，膀胱肿瘤手术，术后留置导尿管。术后第 3 日患者尿液有氨臭味。马女士可能发生的情况是（ ）
- 尿毒症
 - 酮体中毒
 - 膀胱手术部位出血
 - 膀胱炎
 - 膀胱组织坏死
- 91.患者，男性，66岁，车祸撞伤脑部，出血后出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，患者以上表现应属于（ ）
- 濒死期
 - 临床死亡期
 - 生物学死亡期
 - 疾病晚期
 - 脑死亡
- 92.患者，女性，56岁，糖尿病，同时患肺炎球菌性肺炎，住院治疗。医嘱：胰岛素 8U 饭前 30 分钟皮下注射；青霉素 800 万单位静脉滴注，每日 1 次(用 5 日)；咳必清 25mg 口服，每日 3 次。实习护士下述准备执行注射胰岛素医嘱，带教老师应纠正的操作是（ ）
- 于饭前 30 分钟注射
 - 选用 2ml 注射器
 - 注射部位选择上臂三角肌下缘
 - 常规消毒注射处皮肤
 - 针头与皮肤呈 30°角进针
- 93.患者，女性，20岁，因扁桃体化脓性感染，用氨苄西林治疗。皮试结果：皮丘红肿 1.2cm，皮肤痒、胸闷、面色苍白、出冷汗。患者发生此反应的最可能的原因是（ ）
- 皮试液浓度过高
 - 药物过敏反应
 - 机体抵抗力差
 - 药液污染
 - 低血糖
- 94.患者，男性，26岁，因急性胃肠炎，腹泻伴脱水，遵医嘱给予补液治疗。护士在巡视病房时发现输液不滴，注射部位无肿胀，挤压无回血，有阻力。该患者可能发生了何种情况（ ）
- 针头斜面紧贴血管壁
 - 针头堵塞
 - 压力过低
 - 针头滑出血管外
 - 静脉痉挛
- 95.患者，女性，42岁，因肺炎给予红霉素静脉滴注，用药 2 日后注射部位出现沿静脉走行方向条索状红线，伴红、肿、热、痛等症状。下述护理措施错误的一项是（ ）
- 患肢适当抬高
 - 患肢适当活动
 - 50%硫酸镁湿敷
 - 局部超短波理疗
 - 遵医嘱给抗生素治疗
- 96.患者，女性，30岁，因发热咳嗽入院治疗。遵医嘱用 0.9%生理盐水 1000ml 加青霉素 800 万 U 静脉滴注。下述输液护理错误的措施是（ ）
- 加强巡视
 - 注意输液管有无扭曲

- C.观察滴速是否合适
D.溶液不滴立即拔针，更换针头重新穿刺
E.耐心听取患者主诉
- 97.患者，女性，22岁，因急性再生障碍性贫血入院治疗。输血前准备工作中，错误的一项是（ ）
A.血液从血库取出后勿剧烈震荡
B.需由2人进行三查七对
C.血液取出后不能加温
D.输血前先静脉滴入生理盐水
E.需做血型鉴定和交叉配血试验
- 98.患者，男性，35岁，十二指肠溃疡史多年，因饮食不当发生上消化道出血。血压70/50mmHg，脉率130次/分，脉搏细弱，表情淡漠，尿少。遵医嘱输血200ml。在输血100ml时，出现皮肤瘙痒、眼睑水肿、呼吸困难。该患者可能发生的情况是（ ）
A.发热反应
B.过敏反应
C.溶血反应
D.肺水肿
E.枸橼酸钠中毒
- 99.患者，女性，26岁，右侧第二磨牙牙龈红肿，牙痛影响睡眠。最佳的护理指导是（ ）
A.口含冰块
B.口含温开水
C.侧卧位面颊置热水袋
D.侧卧位面颊置冰袋
E.红外线照射
- 100.患者，男性，26岁，支气管扩张，医生需根据痰培养标本结果选择合适的抗生素，采集痰培养标本，不正确的方法是（ ）
A.随时可以采集
B.应用抗生素之前采集
C.采集后加盖立即送检
D.采集时严格执行无菌技术操作
E.标本应放在无菌培养盒内
- 101.患者，女性，76岁，慢性支气管炎急性发作，消瘦，乏力，痰多，不易排出。该患者痰液不易排出的原因可能是（ ）
A.呼吸中枢抑制
B.无力咳嗽排痰
C.会厌功能不全
D.吞咽反射迟钝
E.咳嗽反射消失
- 102.患者，男性，55岁，慢性肺源性心脏病。神志清醒，呼吸困难，口唇发绀明显，氧分压5.5kPa，二氧化碳分压10.3kPa。该患者正确的给氧方法是（ ）
A.间歇给氧
B.低流量低浓度持续给氧
C.高压给氧
D.高浓度间歇给氧
E.低流量间歇给氧
- 103.患者，女性，23岁，口服毒物后被家属发现送医院就诊，毒物性质不明，患者处于昏迷状态。正确的护理措施是（ ）
A.等患者清醒后再洗胃
B.观察后决定是否洗胃
C.问清毒物后再洗胃
D.抽出胃内容物送检，用温水洗胃
E.可采取口服催吐法
- 104.患者，男性，69岁，直肠癌晚期，治疗效果不佳，便血，排便费力，呼吸困难，脉搏细速，腹痛剧烈，患者感到痛苦，悲哀，产生很强的失落感。该患者的心理反应属于（ ）
A.接受期
B.忧郁期
C.协议期
D.愤怒期
E.否认期
- 105.患者，女性，56岁，行乳腺癌根治手术，患者于下午2时回病房，一般情况尚好。医嘱：哌替啶50mg，im，q6h，prn。护士在处理此项医嘱时，不正确的做法是（ ）
A.密切观察病情
B.医生开写在长期医嘱单上
C.间隔6小时必须使用

- D.每次用药的间隔时间是 6 小时
E.每次执行医嘱后在临时医嘱单上记录签全名
- 106.患者，女性，44 岁，多囊卵巢术后第 2 天，患者一般情况较好，护士协助患者取半坐卧位，其主要目的是（ ）
- 减少局部出血
 - 增加回心血量
 - 有利于呼吸
 - 使渗出物局限于盆腔预防感染
 - 减轻腹腔脏器对心、肺的压力
- 107.患者，女性，34 岁，因乙型肝炎，收入传染病区。患者使用过的物品，不正确的消毒方法是（ ）
- 体温表用过氧乙酸浸泡
 - 信件、书报用甲醛熏蒸消毒
 - 排泄物用含氯石灰消毒
 - 餐具、痰杯煮沸消毒
 - 血压计、听诊器微波消毒
- 108.患者，女性，52 岁，颅脑术后收治 ICU 病区，医嘱予床边隔离，隔离衣清洁处应是（ ）
- 衣的肩部
 - 衣的内面和衣领
 - 两侧腰部
 - 腰以下部分
 - 背部
- 109.患者，男性，70 岁，体质虚弱。近日骶尾部皮肤呈紫色，有皮下硬结，并出现水泡，针对患者的表现，不妥的护理措施是（ ）
- 避免局部受潮湿摩擦刺激
 - 每 1~2 小时协助翻身 1 次
 - 在无菌操作下抽出大水疱内液体
 - 创面涂消毒溶液，用无菌敷料包扎
 - 平卧时在颈、腰及腘窝部垫海绵垫
- 110.患者，男性，60 岁，因肺癌晚期疼痛难忍，护士对其采取护理不妥的是（ ）
- 密切观察疼痛的性质、部位、持续时间
 - 帮助患者选择有效的止痛方法
 - 可以选择合适的镇痛药
 - 防止麻醉药成瘾，应帮助患者尽可能忍受疼痛
 - 按 WHO 建议应用三阶梯疗法控制疼痛
- 111.患者，女性，68 岁，车祸后处于昏迷状态，下述护理措施中不妥的做法是（ ）
- 做好口腔护理和皮肤护理，定期漱口
 - 密切观察生命征
 - 头偏向一侧，及时吸出呼吸道分泌物
 - 注意补充营养和水分
 - 闭合眼睑，预防角膜感染与干燥
- 112.患者，女性，28 岁，因使用过量安定由家人送至医院就诊，患者处于昏迷状态。医嘱予洗胃。洗胃时患者正确的体位是（ ）
- 左侧卧位
 - 右侧卧位
 - 平卧头偏向一侧
 - 坐位
 - 半坐位
- 113.患者，女性，58 岁，因心肌炎收治心内科，医嘱予吸氧，经过治疗后病情好转不需给氧治疗，正确的停氧方法首先应（ ）
- 关流量表
 - 关总开关
 - 拔出鼻导管
 - 分离导管接头
 - 取下湿化瓶
- 114.患者，女性，82 岁，冠心病收治入院，因病情变化，医嘱予加大吸氧流量，护士正确的做法是（ ）
- 直接调节流量开关
 - 更换粗鼻导管并加大流量
 - 拔出鼻导管调节流量
 - 开大总开关再调节流量
 - 分离鼻导管再调节流量
- 115.患者，女性，46 岁，因腰椎间盘突出收治入院，医嘱予甘露醇 125ml 静脉滴注 qd，用药 2 日后注

射部位出现沿静脉走行方向条索状红线，伴红、肿、热、痛等症状。预防静脉炎的措施不包括（ ）

- A.严格执行无菌操作
- B.有计划的更换注射部位
- C.防止药液溢出血管外
- D.按照医嘱进行药物滴注
- E.输液前给予激素预防

116.患者，女性，33岁，因腹泻伴脱水收治入院，遵医嘱给予补液治疗。护士在巡视病房时发现注射部位无肿胀，挤压无回血。正确的处理方法是（ ）

- A.抬高输液瓶
- B.另选静脉更换针头重新穿刺
- C.变换肢体位置
- D.湿热敷血管部位
- E.用力挤压输液管直至输液通畅

117.患者，女性，63岁，因外伤致昏迷，需要鼻饲维持营养。护士操作时应注意，每次经胃管灌入的流质量不应超过（ ）

- A.200ml
- B.250ml
- C.300ml
- D.350ml
- E.400ml

118.患者，女性，43岁，因卵巢肿瘤住院手术。术前为其留置导尿管的目的是（ ）

- A.收集尿培养标本
- B.保持术后会阴部清洁干燥
- C.保持膀胱空虚，避免术中损伤
- D.及时排出尿液减轻患者痛苦
- E.减轻手术切口张力，利于愈合

119.患者，女性，23岁，因肺炎需要输注青霉素治疗，皮试过程中出现四肢湿冷，胸闷、气急、面色苍白、出冷汗、护士首选的抢救措施是（ ）

- A.平卧、吸氧、保暖、注射抗过敏药
- B.平卧、吸氧、保暖、地塞米松
- C.平卧、测血压、吸氧、保暖
- D.平卧、吸氧、注射间羟胺
- E.平卧、吸氧、注射盐酸肾上腺素

120.患者，女性，33岁，因哮喘急性发作收治入院，医嘱使用止喘喷雾剂，正确的指导是（ ）

- A.2喷之间的间隔时间至少要30秒钟
- B.第一次喷雾前先深吸气，再喷雾
- C.喷雾管口离口腔至少15cm
- D.用药前不能摇动药瓶
- E.喷雾前必须漱口

121.患者，女性，30岁，因发热咳嗽入院治疗。遵医嘱用0.9%生理盐水1000ml加青霉素800万U静脉滴注，该患者输液的目的是（ ）

- A.补充血容量
- B.控制感染
- C.供给热量
- D.补充水分和电解质
- E.利尿消肿

122.患者，女性，50岁，诊断为肝炎后肝硬化腹水，实验室检查乙肝表面抗原阳性，作为她的责任护士，以下隔离措施错误的是（ ）

- A.必须单人隔离
- B.护理患者时需穿隔离衣和带手套
- C.注意洗手，严防被注射针头等利器刺伤
- D.被污染的室内表面物品，立即用消毒液擦拭或喷洒
- E.陪护人员应采取相应的措施

123.患者，女性，21岁，因再生障碍性贫血入院。根据医嘱此患者须长时间静脉输入抗胸腺细胞球蛋白治疗。依据合理使用静脉的原则，护士在选择血管时应注意（ ）

- A.由近心端到远心端
- B.由远心端到近心端
- C.先粗大后细小
- D.先细直后弯曲
- E.先上后下

124.患者，女性，65岁，患者带有义齿，作为责任护士，以下有关义齿的护理措施不对的是（ ）

- A.将义齿放入有标记的冷水中，以防丢失或损坏
 B.每日换水一次
 C.每餐后都应清洁义齿
 D.每天至少清洁舌头和口腔黏膜一次
 E.义齿每天至少用酒精浸泡消毒一次
- 125.患者，女性，25岁，护士为其测量口温时，要指导患者将口表的水银端放入的部位是（ ）
 A.口腔中部
 B.舌下热窝
 C.舌上 1/3 处
 D.舌上 2/3
 E.舌下 2/3 处
- 126.患者，女性，32岁，以高热3天为主诉入院。入院后，患者体温波动在39~39.9℃之间，脉搏108次/分，呼吸24次/分，意识清楚，口唇干裂，皮肤苍白干燥，畏寒，有时出现寒战。请你判断该患者的发热属于（ ）
 A.超高热
 B.稽留热
 C.弛张热
 D.不规则热
 E.间歇热
- 127.患者，女性，43岁，阑尾术后高热，医嘱予乙醇拭浴，护士在为其进行操作时不恰当的是（ ）
 A.乙醇浓度为45%~55%
 B.温度为32℃
 C.禁忌擦拭胸前区、腹部、后颈、足心部位
 D.擦浴过程不宜超过20min
 E.腋窝、肘窝、手心、腹股沟、腘窝处稍用力擦拭，并延长擦拭时间，以促进散热
- 128.患者，男性，35岁，体温38.2℃，口腔糜烂，疼痛难忍。根据患者的病情，应给予哪种饮食（ ）
 A.软食
 B.半流质饮食
 C.流食
 D.高热量饮食
 E.高蛋白饮食
- 129.患者，男性，43岁，腹胀难忍，医嘱予肛管排气，护士进行肛管排气操作时，肛管插入肛门的长度为（ ）
 A.7~10cm
 B.10~15cm
 C.15~20cm
 D.15~18cm
 E.10~20cm
- 130.患者，女性，23岁，阿米巴痢疾，护士进行保留灌肠采取右侧卧位，的目的是（ ）
 A.减轻药物毒副作用
 B.有利于药物保留
 C.可提高治疗效果
 D.减少对患者的局部刺激
 E.使患者舒适安全
- 131.患者，男性，58岁，患慢性胃溃疡多年。近日感到胃部疼痛，大便颜色发黑。来院检查需做隐血试验。三天内应禁吃（ ）
 A.大米稀饭
 B.面条
 C.牛奶
 D.瘦肉
 E.豆腐
- 132.患者，女性，33岁，因急性腹泻收治入院，以下护理措施错误的是（ ）
 A.高热量、高维生素、多纤维素饮食
 B.注意水电解质的补充
 C.便后软纸轻擦肛门，温水清洗
 D.按医嘱选用止泻药
 E.必要时留取粪便标本送检
- 133.患者，女性，46岁，抽血化验，为防止感染，注射时下列最重要的是（ ）
 A.不在硬结处进针
 B.注射器完整无裂痕
 C.针头无锈无钩锐利

- D.严格查对
E.皮肤消毒直径 5cm 以上
- 134.患者, 男性, 35 岁, 昏迷 5 天, 需鼻饲饮食维持营养需要, 插管前应 ()
- 嘱患者做吞咽动作
 - 使患者头向后仰
 - 使患者头偏向一侧
 - 使患者下颌靠近胸骨柄
 - 嘱患者张嘴哈气
- 135.患者, 男性, 62 岁, 类风湿关节炎收治入院, 在输液过程中主诉肢体冷, 液体滴注缓慢不畅, 护士判断发生静脉痉挛, 应采取何种措施 ()
- 减慢输液速度
 - 适当更换肢体位置
 - 局部热敷
 - 降低输液瓶位置
 - 加压输液
- 136.患者, 男性, 82 岁, 因急性心力衰竭, 抢救中, 护士叮嘱家属保持病室安静, 勿在患者床边大声喧哗, 因为濒死患者最后消失的感觉是 ()
- 视觉
 - 听觉
 - 嗅觉
 - 味觉
 - 触觉
- 137.患者, 男性, 62 岁, 脑梗塞后言语不利, 本次因发热入院治疗, 护士为其做在护理评估的过程中, 资料最主要的来源是 ()
- 其他的护士
 - 和患者有重要关系的人
 - 患者个人的医疗文件
 - 医生
 - 参考资料
- 138.患者, 女性, 46 岁, 半年前丈夫因病去世, 患者主诉入睡困难, 难以维持睡眠, 睡眠质量差, 这种情况已经持续三个月, 并出现头晕目眩、心悸气短、体倦乏力、以躁易怒、注意力不集中、健忘等症状, 患者失眠的主要原因是 ()
- 躯体因素
 - 环境因素
 - 药物因素
 - 疾病因素
 - 精神因素
- 139.患者, 女性, 32 岁, 因怀孕待产入院, 主诉病房温度太冷, 要将空调调到 30℃, 此时护士应告知患者病房最适宜的温度和相对湿度为 ()
- 14 ~ 15℃, 15% ~ 25%
 - 10 ~ 17℃, 30% ~ 40%
 - 20 ~ 22℃, 40% ~ 50%
 - 18 ~ 22℃, 50% ~ 60%
 - 15 ~ 16℃, 60% ~ 70%
- 140.患者, 女性, 38 岁, 护士为其进行晨间护理, 不符合铺床节力原则的是 ()
- 将用物备齐
 - 按使用顺序放置物品
 - 铺床时身体靠近床沿
 - 先铺远侧, 后铺近侧
 - 下肢前后分开, 降低重心
- 141.患者, 男性, 44 岁, 外伤后腰椎骨折, 医嘱予摄片检查, 此患者需用何种方法搬运 ()
- 一人法
 - 二人法
 - 三人法
 - 四人法
 - 挪动法
- 142.患者, 男性, 24 岁, 因脚踝骨折住院, 医嘱予轮椅送检验科摄片检查, 关于轮椅运送法叙述错误的是 ()
- 接患者时椅背与床尾平齐
 - 闸应制动
 - 护士站在轮椅一侧
 - 患者应抬头后靠
 - 身体不平衡者, 可系安全带

- 143.患者, 男性, 64 岁, 病情好转, 医嘱予明日出院, 关于出院护理叙述错误的是 ()
- 协助办理出院手续
 - 停止一切注射, 但可继续发给口服药
 - 介绍出院的注意事项
 - 征求患者意见
 - 热情护送出院
- 144.患者, 男性, 54 岁, 外伤后休克收治入院, 医嘱予中凹卧位, 护士协助患者采取中凹卧位时, 应给予 ()
- 头胸抬高 $10 \sim 20^\circ$, 下肢抬高 $20 \sim 30^\circ$
 - 头胸抬高 $20 \sim 30^\circ$, 下肢抬高 $20 \sim 30^\circ$
 - 头胸抬高 $30 \sim 40^\circ$, 下肢抬高 $40 \sim 50^\circ$
 - 头胸抬高 $40 \sim 50^\circ$, 下肢抬高 $20 \sim 30^\circ$
 - 头胸抬高 $50 \sim 60^\circ$, 下肢抬高 $20 \sim 30^\circ$
- 145.患者, 男性, 34 岁, 甲状腺瘤切除术后第一天, 医嘱予取半卧位, 其目的主要是 ()
- 预防颅内压降低
 - 减轻局部出血
 - 减轻疼痛
 - 减轻呼吸困难
 - 减少静脉回心血量
- 146.患者, 男性, 66 岁, 车祸导致截瘫, 为预防压疮, 减少对组织压力, 下列措施不正确的是 ()
- 每 2 小时翻身一次
 - 必要时 30min 翻身一次
 - 垫橡胶气圈
 - 受压部位垫海绵垫
 - 必要时床尾可用支被架
- ? 147.患者, 女性, 36 岁, 病毒性肝炎收治感染科, 以下隔离措施正确的是 ()
- 每名患者都应施行单间隔离
 - 废弃的血标本应及时倒入水池内冲刷掉
 - 被患者血液污染的针头应及时送回处置室内进行消毒
 - 必要时戴手套采血
 - 血液若溅出应立即用无菌纱布擦拭掉
- 148.患者, 女性, 42 岁, 昏迷, 护士遵医嘱给予口腔护理, 护士为患者进行口腔护理措施不正确的是 ()
- 让患者平卧、头偏向一边
 - 用张口器从门齿处放入, 不可施暴力助其张口
 - 先将假牙取下, 浸于清水中保存
 - 用血管钳夹紧棉球, 每次夹 1 个, 防止棉球遗留口腔内
 - 棉球蘸水不可过湿, 禁忌漱口以免呛咳或引起吸入性肺炎
- 149.患者, 男性, 68 岁, 3 周前因脑梗塞导致左侧肢体瘫痪, 大小便失禁。晨间护理时发现其骶尾部皮肤呈紫红色, 有大小不等的水泡, 皮下可触及硬结, 以下护理措施和描述不正确的是 ()
- 压疮分期属于炎性浸润期
 - 防止局部再度受压, 避免摩擦、潮湿和排泄物的刺激, 改善局部血液循环
 - 加强营养的摄入以增强机体抵抗力
 - 大水泡要减少摩擦, 防止破裂感染, 让其自行吸收
 - 小水泡要减少摩擦, 防止破裂感染, 让其自行吸收
- 150.患者, 男性, 38 岁, 右上肢骨折, 护士在患者脱、穿衣服的正确方法是 ()
- 先脱右肢, 先穿右肢
 - 先脱右肢, 先穿左肢
 - 先脱左肢, 先穿左肢
 - 先脱左肢, 先穿右肢
 - 以上都不是
- 151.患者, 男性, 63 岁, 左侧胫骨骨折, 夹板固定中, 为预防其发生压疮, 下列错误的方法是 ()
- 鼓励患者常翻身
 - 每日翻身 4 次
 - 翻身时避免拖、拉、推动作
 - 骨骼空隙处可垫软枕
 - 适当调节夹板的松紧度
- 152.患者, 男性, 32 岁, 6 天前右手被铁丝划伤, 未经处理, 近日出现遇光及听到声响后牙关紧闭, 角弓反张等症状, 诊断为破伤风。对该患者的护理正确的是 ()
- 白天拉开窗帘, 保持病室光线充足
 - 做治疗查对床号姓名时应大声呼唤

- C.减少出入该病房人员次数
D.使用约束带防止角弓反张
E.用过的敷料先清洗后灭菌
- 153.患者，女性，43岁，测口温时不慎咬破体温计的处理，护士采取一下处理方式，哪种不合适（ ）
A.口服大量水延缓汞的吸收
B.立即清除玻璃碎屑以免损伤唇、舌、口腔、食管和胃肠道粘膜
C.可口服牛奶以延缓汞的吸收
D.若病情允许，可服用粗纤维食物，以促进汞的排出
E.可口服蛋清以延缓汞的吸收
- 154.患者，男性，29岁，发热4天，体温持续在39.0℃至40.4℃，以“发热待查”于上午9时入院。查体：体温40.1℃，脉搏114次/分钟，呼吸28次/分钟，血压120/80mmHg，神智清楚，面色潮红，口唇干裂，食欲差。以下哪项护理措施不妥（ ）
A.降低体温：冰袋冷敷头部，温水或乙醇拭浴；遵医嘱给予降温药物，注意药物剂量。
B.病情观察：定时测体温，1次/4h。同时观察呼吸、脉搏、血压及出汗情况
C.维持水、电解质平衡：多喝水，每日不少于2500~3000ml；遵医嘱静脉输液以补充水分
D.补充营养：给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化的流质或半流质饮食
E.休息：加强体育锻炼，提供安静、空气流通、温湿度适宜的环境
- 155.患者，女性，46岁，子宫肌瘤切除术后出现尿潴留，在诱导排尿无效时，医嘱予留置导尿，在以下注意事项中，不正确的是（ ）
A.用物必须严格灭菌，并按无菌操作进行，预防尿路感染
B.保护患者自尊，耐心解释，操作环境要遮挡
C.选择光滑和粗细适宜的导尿管，插管时动作要轻柔避免损伤尿道粘膜
D.如果导尿管误入阴道，应拔出重新插入
E.对膀胱高度膨胀且又极度虚弱的患者，第一次放尿不应超过1000ml
- 156.患者，女性，79岁，昏迷患者，留置导尿管中，防止此类患者尿路感染的护理要点不包括（ ）
A.保持尿道口清洁，用苯扎溴铵棉球擦洗外阴及尿道口，每日1~2次
B.如分泌物过多可先用0.02%高锰酸钾溶液清洗再用苯扎溴铵棉球擦拭
C.每日定时更换集尿袋，及时倾倒
D.集尿袋及引流管位置应低于耻骨联合，防止尿液返流
E.每天更换导尿管1次
- 157.患者，女性，29岁，在5min前做青霉素皮试（以前未使用过此类药物），现突然感到胸闷、气促，患者面色苍白，出冷汗，血压75/52mmHg，脉搏细速，神智清楚，护士可以不在医生指导下自主采取的措施不包括（ ）
A.立即停药，进行抢救
B.报告医生，患者平卧，注意保暖
C.立即皮下注射0.1%盐酸肾上腺素2ml，如症状不缓解，可每隔30分钟再皮下或静脉注射0.5ml，直至脱离危险期
D.改善缺氧症状给予氧气吸入
E.密切观察患者的意识，生命征，尿量及其他临床变化，并做好记录
- 158.患儿，女性，13个月龄，为其进行静脉输液，常选的静脉不包括（ ）
A.颞浅静脉
B.额静脉
C.耳后静脉
D.枕静脉
E.手背静脉
- 159.患者，男性，32岁，因大量呕血急诊入院。初步诊断：胃溃疡，失血性休克。护理体检：血压70/50mmHg，心率130次/分，脉搏细弱，面色苍白，出冷汗，表情淡漠。遵医嘱需立即输血400ml。当输血300ml时，患者出现皮肤瘙痒，眼睑、口唇水肿，呼吸困难等症状。以下处理措施不正确的是（ ）
A.停止输血，保留静脉通路
B.给予氧气吸入
C.喉头水肿时配合医生进行气管切开术
D.余血丢弃至污物桶
E.遵医嘱皮下注射0.1%盐酸肾上腺素0.5ml、抗过敏药物、激素等
- 160.患者，男性，44岁，盆腔炎静脉输液治疗后三天，从静脉注射部位沿静脉走向出现条索状红线及红、肿、热、痛等症状时宜（ ）
A.患肢增加活动
B.患肢抬高并用硫酸镁热敷
C.局部用生理盐水热敷
D.局部用70%乙醇热敷
E.患肢下垂并用硫酸镁热敷
- 161.患者，男性，16岁，急性扁桃体炎，颜面潮红，皮肤灼热，体温39.7℃，脉搏102次/分，呼吸24次

/分，意识清醒。医嘱予温水拭浴，实施中应注意事项不包括（ ）

- A.以拍拭方式进行，在拍拭腋窝、腹股沟、腘窝等血管丰富处适当延长时间，以利散热
- B.水温应接近体温，避免过冷刺激使大脑皮质更加兴奋，促使横纹肌收缩，使体温继续上升
- C.禁拭后颈、心前区、腹部和足底等处，以免引起不良反应
- D.拭浴过程中随时观察患者情况，如出现寒战、面色苍白、脉搏呼吸异常，应立即停止拭浴及时与医生联系
- E.拭浴后 60 分钟测体温并记录

162.患者，女性，65 岁，为明确诊断，需采集血标本查血糖、肝功能和做血培养，采集标本不正确的是（ ）

- A.血培养使用血培养瓶
- B.血糖需要干燥试管、肝功能需要抗凝管
- C.做生化检验，应事先通知患者在空腹时采集标本
- D.同时抽取几个项目的血标本，应先注入血培养瓶，其次注入抗凝瓶，最后注入干燥试管，动作需迅速准确
- E.不可以在输液、输血的针头处采集血标本

163.患者，男性，36 岁，因车祸头部重创急诊入院。体温 38.5℃，脉搏 100 次/分，呼吸 22 次/分，血压 160/100mmHg，神志模糊，时有躁动，有痰鸣音，大小便失禁。以下有关患者护理措施不正确的是（ ）

- A.使患者头正中位，及时吸痰与清理呕吐物
- B.枕头横立于床头，必要时可用保护具，取下假牙，必要时用拉舌钳，张口器
- C.加强眼的保护，经常用湿棉球擦拭眼分泌物，若眼睑不能闭合，可涂金霉素眼膏或盖凡士林纱布
- D.做好口腔和皮肤护理，防止口腔和皮肤发生感染
- E.帮助患者进食，若不能经口进食，可给予鼻饲或静脉高营养支持；按医嘱补充水分

164.患者，男性，24 岁，患急性阑尾炎，行阑尾切除术术后第二天，患者应采取什么体位（ ）

- A.半坐卧位
- B.俯卧位
- C.左侧卧位
- D.右侧卧位
- E.中凹卧位

165.患者，男性，75 岁，因慢性阻塞性肺气肿住院治疗。当日上午 9 时起开始静脉输入 5% 葡萄糖溶液 500ml，滴速为 70 滴/分，10 时左右，当护士来巡房时，发现患者咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，呼吸急促，大汗淋漓。以下有关说法不正确的是（ ）

- A.据患者的临床表现，此患者可能出现了急性肺水肿
- B.护士应立即调慢输液速度，并通知医生，进行紧急处理
- C.病情允许可使患者端坐，双腿下垂，必要时进行四肢轮扎
- D.给与高流量的氧气吸入，氧流量 6~8 升/分钟
- E.遵医嘱给予镇静剂

166.患者，女性，27 岁，阑尾炎术后第 5 天，体温 36.8℃，刀口无渗血渗液。当日上午 9 时许，继续静脉点滴青霉素，30 分钟后，患者突然寒战，继之高热，体温 40℃，并伴有头痛，恶心，呕吐，以下有关说法不正确的是（ ）

- A.根据上述表现，判断此患者可能发热反应
- B.上述反应产生的主要原因可能是输入致热物质引起
- C.输液前认真检查药液质量，输液器包装及灭菌日期、有效期，严格无菌技术操作
- D.反应轻者，可减慢点滴速度或停止输液，通知医生，同时注意体温的变化
- E.反应严重者，可减慢点滴速度或停止输液，并保留剩余溶液和输液器进行检测，查找反应原因

167.患者，男性，65 岁，因病情需要行加压静脉输液。当护士去治疗室取物品回到患者床前时，发现患者呼吸困难，有严重紫绀。患者自述胸闷，胸骨后疼痛，眩晕，护士立即给患者测量血压，其值为 79/50mmHg。以下有关说法不正确的是（ ）

- A.此患者可能出现了空气栓塞
- B.护士应立即协助患者取左侧卧位并头低脚高位
- C.加压输液必须有护士在旁
- D.输液完毕及时拔针
- E.护士应立即协助患者取右侧卧位并头低脚高位

168.患者，男性，39 岁，因车祸内脏大出血而欲行急诊手术治疗。去手术室之前，护士遵医嘱迅速为患者建立静脉通道并进行输血治疗，因时间紧迫，护士从血库取回血后，为了尽早将血输给患者，便将血袋放在热水中提温，5 分钟后为患者输入。当输入 10 分钟后，患者感到头部胀痛，并出现恶心呕吐，腰背部剧痛。以下有关说法不正确的是（ ）

- A.此患者最可能出现了溶血反应
- B.此反应发生的最可能的原因是输血速度过快
- C.停止输血并通知医生
- D.保留余血，采集患者血标本重做血型鉴定和交叉配血试验
- E.维持静脉输液通道，静脉注射碳酸氢钠碱化药液，局部封闭，热水袋敷双侧肾区

- 169.患者，男性，28岁，因足底外伤，继而发热、惊厥、牙关紧闭呈苦笑面容如愿，诊断为破伤风，该患者换下来的敷料应（ ）
- 先清洗后消毒
 - 先灭菌后清洗
 - 先清洗后曝晒
 - 焚烧
 - 浸泡消毒
- 170.患者，男性，46岁，甲状腺功能亢进，手术治疗后，采取半坐卧位的主要目的是（ ）
- 减轻局部出血
 - 预防感染
 - 避免疼痛
 - 有利伤口愈合
 - 改善呼吸困难
- 171.患者，男性，62岁，肝癌晚期，入院后患者精神恍惚，躁动。正确的安全措施是（ ）
- 持续胃肠减压
 - 加床栏，上约束带
 - 给予安定镇静
 - 纱布包裹压舌板，放于上、下臼齿之间
 - 使用支被架
- 172.患者，男性，42岁，主诉腹胀、腹痛，三天未排便，触诊腹部较硬实且紧张，可触及包块，肛诊可触及粪块，现遵医嘱给予灌肠，应选择哪种灌肠法（ ）
- 小量不保留灌肠
 - 小量保留灌肠
 - 清洁灌肠
 - 大量不保留灌肠
 - 保留灌肠
- 173.患者，男性，32岁，近日感觉疲乏无力，纳差，有时恶心。前来就诊，医嘱查谷丙转氨酶，你应何时采集血标本（ ）
- 晨空腹时
 - 饭前
 - 饭后
 - 即刻
 - 睡前
- 174.患者，男性，65岁，胃癌，行胃大部切除术，术中生命体征正常，回病房，护理人员应为该患者准备（ ）
- 麻醉床
 - 备用床
 - 加铺橡胶单的备用床
 - 暂空床
 - 加铺橡胶单的暂空床
- 175.患者，男性，35岁，白血病患者，护士小李发现患者舌尖部有小块血痂，口腔护理方法中错误的是（ ）
- 观察口腔粘膜和舌苔的变化
 - 过氧化氢溶液漱口
 - 轻轻擦拭牙齿、舌、口腔的各面
 - 将舌尖部的血痂擦去，涂上龙胆紫
 - 注意小块血痂的变化，并及时反馈给医生
- 176.患者，男性，77岁，因脑梗塞右侧肢体瘫痪，为预防压疮的发生，最好的护理方法是（ ）
- 每2小时翻身一次
 - 每天观察皮肤是否有破损
 - 用气圈
 - 保持左侧卧位
 - 增加营养
- 177.患者，男性，40岁，交通事故致复合创伤后1小时入院。患者呼吸呈由浅慢逐渐加深加快，又由深快逐渐变为浅慢，继之暂停30秒后再度出现上述状态的呼吸。该患者的呼吸是（ ）
- 间断呼吸
 - 潮式呼吸
 - 毕奥呼吸
 - 鼾声呼吸
 - 叹气样呼吸
- 178.患者，男性，47岁，高血压病，左侧肢体偏瘫，医嘱测血压4次/日，下列哪项不妥

- ()
- A.固定血压计
 - B.测右上肢血压
 - C.仰卧位测量，使肱动脉平腋中线
 - D.必须固定专人测量
 - E.进食后安静休息 30 分钟后再测
- 179.患者，男性，60 岁，因高血压在内科治疗两周，今晨起上厕所不慎滑倒造成颈椎骨折，即转至骨科治疗，搬运时应注意 ()
- A. 头部处于中立位
 - B. 头偏向一侧
 - C.护士站在患者脚侧
 - D. 上下坡时患者的头部在低处
 - E. 使用三人搬运法
- 180.患儿，女性，5 岁，不慎被烧伤，入院后经评估需使用保护具，以下措施错误的是 ()
- A.使用前要取得患者及家属的理解，作好心理护理
 - B.保护性制动只是短期使用
 - C.将患者的双上肢外展固定于身体两侧
 - D.约束带下应放衬垫，松紧适宜
 - E.注意观察受约束部位的皮肤和血液循环
- 181.患者，女性，46 岁，糖尿病，护士在为患者进行口腔护理时，闻到口腔内有一种烂苹果味，可能提示有 ()
- A.尿毒症
 - B.高热
 - C.酮症酸中毒
 - D.肝昏迷
 - E.感染
- 182.患者，男性，45 岁，因需长时间输液，则护士要注意保护合理使用血管，应首先选用 ()
- A.头静脉
 - B.贵要静脉
 - C.肘正中静脉
 - D.前臂静脉
 - E.手背静脉
- 183.患者，女性，32 岁，不慎割破手指，医嘱 TAT 肌肉注射，立刻执行。患者行 TAT 过敏试验，结果阳性，正确的做法是()
- A.禁用 TAT 注射
 - B.备好抢救物品，直接注射 TAT
 - C.注射肾上腺素等药物抗过敏
 - D.采用脱敏疗法注射 TAT
 - E.再做过敏试验并用生理盐水做对照试验
- 184.患者，男性，64 岁，患糖尿病 10 年，常规胰岛素 6U 餐前 30 分钟用药，最常用的注射部位是()
- A.腹部脐周
 - B.前臂外侧
 - C.股外侧肌
 - D.臀中肌
 - E.臀大肌
- 185.患者，男性，78 岁，因上呼吸道感染诱发慢性阻塞性肺病急性发作，入院后给予抗感染、平喘、祛痰治疗，输液总量为 800ml，计划 5 小时输完，输液器点滴系数为 15，每分钟滴数为()
- A.30 滴
 - B.35 滴
 - C.40 滴
 - D.45 滴
 - E.50 滴
- 186.患者，女性，28 岁，近日晨起呕吐，月经停止，疑为早孕，为确诊需采集尿标本，留取标本时间宜为()
- A.饭前
 - B.饭后 2h
 - C.即刻
 - D.睡前
 - E.晨起
- 187.患者，男性，46 岁，因交通意外致多器官功能损伤，经抢救无效，宣布死亡，其最早出现的尸体现象是()
- A.尸冷

- B.尸斑
- C.尸僵
- D.尸体腐烂
- E.尸绿

188.患者，男性，28岁，因脊柱外伤入院，今晨出现大便失禁，护士需将此内容用符号形式记录在体温单上，表示便失禁的符号是()

- A.“○”
- B.“×”
- C.“•”
- D.“E”
- E.“※”

189.患者，男性，26岁，因急性胰腺炎伴意识模糊患者入住ICU，其特护记录单记录的内容不包括()

- A. 护理措施
- B. 生命体征
- C. 出入液量
- D. 神志、瞳孔
- E. 患者社会关系

190.患者，女性，32岁，因糖尿病需皮下注射胰岛素4U，护士为此患者进行皮下注射时的进针角度为()

- A.0°~5°
- B.30°~40°
- C.45°
- D.60°
- E.90°

191.患者，女性，52岁，门诊以“肺结核”收治入院，医嘱链霉素0.75g肌内注射，每日1次，链霉素已做皮试结果为阴性。护士在为此患者选择右侧臀大肌肌肉注射，此时应指导协助患者摆放的正确姿势是()

- A. 下腿伸直上腿弯曲
- B. 上腿伸直下腿稍弯曲
- C. 两腿伸直
- D. 两腿弯曲
- E. 双膝向腹部弯曲

192.患者，女性，52岁，护士小李在为某患者进行静脉输液时，发现茂菲滴管内的液面自行下降，原因是()

- A. 输液瓶挂得太高
- B. 输液速度过快
- C. 环境温度太低
- D. 患者肢体摆放不当
- E. 滴管或滴管以下导管有漏气

193.患者，男性，24岁，近日因扁桃体化脓急诊入院治疗，T 39.6℃。该患者的体温单上不记录()

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 神志

194.患者，男性，46岁，已10余小时未排尿，腹胀，确定为非尿路阻塞引起的尿满留，用温水冲洗会阴的目的是()

- A. 分散注意力，减轻紧张心理
- B. 利用条件反射促进排尿
- C. 清洁会阴防止尿路感染
- D. 利用温热作用预防感染
- E. 使患者感觉舒适

195.患者，男性，52岁，肝昏迷，为患者灌肠时不宜选用肥皂水，其原因是()

- A. 防止发生腹胀
- B. 防止发生酸中毒
- C. 防止对肠黏膜的刺激
- D. 减少氨的产生与吸收
- E. 避免引起腹泻

196.患者，男性，36岁，非常怕痛，护士在为其作肌肉注射时实行的无痛注射原则错误的()

- A. 取舒适卧位，使肌肉松弛
- B. 进针、拔针快，推药液慢

- C.对刺激性强的药物，进针不可太深
D.推药速度要均匀
E.先注射刺激性弱，再注射刺激性强的药物
- 197.患者，男性，45岁，出差当晚腹泻多次，粪便呈果酱样，入院检查初诊为阿米巴痢疾，医嘱用灭滴灵灌肠治疗。护理措施正确的是（ ）
- A.灌肠前臀部抬高 20cm
B.液面与肛门有距离 40cm ~ 60cm
C.灌肠时患者取右侧卧位
D.灌入药液量应少于 500ml
E.灌入后保留 30 分钟
- 198.患者，男性，14岁，中毒性肺炎，休克，经抢救病情稳定，为维持血压，医嘱 10%葡萄糖 400ml 加多巴胺 20mg，20 滴/min，请计算液体可维持多长时间（输液器点滴系数为 15）（ ）
- A.2 小时
B.3 小时
C.4 小时
D.5 小时
E.6 小时
- 199.患者，女性，33岁，因宫外孕破裂大出血入院。体检面色苍白，脉搏 140 次/分，血压 60/40mmHg，该患者输血的目的是（ ）
- A.补充血容量
B.增加血红蛋白
C.补充凝血因子
D.增加清蛋白
E.增加营养
- 200.患者，女性，30岁，高热 39℃，医嘱予以冰袋物理降温。冰袋正确放置的位置是（ ）
- A.枕后
B.足底
C.颈前颌下
D.前额
E.颞部
- 201.患者，男性，30岁，因受到领导批评后感到压抑，便服用敌敌畏，后被家人及时发现，送医院诊治。反映病情变化的最主要观察的指征是（ ）
- A.表情
B.面容
C.瞳孔
D.呕吐物
E.皮肤与黏膜
- 202.患者，男性，46岁，昏迷，护士为其采取去枕仰卧位，头偏向一侧，其目的是（ ）
- A.利于护士对其进行护理操作
B.预防枕骨处压疮的发生
C.引流分泌物，保持呼吸道通畅
D.保持颈部活动灵活
E.便于头部固定，避免颈椎骨折
- 203.患者，女性，65岁，主诉心悸，某护士为其测量脉搏并在体温单上记录。请问下列记录方法正确的为（ ）
- A.用红●表示
B.以红○表示
C.脉搏短绌时，心率以红●表示
D.相邻心率用红虚线相连
E.脉搏与体温重叠时，先画脉搏再画体温
- 204.患者，女性，46岁，新入院，责任护士评估完患者后开始记录相关的护理记录。请问下列哪个不是体温单底栏的填写内容（ ）
- A.大便次数
B.体重
C.血压
D.手术天数
E.出入液量
- 205.患者，男性，54岁，因头痛头晕，恶心呕吐被收入院。入院后医生为其开医嘱。但是护士在执行该患者的医嘱时发现医嘱的内容不清楚，护士应该（ ）
- A.拒绝执行
B.询问护士长后执行
C.与同班护士商量后执行
D.凭自己经验执行

- E.问过医生后再执行
- 206.患者，男性，29岁，初步诊断为阿米巴痢疾收入院，医嘱：留取粪便做阿米巴原虫检查。护士为患者准备的标本容器是（ ）
- 无菌容器
 - 清洁容器
 - 干燥容器
 - 装有培养基的容器
 - 加温的清洁容器
- 207.患者，女性，38岁，高热，T 40℃，护士根据医嘱给予乙醇拭浴。在操作过程中，护士将冰袋置于头部，而热水袋置于足底。在操作过程中足底忌用冷疗是防止（ ）
- 一过性冠状动脉收缩
 - 末梢循环障碍
 - 局部组织坏死
 - 体温骤降
 - 心律异常
- 208.患者，男性，75岁，因脑梗塞收治入院，患者神志清，精神可，左侧肢体麻木，护士应给予的防跌倒、坠床措施中，不恰当的是（ ）
- 日常用品摆放在患者容易获取处
 - 给予约束带约束
 - 给予床栏保护
 - 告知需家属或护工陪护
 - 告知患者及家属存在风险及注意事项
- 209.患者，男性，58岁，肝癌晚期入院，患者出现烦躁不安、躁动，为保证患者安全，最重要的护理措施是（ ）
- 减少家属探视
 - 加床档，用约束带保护患者
 - 室内光线宜暗
 - 护理动作轻柔
 - 减少外界刺激
- 210.护士小张，为一垂危患者测量呼吸时，因其呼吸微弱，不易观察，此时小张应采取何种方法观察（ ）
- 耳朵贴近患者口鼻处，听其呼吸声音
 - 手按胸腹部，观察其起伏次数
 - 测脉率除以4为呼吸次数
 - 用少许棉花置患者鼻孔前，观察棉花飘动次数
 - 测量30秒测的数值乘以2
- 211.患者，男性，56岁，新入院，护士小万为患者测量脉搏后，测呼吸时其手仍置于患者桡动脉部位是为了（ ）
- 便于看表计时
 - 表示对患者的安抚
 - 转移患者的注意力
 - 测脉搏，计呼吸节律
 - 感知脉搏强弱
- 212.护士小王，乐观开朗、情绪稳定，胸怀宽容豁达，具有高度的责任心和同情心，小王表现出的属于对护士哪方面素质的要求（ ）
- 思想素质
 - 文化素质
 - 专业素质
 - 心理素质
 - 体态素质
- 213.患者，女性，70岁。肾衰竭，已进入临终状态。不妥的心理护理是（ ）
- 用亲切的语言体贴患者
 - 尽量满足患者最后的愿望
 - 允许家人陪伴
 - 如实告诉患者病情
 - 允许患者自由表达悲哀
- 214.8个月男婴，在社区准备接种麻疹疫苗。护士在为其消毒时，应采用的消毒剂是（ ）
- 2%碘酊
 - 0.5%碘伏
 - 0.9%生理盐水
 - 75%乙醇
 - 90%乙醇
- 215.护士小张，在给患者测体温时不小心将水银体温计摔碎在病房水泥地面上，小张的下列

紧急处理措施错误的是 ()

- A. 将患者转移到室外
- B. 开窗通风
- C. 打开室内所有热源, 促进汞的快速消散
- D. 处理地面汞滴时应穿戴防护用品
- E. 如果有皮肤接触, 立即用水冲洗

216. 患者, 男性, 74 岁, 因左心衰竭入院治疗, 入院当日, 患者极度呼吸困难, 此时应给与患者何种体位 ()

- A. 俯卧位
- B. 端坐位
- C. 半坐卧位
- D. 头高足低位
- E. 膝胸位

217. 患者, 男性, 56 岁, 因“急性肾炎”收治入院, 该患者饮食中禁忌食用的是 ()

- A. 芹菜
- B. 米饭
- C. 苹果
- D. 海带
- E. 豆腐

218. 患者, 女性, 74 岁, 因“充血性心力衰竭”收治入院, 则下列护理措施中错误的是 ()

- A. 患者呼吸困难时, 可给予端坐卧位
- B. 患者排便困难时, 可遵医嘱给与 0.9% 的氯化钠溶液灌肠
- C. 保持病室安静, 让患者充分休息
- D. 进行各项治疗时, 注意保护患者隐私
- E. 加强皮肤护理, 预防压疮

219. 患者, 男性, 39 岁, 因颈椎骨折行颅骨牵引, 应采取的卧位是 ()

- A. 半坐卧位
- B. 端坐位
- C. 头低足高位
- D. 头高足低位
- E. 仰卧位

220. 患者, 男性, 50 岁, 农民。田间劳动时突感腹痛难忍, 拒按, 立即就诊。不妥的处理方法是 ()

- A. 立即通知医生
- B. 了解病史
- C. 观察生命体征
- D. 安慰患者
- E. 腹部置热水袋止痛

221. 患者, 女性, 23 岁, 肺炎球菌肺炎, 口腔温度 40°C, 脉搏 120 次/分, 口唇干燥, 下列护理措施不妥的是 ()

- A. 卧床休息
- B. 鼓励喝水
- C. 测体温每 4 小时 1 次
- D. 冰袋放于头顶、足底
- E. 每日口腔护理 2~3 次

222. 患者, 男性, 35 岁, 诊断为慢性乙型肝炎, 护士使用过氧乙酸进行患者用物的消毒处理, 使用过氧乙酸的注意事项错误的是 ()

- A. 对金属有腐蚀性
- B. 对织物有漂白作用
- C. 遇热和光照可氧化分解
- D. 高热和光照可引起爆炸
- E. 使用前应尽早配置

223. 患者, 男性, 72 岁, 肝性脑病昏迷给予呼吸机辅助呼吸, 近一周患者高热并发肺部感染, 给予大量抗生素治疗。今晨护士为其行口腔护理时发现其口腔黏膜破溃, 创面上附着白色膜状物, 拭去附着物可见创面轻微出血。护士分析引起患者口腔病变最可能的原因是 ()

- A. 病毒感染
- B. 真菌感染
- C. 缺乏食物刺激
- D. 凝血功能障碍
- E. 大肠杆菌感染

224. 在工作中, 一位护士下班交班时发现, 漏了上午某个患者的一份口服药, 药物包括降压药、维生素 C 等, 护士首先应采取的措施是 ()

- A. 汇报护士长

- B.补发药物即可
 - C.向患者道歉
 - D.向患者解释
 - E.寻求医生帮助
- 225.患者，男性，30岁。患 H1N1 型流感，为患者采集咽拭子标本的时间可安排在餐前 1 小时，其原因是（ ）
- A.减轻疼痛
 - B.防止呕吐
 - C.防止污染
 - D.减少口腔细菌
 - E.保持细菌活力
- 226.属于临时备用医嘱的为（ ）
- A.二级护理
 - B.头低脚高位
 - C.二便常规
 - D.地西洋 5mg 口服 sos
 - E.禁食
- 227.护士检查某患者排出的尿液含有烂苹果味，该患者很可能患有（ ）
- A.膀胱炎
 - B.尿道炎
 - C.前列腺炎
 - D.急性肾炎
 - E.糖尿病酸中毒
- 228.患者，男性，35岁，体温 40℃，口腔糜烂，疼痛难忍，根据病情，你应给予哪种饮食（ ）
- A.软食
 - B.半流质饮食
 - C.流质饮食
 - D.高热量饮食
 - E.高蛋白饮食
- 229.患者，男性，53岁，服用地高辛几天后，出现恶心、呕吐、视物模糊，护士应立即（ ）
- A.报告护士长
 - B.给予止吐药甲氧氯普胺
 - C.做心电图检查
 - D.做好患者心理护理
 - E.停止服药并报告医生
- 230.患者，女性，68岁，患大叶性肺炎，高热昏迷，需 24h 连续输液，护士应多长时间更换一次输液器（ ）
- A.8h
 - B.12h
 - C.24h
 - D.48h
 - E.72h
- 231.护理小李在处理锐利器械时不正确的方法是（ ）
- A.利器用后放在黄色塑料袋内
 - B.利器用后放在防水耐刺的容器内
 - C.针头不复帽
 - D.利器原则上不复用
 - E.不用手去折断针头
- 232.不利于患者抓住交谈主题的是（ ）
- A.事先了解患者资料
 - B.准备交谈提纲
 - C.从主诉开始引导话题
 - D.解释患者的提问
 - E.随意提出新话题
- 233.患者，男性，64岁，因“发热待查”收入院，护士在收集患者资料时，属于主观资料的是（ ）
- A.T 39.5℃
 - B.黄疸
 - C.发绀
 - D.心脏杂音
 - E.乏力
- 234.在标准预防中当成具有传染性进行隔离预防的不包括（ ）

- A.血液
- B.体液
- C.汗液
- D.分泌物
- E.排泄物

235.患者，女性，50岁，因胃癌收住院，为了使住院患者尽快适应医院环境，护士做法不妥的是（ ）

- A.协调处理护患关系
- B.增加患者的信任感
- C.介绍医院环境及制度
- D.关心患者、正确应用语言
- E.帮助患者解决一切困难

236.患者，女性，18岁，诊断为淋巴细胞白血病，护士准备为患者设置PICC置管，护士戴无菌手套的方法不正确的是（ ）

- A.戴手套前，先检查手套的号码和有效期
- B.戴手套前，修剪指甲、洗手
- C.未戴手套的手可触及手套的外面
- D.已戴手套的手可触及另一手套的外面
- E.戴好手套后两手应置于操作台面以上

237.容易氧化和遇光变质的药物是（ ）

- A.地高辛
- B.乙醇
- C.干酵母
- D.盐酸肾上腺素
- E.地西洋

238.患者，李某，45岁，甲状腺手术后采取半卧位的目的是（ ）

- A.减少静脉回流血量
- B.利于腹腔引流，使炎症局限
- C.减少术后出血
- D.防止呕吐
- E.减轻伤口缝合处的张力

239.某患者是一名普外科病人，以下护士为其制定的护理目标描述不完整的是（ ）

- A.患者1周内能下床活动
- B.患者3周内体重增长0.5kg
- C.患者1周内学会皮下注射胰岛素
- D.患者2周内借助支撑物下床活动
- E.患者能下床活动

240.病人男性，36岁，因交通事故导致脾破裂和多发性骨折，被送至急诊室，在医生未到之前，当班护士应立即（ ）

- A.询问发生交通事故的原因
- B.向公安部门报告
- C.给病人测血压，建立静脉输液通道
- D.给病人注射止痛剂和镇静剂
- E.安慰病人，等待医生抢救

241.患者男性，52岁，肺癌术后并发乳糜漏，一般状况较差。使用轮椅运送患者进行检查，扶助患者上下轮椅时，操作不妥的是（ ）

- A.轮椅推至床旁，椅背与床尾平齐
- B.扶患者坐起，穿好鞋、袜
- C.护士站在轮椅后面固定轮椅，防止前倾
- D.嘱患者手扶轮椅扶手，尽量靠前坐稳
- E.天冷用毛毯保暖

242.病人女性，44岁，双脚脚趾及脚背不慎烫伤，可考虑为其选用的保护具是（ ）

- A.床档
- B.支被架
- C.肩部约束带
- D.膝部约束带
- E.踝部约束带

243.患者王某，因车祸导致脾破裂大出血，抽血作血型鉴定和交叉配备试验，结果为Rh阴性，请问Rh因子所致的溶血反应是由于（ ）

- A.AB型Rh阳性者输入Rh阴性者血液
- B.Rh阴性者再次输入Rh阳性者血液
- C.Rh阴性者初次输入Rh阳性者血液
- D.O型Rh阴性者输入Rh阳性者血液

- E.Rh 阳性者输入 Rh 阴性者血液
- 244.患者男性, 65 岁, 全身水肿, 交班时护士发现患者尾骶部皮肤破溃, 显露红润创面, 并有脓性分泌物, 此属于压疮哪一期 ()
- 瘀血红润期
 - 炎性浸润期
 - 浅度溃疡期
 - 坏死溃疡期
 - 组织坏死期
- 245.患者, 男性, 40 岁, 诊断为胃癌, 行胃大部切除术, 术后患者在麻醉清醒, 生命体征平稳后, 合适的卧位是 ()
- 平卧位
 - 平卧位.头偏向一侧
 - 侧卧位
 - 半坐卧位
 - 坐位
- 246.患者, 男性, 57 岁, 因发现皮下包块就诊。护士接诊时发现患者存在头虱, 遂给予灭头虱操作中, 以下正确的是 ()
- 穿隔离衣, 戴手套
 - 女患者应动员剃去头发
 - 灭虱液擦遍头发, 用手反复揉搓头发 5 分钟
 - 12 小时后取下包裹头发的帽子
 - 更换患者衣裤, 进行压力蒸气灭菌处理
- 247.患者, 男性, 48 岁, 截肢术后并发肺部感染, 治疗后未见好转, 逐渐出现多器官功能衰竭的表现, 交班时发现患者表现为潮式呼吸, 该呼吸形态的特点是 ()
- 呼吸暂停, 变为减弱, 逐渐延长加深, 如此周而复始
 - 呼吸减弱, 逐渐增强, 然后变为呼吸暂停, 如此周而复始
 - 呼吸浅慢, 逐渐加深加快再变浅慢, 然后呼吸暂停, 如此周而复始
 - 呼吸深快, 逐渐变为浅慢, 以至呼吸暂停, 如此周而复始
 - 呼吸浅慢, 逐渐呼吸暂停, 然后加深加快再变浅慢, 如此周而复始
- 248.患者, 男性, 70 岁, 肺气肿 20 年, 因胸闷、憋气、烦躁不安来诊。查呼吸频率 30 次 / 分, 鼻翼扇动, 体温 38.7℃, 给予患者乙醇拭浴, 乙醇拭浴的温度为 ()
- 18℃
 - 20 ~ 22℃
 - 30℃
 - 32 ~ 34℃
 - 35℃
- 249.患者, 男性, 40 岁, 肛周脓肿, 医嘱青霉素过敏试验阴性后, 肌内注射 160 万 U 青霉素。护士在给患者做青霉素皮试时应注意 ()
- 用 2%碘酊消毒皮肤, 75%乙醇脱碘
 - 进针角度为 20° ~ 30°
 - 通常注药量为 0.1ml
 - 拔针后, 用无菌棉签按压针眼处
 - 若需作对照试验, 则用同一注射器及针头, 用生理盐水在另一只手臂做
- 250.患者, 女性, 58 岁, 初步诊断为“糖尿病”, 需作尿糖定量检查, 尿标本采集方法是 ()
- 留清晨第 1 次尿约 100ml
 - 随时留尿 100ml
 - 饭前留尿 100ml
 - 饭后留尿 100ml
 - 留 24 小时尿
- 251.患者, 男性, 75 岁, 因下肢动脉硬化闭塞活动减少, 观察患者营养状况较差, 患者消瘦、食欲不振。预防压疮的护理措施中, 能够有效避免局部理化因素刺激的是 ()
- 使用便器时, 应抬起患者腰骶部, 避免强塞硬拉
 - 定期按摩受压部位
 - 正确使用夹板和绷带
 - 改善营养状况
 - 协助患者经常更换卧位
- 252.患者, 男, 85 岁, 安眠药中毒, 洗胃后采取下列哪种导泻药 ()
- 硫酸镁
 - 硫酸钠
 - 硫酸铜
 - 醋酸
 - 过氧化氢
- 253.患者, 男性, 59 岁, 慢性支气管炎, 鼻导管吸氧后病情好转, 停用氧时首先应 ()

- A.关闭氧气筒总开关
B.关闭氧气流量表
C.取下湿化瓶
D.拔出鼻导管
E.记录停氧时间
- 254.患者，男性，79岁，肝癌晚期，肝区疼痛剧烈、腹水、呼吸困难，患者感到痛苦、悲哀，有轻生的念头。该患者的心理反应处于（ ）
A.忧郁期
B.愤怒期
C.协议期
D.否认期
E.接受期
- 255.朱某，男，23岁，因跳高时摔倒导致下肢骨折，已做内固定手术。护士为其制定的护理目标描述不完整的是（ ）
A.患者1周内借助支撑物下床活动
B.患者3周内体重增长0.5kg
C.患者3天后能自己在床上饮食
D.患者2周内能自行下床活动
E.患者能下床活动
- 256.患者，女性，61岁，在输液治疗心绞痛的过程中突然出现肺水肿。请问急性肺水肿的最典型症状是（ ）
A.发绀，烦躁不安
B.呼吸困难，两肺闻及哮鸣音
C.听诊心前区可闻及响亮的“水泡音”
D.心慌，血压下降
E.咳嗽，咯粉红色泡沫样痰
- 257.患者，女性，60岁。腹部外伤导致失血性休克，术中给予输液、输血治疗，输全血1000ml后患者出现枸橼酸钠中毒反应。请问下列哪项不是枸橼酸钠毒性反应的症状（ ）
A.穿刺部位大块淤血
B.血压下降
C.心率缓慢
D.手足抽搐
E.皮肤瘙痒
- 258.患者，女性，53岁，主诉尿急、尿频、尿痛。为明确诊断需留取中段尿做尿培养，留取的尿量应不少于（ ）
A.2ml
B.5ml
C.10ml
D.15ml
E.20ml
- 259.患者，女性，67岁，直肠癌晚期。主治医生在下班前开临时备用医嘱：盐酸吗啡缓释片30mg口服 sos。正确执行该医嘱的方法是（ ）
A.执行多次
B.有效时间在24小时以上
C.在临时医嘱栏内医生注明停止时间方为失效
D.立即执行
E.过期尚未执行即失效
- 260.患者，女性，75岁，股骨颈骨折卧床2年，2天前出现尿潴留，护士给予留置导尿处理，关于留置导尿管的护理正确的是（ ）
A.保持引流通畅，避免导管受压、扭曲
B.集尿袋高于膀胱位置
C.消毒液擦拭尿道口每天3次
D.每2天更换集尿袋一次
E.每2周更换导尿管一次
- 261.下列药物的保管不正确的是（ ）
A.氨茶碱片：装在透明的玻璃瓶内，盖紧
B.盐酸肾上腺素：装在盒内用黑纸遮盖
C.糖衣片：装瓶、盖紧
D.环氧乙烷：低温保存、远离明火
E.胎盘球蛋白：冷藏于冰箱内
- 262.在护理人员的职业防护中预防经血源传播疾病的措施不正确的是（ ）
A.当皮肤可能与被污染的环境直接接触时，应戴手套
B.用后的针头禁止重新戴帽

- C.当存在血液或体液飞溅、喷溅至眼、口腔或其他黏膜时，应戴防护性眼罩和口罩
- D.不得用手拾取破碎的玻璃器皿
- E.处理被污染物体时，须用单层不透水的胶袋包好

263.患者，女性，29岁，白血病，化疗过程中因口腔溃疡需做咽拭子培养，采集标本的部位应选（ ）

- A.两侧腭弓
- B.扁桃体
- C.悬雍垂
- D.溃疡面
- E.咽部

264.护士刘某，为一艾滋病患者进行静脉注射，在准备药物过程中护士做法不妥的是（ ）

- A.确保操作环境光线充足
- B.严格遵守无菌操作原则
- C.使用安瓿制剂时，先用砂轮划痕再直接用手掰开安瓿
- D.抽吸药液时严格使用无菌针头
- E.抽吸后立即单手操作套上针帽

265.患者，男，30岁，急性阑尾炎入院，在腰麻下行阑尾切除术，术后用平车护送入病室，回病室后应取何种体位（ ）

- A.中凹位
- B.去枕仰卧位
- C.膝胸卧位
- D.侧卧位
- E.截石位

266.患者，男性，69岁，冠心病、高血压，医嘱给予患者低分子肝素钠皮下注射，护士在准备皮下注射这一无菌技术操作时，正确的是（ ）

- A.操作环境要清洁，操作前1小时禁止清扫工作
- B.操作者要修剪指甲，为方便操作，应将手表尽量塞进衣袖
- C.取出的用物没有用完应及时放回原无菌容器中
- D.定期检查无菌物品保存情况，有效期为14天
- E.操作者不得跨越无菌区，手臂始终保持在操作台面以上

267.患者，男性，60岁，因肾功能不全入院，医嘱给予患者测血压 Bid，为患者测量血压时应该注意（ ）

- A.测量前嘱患者先休息10~20分钟
- B.固定袖带时应紧贴肘窝，松紧能放入一指为宜
- C.测量时血压计“0”点与心脏、肱动脉在同一水平
- D.听诊器胸件应塞在袖带内便于固定
- E.放气速度应慢，2mmHg/s

268.患者，男性，68岁，拟于今日行根治性前列腺切除术，术前护理给予留置导尿。护士在为患者插导尿管时遇到阻力，下列哪项措施是正确的（ ）

- A.做好患者的心理护理
- B.快速用力插入
- C.稍等片刻，嘱患者深呼吸
- D.放平阴茎，使耻骨前弯消失
- E.提起阴茎，使耻骨下弯消失

269.患者，男，51岁。因心肌炎输液，治疗过程中，突然感到胸部异常不适，并出现呼吸困难，严重发绀，心前区闻及一个响亮持续的水泡声。应考虑发生（ ）

- A.变态反应
- B.发热反应
- C.急性肺水肿
- D.空气栓塞
- E.左心衰竭

270.关于标本采集，正确的是

- A.尿糖定性，留12小时尿标本
- B.尿妊娠试验，睡前留尿
- C.痰培养标本，先清水漱口再留取
- D.查蛲虫，便盆应先加温
- E.咽拭子培养，在扁桃体及咽部取分泌物

271.患者，女性，70岁。给予5L/min的氧流量吸氧，其吸氧浓度为（ ）

- A.26%
- B.31%
- C.36%
- D.41%
- E.46%

- 272.患者男性, 53 岁。诊断为“幽门梗阻”, 为其洗胃的适宜时间是 ()
- 饭前 0.5 小时
 - 饭后 0.5 小时
 - 饭前 2 小时
 - 饭后 2 小时
 - 空腹时
- 273.患者, 女性, 38 岁, 交通意外致脑出血。医生判断患者脑死亡。请问下列哪项不是脑死亡的诊断依据 ()
- 不可逆的深度昏迷
 - 自发呼吸停止
 - 脑干反射消失
 - 心电波平直
 - 脑电波消失
- 274.患者女性, 35 岁。行背部手术后感到疼痛, 为减轻患者疼痛, 下午 2 时医生开出医嘱: 安那度(阿法罗定) 10mg, im, sos, 此项医嘱的失效时间是 ()
- 晚 8 时
 - 晚 12 时
 - 第 2 日凌晨 2 时
 - 第 2 日下午 2 时
 - 医生注明的停止时间
- 275.患者, 男性, 49 岁, 因格林巴利综合征累及呼吸肌, 评估患者后, 判断患者存在以下健康问题, 你认为应优先解决的是 ()
- 低效性呼吸型态
 - 有皮肤完整性受损的危险
 - 便秘
 - 睡眠型态紊乱
 - 营养失调: 低于机体需要量
- 276.患者, 女性, 42 岁, 乳癌切除术后, 此次因化疗收入化疗病房。护士在准备化疗药物的操作过程中, 做法正确的是 ()
- 在普通治疗室内配药
 - 用双手直接掰开安瓿时应小心刺伤
 - 抽取的药液以不超过注射器容量的 3/4 为宜
 - 静脉给药时无需戴手套
 - 静脉给药时中途如需加药须尽快加药
- 277.护士小王在铺床, 请问以下不符合节力原则的是 ()
- 备齐用物
 - 先铺远侧, 后铺近侧
 - 按使用顺序放置
 - 铺床时, 身体靠近床边
 - 两腿前后分开稍屈膝
- 278.患者吴某, 男性, 32 岁, 因车祸导致下肢骨折, 腹腔内大出血, 被送至急诊室, 在医生未到之前, 当班护士应立即 ()
- 询问发生交通事故的原因
 - 向公安部门报告
 - 给患者测血压, 建立静脉输液通道
 - 给患者注射止痛剂和镇静剂
 - 安慰患者, 等待医生抢救
- 279.患者, 男性, 45 岁, 因车祸致脾破裂急诊入院。患者面色苍白、出冷汗、脉搏细速、血压 60/40mmHg。护士应为患者安置 ()
- 去枕平卧位
 - 中凹卧位
 - 头低脚高位
 - 半坐卧位
 - 平卧位
- 280.患者, 男性, 69 岁, 冠心病、高血压。医嘱维生素 B12 肌肉注射, 护士选用臀大肌注射, 操作中定位正确的是 ()
- 髂前上棘外三横指
 - 髂前上棘与尾骨联线的中外三分之一
 - 髂前上棘内三横指
 - 髂前上棘与尾骨联线的中外三分之二
 - 髂前上棘与尾骨联线的中点
- 281.患者, 男性, 45 岁, 慢性粒细胞白血病, 为患者设置颈内静脉置管以进行化疗, 静脉切开包使用后, 器械应清洗后用包布包裹进行消毒。无菌包布材料最好选用 ()

- A.化纤布
B.未脱脂白棉布
C.脱脂白棉布
D.有色棉布
E.白丝棉布
- 282.患者，男性，57岁，食管癌术后。患者鼻饲饮食，护士在对患者进行口腔护理时评估患者口腔不包括（ ）
A.有无口臭
B.有无义齿
C.舌苔的变化
D.黏膜有无溃疡
E.牙齿是否洁白
- 283.患者，女性，69岁，“高血压”19年，近期由于劳累血压波动较大，为该患者严密观察血压应（ ）
A.定血压计、定部位、定时间、定护士
B.定血压计、定部位、定时间、定听诊器
C.定听诊器、定部位、定时间、定体位
D.定血压计、定部位、定时间、定体位
E.定护士、定部位、定时间、定体位
- 284.患者，男性，54岁，肝硬化腹水患者，给予患者无盐低钠饮食，该饮食要求患者每天摄入的食物中自然存在的含钠量低于（ ）
A.0.5g
B.1.0g
C.1.5g
D.2.0g
E.2.5g
- 285.患者方某，女，20岁，因会阴部充血疼痛来医院就诊，医嘱：热水坐浴。患者想要回家自己坐浴，在健康教育中不妥的是（ ）
A.坐浴前要排空二便
B.调节水温 40-45℃
C.坐浴液装约二分之一盆满
D.坐浴时间 30 分钟
E.月经期不可坐浴
- 286.患者，女性，37岁，主诉 4 天前无明显诱因出现腹泻，每天解水样便 4~5 次，应给予患者（ ）
A.清淡的普食
B.软食
C.半流质
D.暂时禁食
E.流质
- 287.患儿，男性，9岁，在与小伙伴玩耍的过程中致鼻部软组织肿胀、发炎，护士给予鼻部冰敷治疗。请问冷疗控制炎症扩散的机制是（ ）
A.降低神经的兴奋性
B.降低细菌的活力
C.增强白细胞的吞噬功能
D.溶解坏死组织
E.加速渗出物的吸收
- 288.患者，女性，83岁，因心绞痛入院治疗。入院 5 天以来未排便。护士为其进行便秘方面的健康教育下列哪项是错误的（ ）
A.每晚睡前使用开塞露
B.摄入足够的水分
C.多食蔬菜、水果和粗粮
D.适当翻身或下床活动
E.每日定时解便一次
- 289.患者，男性，25岁。患有躁狂型精神病，拟给予保护具，正确的是（ ）
A.对精神病患者，不必向其家人解释使用保护具的必要性
B.将患者上肢伸直，在手腕处系好尼龙搭扣约束带于床边
C.将患者下肢肢分开，在脚踝处系好尼龙搭扣约束带于床边
D.使用床栏，防止坠床
E.记录保护具使用时间
- 290.患者，女性，49岁，因消化道溃疡收住入院，给予输液治疗第 4 天，主诉左手输液处疼痛，检查见沿静脉走向出现条索状红线，局部皮肤温度高。根据临床表现，该患者可能出现了（ ）
A.过敏反应
B.细菌污染反应

- C.发热反应
D.静脉炎
E.空气栓塞
- 291.患者，男性，30岁，高热3日，咽部肿痛，全身乏力，遵医嘱做咽拭子培养，不正确的操作是（）
- A.培养管口应在酒精灯火焰上消毒
B.采集咽部及扁桃体分泌物
C.用无菌拭子培养管留取标本
D.进餐后可立即采集
E.用长棉签蘸无菌生理盐水擦拭采集部位
- 292.患者，女性，53岁，自服敌百虫（美曲磷酯）20片，家人发现后急送急诊室，为患者洗胃时，禁用的洗胃液是（）
- A.2%~4%碳酸氢钠
B.1%盐水
C.1:15000~1:20000高锰酸钾
D.5%醋酸
E.清水
- 293.患者，女性，78岁，虚弱无力将痰液咳出，下列使用电动吸引器吸痰法的操作哪项错误（）
- A.操作前先检查吸引器性能
B.调节负压小于40.0kPa
C.痰液黏稠可叩拍胸背部
D.每次吸痰时间小于15秒
E.治疗盘内吸痰用物每天更换1~2次
- 294.患者，男性，67岁，肝癌晚期全身转移，治疗效果不佳，处于临终状态，请问患者的临终状态又称为（）
- A.临床死亡期
B.脑死亡期
C.生物学死亡期
D.濒死期
E.代谢衰退期
- 295.患者，男性，63岁，结肠癌，拟于明日行结肠癌切除术，护士在其护理记录单上记录11/E，请问11/E的记录表示（）
- A.排便1次
B.排便2次
C.自行排便1次，灌肠后排便1次
D.灌肠后排便1次
E.灌肠后排便2次
- 296.患者，男性，64岁，因“发热待查”收入院，护士在收集患者资料时，属于主观资料的是（）
- A.T 39.2℃
B.黄疸
C.发绀
D.心脏杂音
E.心慌
- 297.护士刘某，为一名患者进行静脉注射，在准备药物过程中护士做法不妥的是（）
- A.确保操作环境光线充足
B.严格遵守无菌操作原则
C.抽吸后立即单手操作套上针帽
D.抽吸药液时严格使用无菌针头
E.使用安瓿制剂时，先用砂轮划痕再直接用手掰开安瓿
- 298.患者，男性，70岁，主诉排尿困难1年，下肢浮肿、尿少3个月，针对该病人病室适宜的相对湿度为（）
- A.20%~30%
B.30%~40%
C.40%~50%
D.50%~60%
E.60%~70%
- 299.患者，男性，70岁，因高血压入院治疗，病区护士接到住院处通知后为其准备（）
- A.备用床
B.暂空床
C.麻醉床
D.手术床

- E.抢救床
- 300.患者，男性，68岁，胸外大手术后第四天病情稳定，医嘱改患者为一级护理，要求护士应多少时间巡视一次患者（ ）
- 5~10分钟
 - 10~15分钟
 - 15~30分钟
 - 30~60分钟
 - 60分钟
- 301.患者，男性，70岁，反复咳嗽、咳痰十余年，近3年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显、呼吸困难，应取（ ）
- 仰卧位
 - 侧卧位
 - 头高足低位
 - 端坐位
 - 膝胸位
- 302.与湿热消毒灭菌法相比，干热法（ ）
- 主要通过水蒸汽及空气传导热力
 - 导热较快
 - 穿透力较强
 - 灭菌所需时间较短
 - 灭菌所需温度较高
- 303.患者，男性，71岁，因股骨头骨折长期卧床，护士欲为患者进行床上擦浴。床上擦浴的室温应调至（ ）
- 10~14℃
 - 14~18℃
 - 18~22℃
 - 22~26℃
 - 26~30℃
- 304.患者，男性，60岁，既往血压正常，入院当日检查血压偏高，测量的血压偏高可见于（ ）
- 袖带过宽时
 - 袖带过紧时
 - 水银不足时
 - 视线低于水银柱弯月面
 - 输气球漏气时
- 305.患者，女性，59岁。持续高热3天，每隔4小时测一次体温，都在39.1℃以上，最高达40℃，经检查诊断为“伤寒”。该患者的热型属于（ ）
- 弛张热
 - 稽留热
 - 间歇热
 - 不规则热
 - 波浪热
- 306.患者，男性，70岁，因脑梗死后吞咽功能障碍，采用鼻饲法进食，护士评估患者后给予1%~3%过氧化氢溶液用于口腔护理，该漱口液的作用是（ ）
- 除臭
 - 抑菌
 - 抗菌
 - 抗菌防臭
 - 防腐
- 307.患者王某，男性，74岁，诊断为尿毒症，医嘱记录出入量。排出量的记录应不包括（ ）
- 呕吐量
 - 引流液及分泌物量
 - 尿量
 - 皮肤失水量
 - 胃肠减压量
- 308.患者，女性，体温39.2℃，给予物理降温，拭浴时，禁擦的部位为（ ）
- 头部及四肢
 - 腋窝、腹股沟、腘窝
 - 前胸、腹部、足底
 - 下肢及两侧肾区
 - 会阴部
- 309.患者，女性，58岁，主诉腹部膨胀，腹痛，嗝气，医嘱给予肛管排气。排气时，保留肛管一般不超过20分钟的原因是（ ）

- A.防止肠道感染
B.防止肛管与黏膜粘连
C.减轻患者的不适
D.防止肛门括约肌反应性降低
E.不影响患者活动
- 310.患者，女性，19岁，因手外伤到急诊就诊，医嘱破伤风抗毒素 ID。请问“ID”的正确含义是（ ）
A.皮内注射
B.皮下注射
C.肌肉注射
D.静脉注射
E.静脉滴注
- 311.患者，女性，54岁，蛛网膜下腔出血，昏迷，给予长期留置导尿管，护士定期为其更换导尿管，目的是（ ）
A.锻炼膀胱的反射功能
B.防止逆行感染
C.使患者得到休息
D.防止导尿管老化、折断
E.便于膀胱冲洗
- 312.患者到医院看病，医生给开的药物中有一种药物的服用时间标注为“prn”，请问“prn”译成中文的正确含义是（ ）
A.隔日一次
B.需要时用(限用一次)
C.需要时用(长期)
D.每晚一次
E.每小时一次
- 313.患者，女性，53岁，脑水肿，医嘱 20%甘露醇 250ml 静脉输液，要求在 30 分钟内输完。如果输液器点滴系数为 15，应调节滴数约为（ ）
A.105 滴/分
B.110 滴/分
C.115 滴/分
D.120 滴/分
E.125 滴/分
- 314.患儿，男性，8岁，主诉腹痛、呕吐、消化不良，初步诊断肠道中有寄生虫。为明确诊断需检查粪便中的寄生虫，留取粪便标本正确的是（ ）
A.取中间部位的粪便
B.取边缘部位的粪便
C.取不同部位的粪便
D.随机取少许粪便
E.留取全部粪便
- 315.患者，男性，79岁，已昏迷 3 天，眼睑不能闭合，眼部护理首选措施是（ ）
A.按摩双眼睑
B.热敷眼部
C.消毒纱布遮盖
D.滴眼药水
E.盖凡士林纱布
- 316.患者，男性，76岁，吸烟史 30 年。大面积脑梗合并坠积性肺炎。咳痰无力，需用电动吸引器吸痰。请问下列方法正确的是（ ）
A.插管时应带负压
B.每根吸痰管只用 1 次，不可反复上下提插
C.先吸气管内，再吸鼻腔，最后吸口腔
D.每次吸痰时间不超过 20 秒
E.吸痰时调节负压 < 40.0kPa
- 317.患者，女性，36岁，因“急性胃肠炎”急诊入院。计划补液 800ml，每分钟 50 滴，所用输液器点滴系数为 15，从上午 8 点 20 分开始输液，估计输液完毕的时间（ ）
A.上午 11 点 20 分
B.中午 12 点
C.中午 12 点 20 分
D.中午 12 点
E.下午 1 点 20 分
- 318.患者主诉双下肢水肿，尿常规检查尿蛋白阳性。为进一步明确诊断需做 24 小时尿蛋白定量检测。护士应告知患者从几点开始到几点结束留取 24 小时的尿标本（ ）
A.早 5:00 至晚 5:00

- B.早 7:00 至晚 7:00
 C.早 6:00 至次日晨 6:00
 D.早 8:00 至次日晨 8:00
 E.早 7:00 至次日晨 7:00
- 319.患者，男性，75 岁，肺源性心脏病出现呼吸困难、咳嗽、咯痰等症状。对该患者应用最好的吸氧方法是（ ）
 A.高浓度吸氧
 B.加压给氧
 C.低流量低浓度持续吸氧
 D.间断吸氧
 E.乙醇湿化后吸氧
- 320.患者，男，50 岁。诊断为晚期肝癌，患者经历的心理反应阶段是（ ）
 A.否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期
 B.愤怒期、忧郁期、否认期、协议期、接受期
 C.否认期、愤怒期、忧郁期、协议期、接受期
 D.忧郁期、愤怒期、协议期、否认期、接受期
 E.协议期、忧郁期、愤怒期、否认期、接受期
- 321.某患者因高热、腹泻、脱水被收入病房。下班前护士长与其责任护士核对该患者的长期医嘱。请问下列不属于长期医嘱的为（ ）
 A.青霉素 80 万单位肌肉注射 Bid
 B.测血压 q4h
 C.平卧位
 D.流食
 E.5%葡萄糖静脉点滴 st
- 322.护士使用超声雾化吸入器给患者进行雾化，以下属于超声雾化吸入法特点的是（ ）
 A.应用超声波电能，将药液变成气雾
 B.雾滴小而均匀，可达终末支气管和肺泡
 C.晶体换能器产生高频电能
 D.雾量大小固定
 E.用氧量小，节约资源
- 323.患者，男性，46 岁，因交通意外致脑出血昏迷收入院，某护士负责观察其病情，请问观察的内容下列哪项是次要的（ ）
 A.意识状态改变
 B.饮食方面的变化
 C.生命体征的变化
 D.瞳孔的变化
 E.尿量及呕吐物的变化
- 324.患者，男，65 岁，肝癌晚期，癌细胞广泛转移，伴有剧烈疼痛，神志有时清醒，有时模糊，在清醒时他常对家人说：我痛死了，还是早一点死了好，真不想活。下列控制疼痛的方法哪一项正确（ ）
 A.告诉患者疼痛难免，尽量忍耐
 B.尽量使用非药物止痛方法控制疼痛
 C.慎用药物止痛，以免成瘾
 D.准确及时给予止痛药控制疼痛
 E.弱麻醉性镇痛药为哌替啶
- 325.对接受青霉素治疗的患者，如果停药几天以上，必须重新做过敏试验（ ）
 A.1 天
 B.2 天
 C.3 天
 D.4 天
 E.5 天
- 326.患者，男性，30 岁，从高处坠下，患者主诉腕部疼痛，下腹部胀痛，被送往手术室手术，护士为患者准备了麻醉床。关于麻醉床的铺法下列哪一项是错误的（ ）
 A.盖被扇形三折于一侧床边，开口朝向门
 B.床旁桌移回原处
 C.椅子放于盖被折叠侧
 D.枕头横放于床头，开口朝向门
 E.麻醉护理盘放于床旁桌上
- 327.患者，男性，49 岁，化疗后白细胞降为 $1.5 \times 10^9/L$ ，应对该患者进行（ ）
 A.严密隔离
 B.接触隔离
 C.消化道隔离
 D.呼吸道隔离

- E.保护性隔离
- 328.患者男性, 46岁, 患有风湿性心脏病。患者主动脉瓣关闭不全、心房纤颤, 可见 ()
- A.间歇脉
 - B.短绌脉
 - C.水冲脉
 - D.交替脉
 - E.奇脉
- 329.患者, 男性, 24岁, 因腹痛待查入院, 在为患者测口腔温度时, 患者不慎咬破体温计, 吞下少量水银, 护士首先应 ()
- A.催吐或洗胃
 - B.口服蛋清液或牛奶
 - C.立即清除玻璃碎屑
 - D.服解毒药物
 - E.大量补液, 冲洗毒物
- 330.患者, 女性, 50岁, 患者因脑出血入院, 目前患者昏迷, 给予鼻饲饮食, 护士使用口护包对患者进行口腔护理, 口护包为高压蒸汽灭菌。对高压蒸汽灭菌效果的监测, 最可靠的方法是 ()
- A.化学指示卡法
 - B.化学指示胶带法
 - C.培养法
 - D.器皿法
 - E.微生物测试法
- 331.孕妇, 27岁, 孕28周。主诉腹胀, 7天未排便。医嘱: “1、2、3”灌肠液小量不保留灌肠。请问“1、2、3”灌肠液的正确配制方法是 ()
- A.50%硫酸镁 20ml, 甘油 80ml, 温开水 100ml
 - B.50%硫酸镁 25ml, 甘油 50ml, 温开水 75ml
 - C.50%硫酸镁 30ml, 甘油 60ml, 温开水 90ml
 - D.50%硫酸镁 40ml, 甘油 60ml, 温开水 90ml
 - E.50%硫酸镁 50ml, 甘油 100ml, 开水 150ml
- 332.患者, 女性, 在输液过程中出现呼吸困难、咳嗽、咳血性泡沫痰。请问护士首先应采取的措施是 ()
- A.高流量氧气吸入
 - B.四肢轮流结扎
 - C.停止输液, 置患者端坐位
 - D.报告医生
 - E.注射强心剂
- 333.患者, 男, 58岁, 持续昏迷, 护士观察到其痰液黏稠致呼吸困难, 以下哪一种处理妥善 ()
- A.动脉血氧分压 $< 8\text{kPa}$ 时给予吸氧
 - B.用力叩击胸壁脊柱, 以利排痰
 - C.可用体位引流
 - D.帮助患者多翻身、扣背
 - E.保持病室空气干燥、新鲜
- 334.某患儿, 因高热、惊厥入院, 目前患儿躁动不安, 为防止发生意外, 应立即 ()
- A.报告医生
 - B.通知家长
 - C.注射镇静剂
 - D.监护
 - E.采用保护具
- 335.患者, 男性, 73岁, 大面积脑梗死伴脑疝昏迷。护士在观察患者病情时发现该患者呼气带有氨味, 该患者可能发生 ()
- A.尿毒症
 - B.糖尿病
 - C.农药中毒
 - D.肝脓肿
 - E.支气管扩张
- 336.患者, 女性, 40岁, 因严重贫血需要进行输血, 护士小李将血袋置于温水中加温后给患者输入, 输血开始不久, 患者自诉头痛、四肢麻木且腰背部剧烈疼痛, 患者腰背部剧痛可采取 ()
- A.局部冷敷
 - B.局部热敷
 - C.局部按摩
 - D.药物镇痛

E.建立静脉通道

337.孕妇李某，孕 30 周，产前检查胎儿臀位，为矫正胎位，护士指导其选用的是（ ）

- A.头低脚高位
- B.截石位
- C.侧卧位
- D.膝胸卧位
- E.俯卧位

338.既往身体健康的 70 岁老年人发生股骨颈骨折，欲给予患者手术治疗，手术物品使用高压蒸汽灭菌。关于高压蒸汽灭菌，不正确的是（ ）

- A.无菌包不宜过大
- B.灭菌后物品即刻取出备用
- C.布类物品放在搪瓷物品之上
- D.高压锅内物品不能装得太多
- E.放置时各包之间要有空隙

339.患者，女性，66 岁，诊断为心房纤维颤动。护士为其测血压，动脉搏动微弱而不易辨清，需重复测量。下述做法错误的是（ ）

- A.将袖带内气体驱尽
- B.使汞柱降到“0”点
- C.稍等片刻后重测
- D.连续加压直到听清为止
- E.测量值先读收缩压，后读舒张压

340.患者，女性，29 岁，主诉恶心呕吐，月经延迟 2 周。为明确诊断，医嘱做尿妊娠试验检查。护士让患者留取晨尿检验的目的是（ ）

- A.尿中尿素、尿酸浓度高
- B.不受饮食的影响尿中尿素、尿酸浓度高
- C.尿中磷酸盐浓度高
- D.尿中绒毛膜促性腺激素含量高
- E.尿中酸碱度未改变

341.患者，女性，28 岁。分娩时会阴部侧切，现切口部位出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射。照射过程中发现局部皮肤出现紫红色，应采取的措施是（ ）

- A.改用热湿敷
- B.局部纱布覆盖
- C.抬高照射距离
- D.换用低功率灯头
- E.立即停用，局部涂凡士林

342.患者赵某，男性，70 岁。在家里突然晕倒，立即被送入医院，诊断为脑梗。经抢救患者逐渐恢复，为鼓励患者自己进食，护士应采取的措施是（ ）

- A.将餐具放到患者手里
- B.让患者根据自己能力慢慢进食
- C.建议配偶帮助喂饭，并协助患者进食
- D.先给患者喂食，剩余部分让患者自己进食
- E.将食物和餐具放在患者方便拿取的地方

343.患者，男性，30 岁。诊断为“肺结核”。入院指导时告知患者，即便戴着口罩也不能进入的地方是（ ）

- A.医护办公室
- B.配膳室
- C.病区走廊
- D.化验室
- E.患者浴室

344.患者，女性，55 岁。截瘫，生活不能自理。护士协助床上擦浴。擦洗顺序正确的是（ ）

- A.脸、颈部，上肢、胸腹部，后项、背、臀部，会阴部，双下肢、踝部、双足
- B.会阴部、脸、颈部，上肢、胸腹部，后项、背、臀部，双下肢、踝部、双足
- C.脸、颈部，上肢、胸腹部，会阴部，后项、背、臀部，双下肢、踝部、双足
- D.脸、颈部，上肢、胸腹部，后项、背、臀部，双下肢、踝部、双足，会阴部
- E.脸、颈部，会阴部，上肢、胸腹部，后项、背、臀部，双下肢、踝部、双足

345.某患者被人搀扶着步入医院，接诊护士看见其面色发绀，口唇呈黑紫色，呼吸困难，询问病史得知其有慢性阻塞性肺病史。护士采取相应措施时应特别注意

- A.对患者实施呼吸道隔离
- B.让患者保持镇静
- C.氧流量 1 - 2L/min
- D.只能除颤 1 次
- E.人工呼吸与胸外心脏按压比例为 2: 30

346.护士小李，在某肿瘤病房工作 5 年，经常接触化疗药物，如果防护不当，可能出现的毒性反应不包括（ ）

- A. 肿瘤
 - B. 畸形
 - C. 流产率增高
 - D. 白细胞数量减少
 - E. 细菌性肺炎
347. 患者，男性，65岁。3周前因脑血管意外导致左侧肢体瘫痪。患者神志清楚，说话口齿不清，大小便失禁。护士协助患者更换卧位后，在身体空隙处垫软枕的作用是
- A. 促进局部血液循环
 - B. 减少皮肤受摩擦刺激
 - C. 降低空隙处所受压强
 - D. 降低局部组织所承受的压力
 - E. 防止排泄物对局部的直接刺激
348. 患者，男性，55岁。因外伤致截瘫，护士告知家属应注意预防压疮，尤其是骶尾部更易发生，家属在进行局部皮肤按摩的时候，有一些不正确的做法，请指出（ ）
- A. 用手鱼际部分按摩
 - B. 用手蘸50%乙醇少许
 - C. 鱼际部分需紧贴皮肤
 - D. 由轻至重、由重至轻按摩
 - E. 压力均匀，以皮肤紫红为度
349. 患者，男性。因感染性腹泻入院，护士在接过患者递过的体温计时，使用避污纸，取用的正确方法是（ ）
- A. 掀页撕取
 - B. 由别人代递
 - C. 在页面抓取
 - D. 须掀起页面再抓取
 - E. 随便撕取，无影响
350. 患者，女性，55岁。以支气管扩张入院，患者慢性咳嗽，有大量脓痰，在进行体位引流时采取的体位是（ ）
- A. 头高足低位
 - B. 头低足高位
 - C. 屈膝仰卧位
 - D. 侧卧位
 - E. 俯卧位
351. 患者，男性，55岁，文盲。因头晕头痛来医院就诊，对前来就诊的患者。门诊护士首先应进行（ ）
- A. 查阅病历资料
 - B. 预检分诊
 - C. 卫生指导
 - D. 心理安慰
 - E. 用药指导
352. 护士在候诊室巡视时，发现一年轻女患者精神不振，询问后患者诉肝区隐痛，疲乏，食欲差，双眼巩膜黄染。检查：尿三胆(++)。护士应（ ）
- A. 转急诊室诊治
 - B. 安排提前就诊
 - C. 将患者转隔离门诊
 - D. 给患者测量生命体征
 - E. 安慰患者，不要着急焦虑
353. 患者，男性，22岁。踢球时不慎致胫骨骨折入院，现进行胫骨牵引，护士在整理床单位时，正确的做法是（ ）
- A. 使用床刷和干燥的扫床巾
 - B. 先放松牵引，再整理床单位
 - C. 协助患者翻身侧卧，面向护士
 - D. 放平床头及床尾支架，便于彻底清扫
 - E. 取出枕头，扫净拍松后放回患者头下
354. 患者，女性，62岁。因外伤入院，一直昏迷不醒，护理工作中需特别注意的是（ ）
- A. 避免坠床
 - B. 按时给药
 - C. 做好皮肤清洁护理
 - D. 准确执行医嘱
 - E. 保持呼吸道通畅
355. 患者，男性，50岁。既往有高血压病史15年，护士对其进行饮食指导，其中错误的是（ ）
- A. 低盐、低脂
 - B. 低胆固醇
 - C. 清淡、宜少量多餐

- D. 富含维生素和蛋白质
E. 高热量饮食
356. 患者，男性。患肺炎合并脑病，肺部听诊有痰鸣音，给予持续氧气、雾化吸入，巡视病房时发现患者出现呼吸困难、发绀，这时应采取的措施是()
- A. 使用呼吸兴奋剂
B. 调大氧流量
C. 加压吸氧
D. 吸痰
E. 乙醇湿化给氧
357. 急诊室接诊一位中毒患者，已意识模糊，陪同患者就医者不知患者服用何种物质而致中毒，护士应选择的洗胃液是()
- A. 牛奶
B. 3%过氧化氢
C. 2% -4%碳酸氢钠
D. 1:15 000 高锰酸钾
E. 温开水
358. 患者，女性，68 岁。处于昏迷状态，观察患者昏迷深浅度最可靠的指标是()
- A. 肌张力
B. 皮肤颜色、温度
C. 大小便情况
D. 对疼痛刺激的反应
E. 咳嗽反射
359. 患者，女性，28 岁。1 周来晨起眼睑水肿，排尿不适，尿色发红，疑急性肾小球肾炎，需留 12 小时尿作艾迪计数。为防止尿液久放变质，应在尿液中加入()
- A. 甲醛
B. 乙醛
C. 乙酚
D. 浓盐酸
E. 甲苯
360. 患者，男性，48 岁。因结肠癌入院，遵医嘱做术前肠道准备，灌肠过程中患者出现速脉，面色苍白，出冷汗，心慌气促，护士的正确处理措施是()
- A. 嘱患者张口呼吸
B. 停止灌肠
C. 降低灌肠筒高度
D. 提高灌肠筒高度
E. 稍拔出肛管

六、急救护理

(一) 单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

1. 急危重症护理学最早起源于()
- A. 南丁格尔年代
B. 20 世纪 50 年代
C. 20 世纪 60 年代
D. 20 世纪 80 年代
E. 20 世纪 70 年代
2. 我国统一的急救电话号码是什么?()
- A. 120
B. 119
C. 110
D. 911
E. 122
3. 以下说法错误的是()
- A. EMSS 是急救医疗服务体系的缩写
B. EMSS 是集院前急救、院内急诊科诊治、ICU 救治和各专科的“生命绿色通道”为一体的急救网络
C. EMSS 是院内急诊科诊治、ICU 救治和各专科的“生命绿色通道”为一体的急救网络
D. 院前急救负责现场急救和途中救护
E. 急诊科和 ICU 负责院内救护
4. 各种抢救药品、物品管理要实行“四定”，指的是()
- A. 定数量、定地点、定种类、定人管理
B. 定时间、定地点、定人管理、定期检查
C. 定数量、定地点、定人管理、定期检查

- D.定数量、定地点、定人管理、定期消毒
E.定数量、定种类、定人管理、定期消毒
- 5.卫生部规定的一级 ICU 的护士与病床比例为 ()
A.0.4 : 1
B.0.5 : 1
C.2.5 ~ 3 : 1
D.2 : 1
E.1 : 1
- 6.国内三级综合医院 ICU 床位数全年使用率应多少为宜? ()
A.50%
B.60%
C.70%
D.75%
E.90%
- 7.现场救护的范围不包括 ()
A.对呼吸、心搏骤停的伤员,立即行心肺复苏
B.对昏迷患者,安置合适体位,保持呼吸道通畅
C.对张力性气胸伤员,用带有单向引流管的粗针头穿刺排气
D.对活动性出血伤员,采取有效止血措施
E.对骨折患者,做术前准备
- 8.同步心脏电复律的适应证应除外 ()
A.心室颤动
B.心房纤颤
C.心房扑动
D.室上性心动过速 E.室性心动过速
- 9.患者女性,46岁,右下肢因房屋倒塌被砖墙压住,4小时后被救出。体检:脉搏 96 次/分,血压 86/66/mmHg,右肢体明显肿胀,有瘀斑。静脉输液应首选 ()
A.低分子右旋糖酐
B.5%葡萄糖溶液
C.3%高渗盐水溶液
D.全血或血浆
E.平衡液
- 10.提示伤病员已经死亡的指征除外 ()
A.无意识
B.无自主呼吸
C.瞳孔固定散大 30 分钟
D.心肺复苏抢救持续 20 分钟,心电活动不恢复
E.出现尸斑
- 11.以下哪项不属于脑复苏的治疗措施 ()
A.维持血压
B.非同步电除颤
C.降低颅内压
D.低温
E.镇痛镇静
- 12.可进行静脉、气管内或心内注射的心肺复苏药物是: ()
A.肾上腺素
B.乳酸钠
C.利他灵
D.50%葡萄糖
E.碳酸氢钠注射液
- 13.成人胸外心脏按压的操作,下列不正确的是 ()
A.病人仰卧位,背部垫硬板
B.按压部位在病人心尖部
C.使胸骨下半段及其相邻的软骨下降 5~6 Cm
D.按压要有规律,每分钟 100~120 次
E.尽量减少按压中断
- 14.诊断心跳骤停迅速可靠的指标是 ()
A.大动脉搏动消失
B.呼吸停止
C.瞳孔散大
D.血压测不到
E.意识丧失
- 15.检查颈动脉搏动时,时间不应超过()秒。
A.5
B.6
C.8
D.10
E.15

16. 脑的缺氧耐受阈为 ()
- 5 ~ 10 秒
 - 4 ~ 6 秒
 - 5 ~ 10 分钟
 - 4 ~ 6 分钟
 - 10 分钟
17. 心肺复苏三大要素: Airway, Breathing, Compression。其基本程序为 ()
- A B C
 - A C B
 - C A B
 - C B A
 - B A C
18. 急性心力衰竭较为常见的是 ()
- 急性肺水肿
 - 心源性休克
 - 急性左心衰
 - 急性右心衰
 - 呼吸困难
19. 造成成人心脏骤停的最主要的心源性因素是 ()
- 冠心病
 - 病毒性心肌炎
 - 心肌病
 - 风心病
 - 主动脉疾病
20. 癫痫持续状态最常见诱因是 ()
- 不恰当停药和不规范抗癫痫治疗
 - 感染
 - 精神因素
 - 过度疲劳
 - 孕产及饮酒
21. 气道阻塞的患者常常出现“四凹征”，不包括 ()
- 胸骨上窝
 - 锁骨上窝
 - 肋间隙
 - 剑突下软组织
 - 胸骨体
22. 以下哪项不是常见的引起呼吸困难的原因? ()
- 急性肺栓塞
 - 支气管哮喘
 - 急性呼吸窘迫综合征
 - 自发性气胸
 - 胃肠道急性穿孔
23. 下列关于急性冠脉综合征的说法错误的是 ()
- 安静卧床休息
 - 给予氧气吸入
 - 遵医嘱给予阿司匹林、硝酸甘油等药物治疗
 - 未明确诊断前不可给予镇痛剂
 - 描记 12 或 18 导联心电图
24. 糖尿病酮症酸中毒最关键的救治处理措施是 ()
- 补液
 - 补充胰岛素
 - 纠正水电解质平衡紊乱及酸中毒
 - 去除诱因
 - 防止并发症
25. 低血糖症是指血糖值低于 ()
- 4.1mmol/L
 - 3.3 mmol/L
 - 2.8 mmol/L
 - 2.0mmol/L
 - 1.8 mmol/L
26. 以下关于有机磷农药中毒的说法错误的是 ()
- 中毒者有口服、喷洒或其他方式有机磷农药接触史
 - 口服中毒者多在 10 分钟至 2 小时内发病
 - 皮肤接触中毒者常在接触后 2~6 小时发病
 - 解毒剂在应用时应使用单种药，不可联合用药
 - 解毒剂应用应早期、足量、联合、重复用药
27. 急性中毒病员，在毒物种类不明时，一般选用的洗胃液是 ()
- 生理盐水

- B.碳酸氢钠
 - C.1 : 5000 高锰酸钾
 - D.液体石蜡
 - E.植物油
- 28.中心静脉压的正常值为 ()
- A.4 ~ 10 CmH₂O
 - B.5 ~ 12 CmH₂O
 - C.6 ~ 15 CmH₂O
 - D.5 ~ 12mmHg
 - E.6 ~ 15mmHg
- 29.以下哪项不是呼吸容量监测指标 ()
- A.潮气量
 - B.呼吸频率
 - C.分钟通气量
 - D.生理无效腔容积
 - E.肺泡通气量
- 30.脉氧饱和度的正常值为不低于 ()
- A.60%
 - B.80%
 - C.90%
 - D.92%
 - E.96%
- 31.以下关于尿液的监测,说法错误的是 ()
- A.尿量是反映机体重要脏器血液灌注状态的敏感指标之一
 - B.尿量异常是肾功能改变最直接和最常见的指标
 - C.24 小时尿量 < 400ml 为无尿
 - D.每小时尿量 < 17ml 为少尿
 - E.正常尿比重为 1.015 ~ 1.025
- 32.感染性休克患者早期 (3 小时内) 处理不正确的是 ()
- A.液体复苏
 - B.使用抗生素前留取病原学标本
 - C.1 小时内使用抗生素抗感染
 - D.为了快速补液必须建立中心静脉置管
 - E.监测血乳酸
- 33.预防中心静脉导管相关血流感染策略中置管前基本措施包括()
- A.评估指征
 - B.对置管者和维护导管者给以培训和教育
 - C.每日洗必泰药浴
 - D. A+ B
 - E. A+ B+ C
- 34.对深静脉导管护理更换敷料不正确的是()
- A.可以使用透明贴膜和纱布敷料
 - B.透明贴膜更换建议常规每周一次
 - C.纱布敷料更换常规每天一次
 - D.透明贴膜和纱布污染,有明显渗液、渗血时及时更换
 - E.二个月以上的患者可以使用洗必泰敷料
- 35.导尿管相关尿路感染主要的感染途径是()
- A.逆行性感染
 - B.医源性感染
 - C.交叉感染
 - D.盆腔细菌定植
 - E.血源性感染
- 36.气管插管的适应证不包括 ()
- A.呼吸心搏骤停行心肺脑复苏者
 - B.呼吸功能衰竭需有创机械通气者
 - C.颈椎骨折
 - D.呼吸道分泌物不能自行咳出而需气管内吸痰者
 - E.误吸患者插管吸引
- 37.重症患者的常规护理除外哪项
- A.严密监测患者生命体征,发现病情变化,及时处理,记录出入液量
 - B.保证各种留置管道通畅,妥善固定
 - C.合适的体位,为了便于抢救,患者以平卧位为主
 - D.遵医嘱正确、合理用药,保证治疗措施有效进行
 - E.营养支持,改善营养状况
- 38.预防 ICU 院内感染的探视管理中,下列说法不正确的是
- A.探视人疑似呼吸道感染,禁止进入 ICU 探视
 - B.探视者进入 ICU 前穿隔离衣
 - C.探视期间尽量避免触摸患者及周围物体表面

- D.探视时间不超过 2 个小时
E.进入病室前后洗手
- 39.低温是降低大脑代谢的有效方法，脑复苏时，要求维持肛温在
A.36°C ~ 32°C
B.34°C ~ 32°C
C.32°C ~ 30°C
D.30°C ~ 28°C
E.28°C ~ 26°C
- 40.重症患者代谢变化的主要改变不包括
A.能量消耗增加
B.糖代谢紊乱
C.蛋白质分解代谢加强
D.脂肪氧化率下降 E.糖类物质氧化率下降
- 41.关于气管内吸痰错误的是
A.应尽量鼓励病人咳痰
B.吸痰前后提高给氧浓度
C.吸痰管直径不超过气管导管内径的 1/2
D.一次持续吸引时间不超过 15 秒
E.一般吸痰负压不超过 300mmHg
- 42.全胃肠道外营养的护理要点哪项不正确()
A.配制必须严格无菌操作
B.营养液应 24 小时内匀速滴入
C.可存放 48h 以上
D.不可在营养液静脉通道采血、给药等
E.每隔 24h 在无菌操作下更换与静脉导管相接的输液管及输液瓶一次
- 43.患者因“有机磷中毒”入院，遵医嘱予静脉注射阿托品，患者达到“阿托品化”的表现不包括（）
A.肺部啰音消失
B.面色潮红
C.皮肤干燥、无汗
D.瞳孔缩小
E.心率增快
- 44.下列哪项不是机械通气时气道高压报警的原因()
A.呛咳
B.肺顺应性增加
C.分泌物过多
D.患者兴奋、激动、想交谈
E.吸入气量太多、报警限设定不当
- 45.气管切开患者描述不准确的是()
A.易于固定
B.病人多能耐受
C.易于口腔护理
D.影响病人进食
E.导管短，管腔大，易于吸痰
- 46.以下哪项不是机械通气患者吸痰指征（）
A.明显分泌物
B.频繁呛咳
C.听诊气管和支气管处有明显痰鸣音
D.可疑为分泌物引起的 SPO₂ 下降（2%）
E.气道峰值压力降低
- 47.心脏骤停早期诊断的最佳指标是（）
A.面色苍白
B.瞳孔散大
C.心音、脉搏消失
D.意识丧失，颈动脉搏动不能摸到
E.呼吸停止
- 48.抢救记录于抢救结束后几小时内补记（）
A.1
B.3
C.5
D.6
E.12
- 49.心肺复苏时气管插管可作为第二给药途径，用药剂量常为静脉剂量的（）倍。
A.1
B.2 ~ 2.5
C.5
D.7
E.10

50. ICU 收治病种不包括 ()
- 恶性肿瘤晚期病人
 - 急性中毒、毒蛇咬伤者
 - 多器官功能衰竭
 - 大面积烧伤者
 - 各种休克
51. 呼吸机相关性肺炎是通常指机械通气 () 或停用机械通气去除人工气道 () 发生的获得性肺炎。
- 48h 后, 48h 之内
 - 48h 之内, 48h 后
 - 4h 后, 48h 之内
 - 48h 之内, 24h 后
 - 24h 后, 24h 之内
52. 正常人的血液 PH 值为 ()
- < 7.35
 - > 7.45
 - 6.9 ~ 7.35
 - 7.35 ~ 7.45
 - 7.45 ~ 8.0
53. 正常人的动脉血气氧分压为 () mmHg。
- 60 ~ 80
 - < 60
 - > 100
 - 80 ~ 100
 - 40 ~ 60
54. 少尿是指 ()
- 尿量 < 400ml/ D
 - 尿量 < 100ml/ D
 - 尿量 < 500ml/ D
 - 尿量 < 1000ml/ D
 - 12 内无尿
55. 正常钾离子水平为 ()
- 3.5 ~ 5.5mmol/L
 - 3.0 ~ 5.0mmol/L
 - 4.0 ~ 5.5mmol/L
 - 3.5 ~ 5.0mmol/L
 - 3.0 ~ 5.5mmol/L
56. ICU 感染率高, 以下感染部位占首位的是 ()
- 呼吸道感染
 - 尿路感染
 - 胃肠道感染
 - 血源性感染
 - 外科手术部位感染
57. 呼吸衰竭常用动脉血气分析来定义, 即 PaO₂ () 60mmHg, 伴或不伴有 PaCO₂ () 50mmHg。
- >, <
 - >, >
 - <, <
 - <, >
 - 以上均不对
58. 正常成人的心率为 () 次/分。
- 50 ~ 100
 - 60 ~ 100
 - 60 ~ 120
 - 50 ~ 120
 - 60 ~ 80
59. 上消化道出血的护理措施中以下不妥的是 ()
- 绝对卧床休息, 保持安静
 - 必要时使用镇痛镇静药物, 可使用吗啡镇痛
 - 休克时采取休克卧位, 注意保暖
 - 需密切监测患者神志瞳孔变化
 - 做好心理护理
60. 肝功能失代偿期最显著的临床表现为 ()
- 腹水
 - 出血
 - 肝性脑病
 - 肝肾综合征
 - 以上都不正确

- 61.关于 ICU 转出指征, 下列说法正确的是 ()
- 急性器官功能障碍已基本纠正, 需要其他专科进一步治疗
 - 患者生命体征稳定, 不需要在 ICU 监护
 - 病情转入慢性状态
 - 患者不能从继续加强监护治疗中获益
 - 以上都是
- 62.张力性气胸最首要的急救措施是 ()
- 胸腔闭式引流
 - 包扎固定, 手术复位
 - 变开放为闭合
 - 减压、扩容、开胸
 - 以上都不对
- 63.用于心肺复苏的药物中, 目前首选的是 ()
- 肾上腺素
 - 利多卡因
 - 阿托品
 - 碳酸氢钠
 - 苯妥因钠
- 64.急性胸痛常见病因不包括 ()
- 不稳定型心绞痛
 - 胆绞痛
 - 主动脉夹层
 - 急性肺栓塞
 - 心肌梗死
- 65.急诊科是急诊急救、重大灾害事件救护的重要场所, 要求相关科室值班人员接到急会诊请求后到位时间 ()
- 1 分钟
 - 10 分钟
 - 5 分钟
 - 15 分钟
 - 30 分钟
- 66.呼吸困难的护理措施一般不包括 ()
- 保持呼吸道通畅
 - 氧疗, CO₂ 潴留需低流量吸氧
 - 建立静脉通路, 保证及时给药
 - 采血培养标本
 - 取舒适体位
- 67.有机磷农药中毒时, 代谢失常的神经递质是 ()
- 多巴胺
 - 乙酰胆碱
 - 5-羟色胺
 - 肾上腺素
 - 去甲肾上腺素
- 68.灾难护理的原则是 ()
- 全面救护与重点救护结合
 - 重点救护
 - 优先救治危重但有生存希望的伤病员
 - 全面救护
 - 最大限度提高伤病员存活率
- 69.急性中毒的急救原则错误的是 ()
- 立即终止接触毒物
 - 清除尚未吸收的毒物
 - 促进毒物的吸收
 - 特殊解毒剂的应用
 - 对症治疗
- 70.意识不清患者气道阻塞最常见的原因是 ()
- 舌后坠
 - 咽喉肿胀
 - 口腔异物
 - 血块
 - 口腔分泌物、呕吐物
- 71.有机磷农药中毒的机制是 ()
- 缺氧
 - 麻醉作用
 - 抑制酶活力
 - 干扰细胞或细胞器的生理功能
 - 受体的竞争
- 72.动脉血二氧化碳分压正常值 ()

- A.30 ~ 40mmHg
 B.35 ~ 45mmHg
 C.40 ~ 50mmHg
 D.50 ~ 60mmHg
 E.60mmHg 以上
- 73.急性肾衰病人高血钾最有效的治疗方法是 ()
 A.输入碳酸氢钠
 B.输入钙剂
 C.血液透析
 D.输入高张葡萄糖加胰岛素
 E.口服钠型阳离子交换树脂
- 74.以下哪项不是气道湿化不足可能导致的结果 ()
 A.纤毛运动受损
 B.粘液的移动受限, 粘稠分泌物阻塞小气道, 发生肺不张
 C.气管支气管粘膜上皮发生炎症性改变甚至坏死
 D.分泌物减少, 减少吸痰次数, 减轻护理工作量
 E.细菌易浸润气管粘膜, 导致肺部感染
- 75.合并喉、气管损伤, 最快、最完全的气道开放办法是 ()
 A.气管内插管
 B.气管切开
 C.环甲膜切开
 D.安放口咽通气管
 E.以上均不
- 76.以下尿液监测说法错误的是 ()
 A.尿量是反映机体重要脏器血液灌注状态的敏感指标
 B.24 小时尿量 < 100ml 为少尿
 C.尿比重的正常值为 1.015 ~ 1.025
 D.尿渗透压的正常值为 600 ~ 1000mOsm/L
 E.尿量 < 17ml/h 即视为少尿
- 77.下列说法正确的是 ()
 A.医院获得性肺炎是指入院时不存在、也不处于潜伏期, 而于入院 48 小时或以后至出院后 48 小时内发生的肺内感染
 B.医院获得性肺炎是指入院时不存在、也不处于潜伏期, 而于入院 24 小时或以后发生的肺内感染
 C.呼吸机相关性肺炎不属于医院获得性肺炎
 D.口咽部定植菌吸入即可引起医院获得性肺炎
 E.革兰氏阳性菌是引发重症患者发生泌尿系统感染的主要细菌
- 78.院前急救的特点不包括 ()
 A.预见性
 B.紧迫性
 C.艰难性
 D.复杂性
 E.灵活性
- 79.急诊患者留观时间原则上不超过多少小时 ()
 A.6 ~ 12
 B.12 ~ 24
 C.24 ~ 48
 D.48 ~ 72
 E.24 ~ 36
- 80.成人心肺复苏时人工呼吸频率应为()次 / 分。
 A.6 ~ 8
 B.8 ~ 10
 C.15 ~ 20
 D.20 ~ 25
 E.25 ~ 30
- 81.下列哪项不是脑出血的危险因素 ()
 A.高血压
 B.动脉炎
 C.高脂血症
 D.感染
 E.吸烟、口服避孕药等
- 82.两侧上肢血压与脉搏不对称, 可能是 ()
 A.心包填塞
 B.肺栓塞
 C.主动脉夹层
 D.高血压
 E.不稳定性心绞痛
- 83.以下哪项不是属于急性肺栓塞 ()
 A.肺血栓栓塞

- B. DVT
C.脂肪栓塞
D.空气栓塞
E.羊水栓塞
- 84.有关呼吸困难的描述不正确的是 ()
A.一口气不间断说话的长度可以标识呼吸困难
B.体位可以提示呼吸困难程度
C.张力性气胸可以导致严重的呼吸困难
D.气管移位可以引起呼吸困难
E.大声呼救说明呼吸困难严重
- 85.有关肺栓塞的护理不准确的是 ()
A.镇静, 绝对卧床休息、保持安静, 以防其他栓子脱落
B.注意观察胸痛部位、诱发因素、严重程度, 必要时遵医嘱应用止痛药物
C.溶栓治疗时密切观察患者有无出血倾向(牙龈、皮肤黏膜、穿刺部位)
D.遵医嘱复查血凝、动脉血气、描记心电图, 判断溶栓效果
E.溶栓治疗期间, 减少静脉穿刺, 拔针时常规压迫止血
- 86.急诊科是急诊急救、重大灾害事件救护的重要场所, 要求急危重症患者在 () 内得到处置。
A.10 分钟
B.1 分钟
C.5 分钟
D.15 分钟
E.30 分钟
- 87.急诊中毒患者, 大多数毒物排出的途径是 ()
A.由肾排出
B.经乳汁排出
C.经粪便从消化道排出
D.经皮肤排出
E.经呼吸道排出
- 88.患者出现开放性气胸时应 ()
A.用无菌无孔敷料封闭胸部伤口
B.辅助呼吸
C.送入抢救室
D.进行气管插管
E.用球囊面罩通气
- 89.急性食入性中毒患者急救错误的是 ()
A.神志清醒患者应给以催吐
B.服毒 4~6 小时洗胃效果最好
C.腐蚀性毒物中毒者禁止洗胃
D.服毒 6 小时以上, 导泻尚未发生作用的重金属所致中毒适用洗肠
E.食道静脉曲张或上消化道出血患者禁忌洗胃
- 90.常用的机械通气模式不包括 ()
A.高频通气
B.间歇正压通气
C.辅助控制通气
D.压力支持通气
E.持续气道正压通气
- 91.患者, 女, 40 岁, 因误食含喷洒有机磷农药的蔬菜而致中毒, 患者出现肌束颤动、牙关紧闭, 抽搐、全身紧束压迫感, 而后发生肌力减退和瘫痪, 呼吸肌麻痹引起周围性呼吸衰竭, 请问此种情况属于 () 症状。
A.毒蕈碱样症状
B.烟碱样症状
C.中枢神经系统
D.中间型综合征
E.中毒后“反跳”现象
- 92.下面哪项指标与肾功能监护关系不密切 ()
A.血尿素氮
B.尿胆红素
C.血肌酐
D.量
E.尿蛋白定量分析
- 93.下列哪项不是引起全身炎症反应的常见感染因素 ()
A.细菌
B.病毒
C.急性胰腺炎
D.真菌
E.寄生虫
- 94.急性百草枯中毒护理错误的是 ()
A.急性百草枯中毒目前尚无特效解毒剂

- B.治疗以减少毒物吸收、促进体内毒物清除
 C.对症支持治疗为主
 D.积极氧疗
 E.用白陶土洗胃后口服吸附剂减少毒物吸收
- 95.下列哪项措施不能预防导尿管相关尿路感染（ ）
 A.严格掌握留置导尿指征
 B.选择适宜的导尿管
 C.妥善固定导尿管
 D.定时进行膀胱冲洗
 E.保持尿道口清洁
- 96.患者女性，40岁。田间喷洒农药时因头晕继而昏迷来院治疗。请问抢救急性有机磷农药中毒清洗皮肤时宜采用的溶液是用（ ）
 A.热水
 B.肥皂水
 C.乙醇
 D.苏打水
 E.温水
- 97.建立人工气道的指征不包括（ ）
 A.上呼吸道梗阻
 B.气道保护性机制受损
 C.清除气道分泌物
 D.反复咳嗽
 E.为机械通气提供通道
- 98.患者，男，3岁。进食豆粒时不慎呛咳，随即出现呼吸困难，面色发绀，神志不清。护士应采取的护理措施是（ ）
 A.给予吸氧
 B.人工呼吸
 C.用吸痰器清理呼吸道
 D.将患儿平卧，头偏向一侧
 E.做好协助气管取异物的准备
- 99.急危重症护理学的基础（ ）
 A.现代临床医学、临床护理理论
 B.现代急诊医学、急诊护理理论
 C.现代医学科学、护理学专业理论
 D.现在重症医学、重症护理理论
 E.以上都对
- 100.一氧化碳中毒患者的皮肤发生的特征性改变是（ ）
 A.青紫色
 B.樱桃红色
 C.紫黑色
 D.草绿色
 E.灰白色
101. AR DS 的病人在使用呼吸机时，若通气过度可出现（ ）
 A.呼吸浅快
 B.浅表静脉充盈消失
 C.皮肤潮红，多汗
 D.呼吸性酸中毒
 E.呼吸性碱中毒
- 102.急诊科管理的核心（ ）
 A.急诊服务质量管理
 B.急诊服务效率管理
 C.急诊护理满意度管理
 D.急诊护理技术管理
 E.急诊护理工作质量管理
- 103.ST ART 检伤分类法是灾难现场最常用的分类方法，分为红、黄、绿、黑四组，需要在1小时内接受治疗的是（ ）
 A.绿
 B.黄
 C.红
 D.黑
 E.无先后顺序
- 104.有机磷农药中毒使用胆碱酯酶复活剂注射速度过快可造成（ ）
 A.心脏骤停
 B.暂时性呼吸抑制
 C.室性早搏
 D.室颤
 E.血压升高
- 105.急诊患者救治过程中第一个重要环节是（ ）

- A. 急诊分诊
 - B. 开放气道
 - C. 维持循环
 - D. 转运至抢救室
 - E. 测量生命体征
106. 急诊护理评估时，什么情况下应进行次级评估（ ）
- A. 患者病情严重
 - B. 患者出现生命危险
 - C. 患者意识不清
 - D. 患者生命体征波动大
 - E. 患者初步平稳，无生命危险
107. 急诊护理评估中，次级评估患者精神，不包括（ ）
- A. 精神状态
 - B. 说话能力
 - C. 外表
 - D. 意识状况
 - E. 行为
108. 对室颤最有效的治疗方法是（ ）
- A. 电击除颤
 - B. 心前区锤击
 - C. 药物治疗
 - D. 启动 EMS 系统
 - E. 心肺复苏
109. ARDS 患者初期表现不正确的是（ ）
- A. 呼吸困难
 - B. 呼吸频率加快
 - C. 动脉血氧分压下降
 - D. 呼吸有窘迫感
 - E. 一般性给氧病情能缓解
110. 当出血量超过多少时，出现全身症状，头晕、心慌、冷汗、乏力、口干等症状（ ）
- A. 400ml 以下
 - B. 400 ~ 500ml
 - C. 1000ml 以上
 - D. 300ml 以下
 - E. 1500ml 以上
111. 有效并作用最快的终止心绞痛发作的药物是（ ）
- A. 硝苯地平
 - B. 硝酸甘油
 - C. 硝普钠
 - D. 合心爽
 - E. 美托洛尔
112. 患儿，男，3 岁，诊断支气管异物。采用内镜检查取出异物后家长咨询可以进食的时间，护士的正确解答是（ ）
- A. 30 分钟后
 - B. 1 小时后
 - C. 2 小时后
 - D. 3 小时后
 - E. 4 小时后
113. 腹膜炎最主要的体征是（ ）
- A. 腹胀
 - B. 腹式呼吸减弱或消失
 - C. 压痛、反跳痛、肌紧张
 - D. 肠音减弱或消失
 - E. 恶心呕吐
114. 腹部损伤有合并以下问题时，应优先处理的是（ ）
- A. 窒息
 - B. 气胸
 - C. 昏迷
 - D. 止血
 - E. 休克
115. “生存链”内容中不包括以下哪一项（ ）
- A. 早期通路
 - B. 早期启动急救反应系统
 - C. 早期心肺复苏
 - D. 早期高级生命支持
 - E. 早期除颤
116. 预防机械通气患者并发院内感染的护理措施有（ ）
- A. 加强呼吸道管理，防止咽部滞留物误吸入下呼吸道

- B.医护人员在吸痰、气管插管、气管切开等操作之前认真洗手，严格无菌操作
 C.抬高患者头部，防止胃液返流和吸入胃内溶液
 D.口腔护理
 E.以上均是
- 117.脾破裂的患者需进行的是（ ）
 A.急诊手术
 B.择期手术
 C.限期手术 D.美容手术
 E.抗炎治疗
- 118.急性心力衰竭的病因不包括（ ）
 A.急性广泛心肌梗死
 B.高血压急症
 C.严重心律失常
 D.洋地黄中毒
 E.输液过快过多
- 119.下列哪项临床表现支持心肌梗死的诊断（ ）
 A.胸痛持续小于 15 分钟
 B.胸痛小于半小时
 C.血清肌酸磷酸激酶升高
 D.心电图 ST 段弓背向下抬高
 E.呼吸困难，咯粉红色泡沫痰
- 120.单相波除颤首次选用电除颤能量为（ ）
 A.360J
 B.200J
 C.300J
 D.120J
 E. > 120J
- 121.氰化物中毒选用的解毒药为（ ）
 A.亚硝酸铁
 B.亚硝酸镁
 C.亚硝酸钠
 D.硝酸钠
 E.活性炭
- 122.阿托品中毒可引起（ ）
 A.瞳孔扩大
 B.瞳孔缩小
 C.流涎
 D.失明
 E.脸色苍白
- 123.巴比妥类药物中毒时，可用的导泻药是（ ）
 A.硫酸镁
 B.0.01%~0.02%高锰酸钾溶液
 C.硫酸钠
 D.1%~5%碳酸氢钠溶液
 E.甘露醇
- 124.浅 II 度创面临床表现是（ ）
 A.轻度发红、轻痛，无水疱
 B.剧痛，创面均匀发红，有水疱
 C.痛觉迟钝，创面苍白，有水疱
 D.痛觉迟钝，创面苍白，无水疱
 E.麻木、创面苍白，有水疱
- 125.无尿是指（ ）
 A.尿量 < 400ml/ D
 B.尿量 < 100ml/ D
 C.尿量 < 500ml/ D
 D.尿量 < 1000ml/ D
 E.尿量 < 200ml/ D
- 126.多发伤的并发症中发病率最高的是（ ）
 A.颅脑损伤
 B.胸腹脏器损伤
 C.休克
 D.感染
 E.心衰
- 127.颅内压轻度增高，是指（ ）
 A.ICP > 40mmHg
 B.ICP: 31~40mmHg
 C.ICP: 21~30mmHg
 D.ICP: 15~20mmHg

- E. ICP < 15mmHg
128. 肠外营养最常见的并发症是 ()
- A. 置管操作相关的并发症
 - B. 空气栓塞
 - C. 导管堵塞
 - D. 感染性并发症
 - E. 代谢性并发症
129. 肠外营养最严重的并发症是 ()
- A. 置管操作相关的并发症
 - B. 空气栓塞
 - C. 导管堵塞
 - D. 感染性并发症
 - E. 代谢性并发症
130. 观察呼吸机工作是否正常, 下列做法不妥的是 ()
- A. 各管道连接是否紧密
 - B. 随时检查有无脱落
 - C. 各参数是否与病情符合
 - D. 发现异常情况停止使用
 - E. 及时检查有无漏气
131. 下列关于气管内插管叙述不正确的是 ()
- A. 临床急救中最常用的是经口明视插管术
 - B. 成人经口气管插管深度为距门齿 22 ± 2 cm
 - C. 成人经鼻气管插管深度为 27 ± 2 cm
 - D. 成人经鼻气管插管深度为 22 ± 2 cm
 - E. 气管插管套囊压力需保持在 $25 \sim 30$ cmH₂O
132. 下列哪项不是机械通气常用设置参数 ()
- A. 潮气量
 - B. 呼吸频率
 - C. 触发灵敏度
 - D. 吸呼比
 - E. 呼气末正压
133. 某患者血气结果如下: pH7.45, HCO₃⁻15mmol/L, PaCO₂60mmHg, 该患者可能发生 ()
- A. 呼吸性酸中毒
 - B. 呼吸性碱中毒
 - C. 代谢性酸中毒
 - D. 代谢性碱中毒
 - E. 混合型酸碱失衡
134. 处理 MODS 的首要治疗措施是 ()
- A. 病因治疗
 - B. 对抗炎症介质
 - C. 营养支持和器官功能支持
 - D. 中和毒素
 - E. 补充血容量
135. EMSS (急救医疗服务体系) 不包括 ()
- A. 现场急救
 - B. 院前急救
 - C. 院内急诊科诊治
 - D. 各专科的“生命绿色通道”
 - E. 重症监护病房 (ICU) 救治
136. 什么情况下病人会因开通气道而恢复呼吸心跳? ()
- A. 呼吸道梗阻
 - B. 心肌梗死的猝死
 - C. 多发伤
 - D. 休克
 - E. 电击
137. 心肺脑复苏中的“基础生命支持”不包括 ()
- A. 保持气道畅通
 - B. 人工呼吸
 - C. 建立人工循环
 - D. 开放气道与通气支持
 - E. 机械辅助通气
138. 神志清的 MODS 病人, 心理障碍干预措施不包括 ()
- A. 与病人沟通
 - B. 尊重病人人格
 - C. 家属的支持
 - D. 精神抚慰
 - E. 注意监测参数变化
139. 常见的水电解质紊乱类型不包括 ()

- A.等渗性失水
 - B.低渗性失水
 - C.高渗性失水
 - D.高钾血症
 - E.低蛋白血症
- 140.影响颅内压的因素不包括 ()
- A.PaCO₂
 - B.PaO₂
 - C.HR
 - D.血压
 - E. CVP
- 141.患者行有创机械通气时, 以下哪项不是反映气道压力的监测指标 ()
- A.支持压力
 - B.气道峰压
 - C.平均气道压
 - D.平台压
 - E.呼气末正压
- 142.以下哪项不是心脏骤停时的心电图表现 ()
- A.室颤
 - B.无脉性室速
 - C.电-机械分离
 - D.心室静止
 - E.室上性心动过速
- 143.患者, 男性, 55 岁, 因脑外伤, 在全麻下行开颅探查术。术后患者气管插管患者用人工呼吸器辅助呼吸。请问人工呼吸器套囊内的气体隔几小时放一次 ()
- A.1 小时
 - B.2 小时
 - C.3 小时
 - D.4 小时
 - E.5 小时
- 144.成人胸外心脏按压必须同时配合人工呼吸, 按压/通气比的要求为 ()
- A.10 : 1
 - B.30 : 2
 - C.15 : 1
 - D.15 : 2
 - E.20 : 2
- 145.增加氧耗的因素包括 ()
- A.严重感染
 - B.高热
 - C.呼吸窘迫
 - D.剧烈运动
 - E.以上都是
- 146.心室颤动患者的脉搏特征是()
- A.快而规则
 - B.慢而规则
 - C.快而不规则
 - D.慢而不规则
 - E.摸不到
- 147.关于无创血压监测, 下列不正确的是()
- A.无创伤性, 重复性好
 - B.自动测压, 省时省力, 易掌握
 - C.能间接判断是否有心律失常
 - D.自动检测血压袖带的大小, 测量平均动脉压准确
 - E.可引起肢体神经缺血、麻木等并发症
- 148.有创动脉测压首选测压途径是 ()
- A.桡动脉
 - B.足背动脉
 - C.肱动脉
 - D.尺动脉
 - E.股动脉
- 149.多发伤的临床特点不包括 ()
- A.伤情外露明显、易于观察处理
 - B.休克发生率高
 - C.低氧血症发生率高
 - D.并发症发生率高
 - E.感染发生率高
- 150.关于中心静脉压的临床意义, 表述不正确的是 ()
- A. CVP < 5cmH₂O, 表示血容量不足时, 应迅速补充血容量

- B. CVP 在 15 ~ 20cmH₂O 时, 常见于右心衰、三尖瓣关闭不全、心包填塞或补液过快过多
 C. CVP < 5cmH₂O, 必须立即迅速补充血容量
 D. CVP > 20cmH₂O 时, 应暂停输液或严格控制输液速度, 并给予强心、利尿等处理
 E. 临床中应结合血压变化综合分析判断 CVP 的临床意义
151. 急诊医学发展最快的国家是 ()
 A. 德国
 B. 日本
 C. 美国
 D. 芬兰
 E. 加拿大
152. 反映急救速度的主要客观指标是 ()
 A. 急救中心的面积
 B. 服务区域
 C. 平均反应时间
 D. 基本设施
 E. 基本设备
153. 在大批伤员中, 对于四肢动脉大出血的病人应用何种颜色进行标记 ()
 A. 绿色
 B. 黄色
 C. 棕色
 D. 红色
 E. 黑色
154. 怀疑有颈椎或脊椎损伤的病人, 在搬运时下列哪项错误 ()
 A. 尽可能用颈托固定颈部
 B. 搬运时应固定头部, 避免摇摆
 C. 可用海绵垫抬动
 D. 保持脊椎的轴线稳定
 E. 将病人固定在硬板担架上搬运
155. 下列哪项不属于“生命链”的环节 ()
 A. 早期通路
 B. 早期心肺复苏
 C. 早期转送
 D. 早期心脏除颤
 E. 早期高级生命支持
156. 在现场救护时, 下列哪项对病人采取的体位不正确 ()
 A. 现场需心肺复苏者应至于复苏体位
 B. 毒蛇咬伤时应放低患肢
 C. 昏迷病人仰卧位
 D. 咯血者向患侧卧位
 E. 脚扭伤应抬高患肢
157. 现场救护人员判断伤者有无意识, 正确的方法是 ()
 A. 轻拍伤病员的两侧肩部, 大声呼唤
 B. 摇晃伤病员身体, 大声呼唤
 C. 看伤病员瞳孔
 D. 测伤病员脉搏
 E. 测血压
158. 开放气道时, 儿童头部后仰的角度为下颌角与耳垂连线与地面成 ()
 A. 90°角
 B. 60°角
 C. 30°角
 D. 45°角
 E. 0°角
159. 判断心跳骤停, 最简便快捷的方法是 ()
 A. 血压测不到
 B. 神志突然消失
 C. 呼吸突然停止
 D. 大动脉搏动消失
 E. 动脉搏动消失
160. 在基础生命支持评估循环情况时, 触摸颈动脉的时间不应超过 ()
 A. 5 秒钟
 B. 10 秒钟
 C. 15 秒钟
 D. 20 秒钟
 E. 25 秒钟
161. 成人胸外按压时, 胸廓下压的幅度为 ()
 A. 1 ~ 2cm
 B. 2 ~ 3cm
 C. 3 ~ 4cm

- D.4 ~ 5cm
E.5 ~ 6cm
- 162.成人胸外心脏按压的频率正确的是 ()
A.60 次/分
B.80 次/分
C.100 次/分
D.100 ~ 120 次/分
E.大于 120 次/分
- 163.使用止血带止血时, 连续使用最长不超过多长时间 ()
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
E.5h
- 164.担架搬运时 ()
A.伤员头部在前, 足部在后
B.伤员头部在后, 足部在前
C.伤员俯卧, 足部在前
D.伤员仰卧, 足部在前
E.以上都可以
- 165.下列哪项为气道异物梗阻的特殊表现为 ()
A.呼吸困难
B.面色紫绀
C.剧烈呛咳
D.“V”形手势
E.昏迷倒地
- 166.婴儿发生气道梗阻时, 采用的急救方法正确的是 ()
A.背部叩击、胸部冲击法
B.立位腹部冲击法
C.卧位腹部冲击法
D.立位胸部冲击法
E.卧位胸部冲击法
- 167.气管插管时间不宜超过 ()
A.6h
B.12h
C.24h
D.36h
E.72h
- 168.患者, 女, 50 岁。冬天在家用煤炉烤火时出现浅昏迷症状, 心率 130 次/分, 皮肤多汗, 面色潮红, 120 送至医院。初步考虑为一氧化碳中毒。请问此时患者最容易遭受损害的脏器为 ()
A.肺和脑
B.脑和心
C.肾
D.胰腺
E.肾和肺
- 169.患者, 男, 50 岁, 农药厂工人, 在生产有机磷农药工作中违反操作规定, 出现有机磷农药中毒, 使用阿托品治疗时出现瞳孔扩大, 颜面潮红, 口干, 皮肤干燥, 肺部湿啰音消失, 心率加快现象, 阿托品用法是 ()
A.立即停药
B.逐渐减量直到症状消失后停药
C.继续原剂量治疗直到症状消失后停药
D.逐渐减量直到症状消失后 24H 停药
E.继续原剂量治 24H 后停药
- 170.急性有机磷中毒的患者, 医嘱给予阿托品静脉注射, 在给药后患者最可能出现 ()
A.口干
B.血压下降
C.心率减慢
D.出汗增多
E.呼吸加快
- 171.李先生, 42 岁。山体滑坡掩埋现场救出, 呼吸微弱。查体: 意识淡漠, 面色发绀, 口鼻有泥土, 右小腿变形, 皮肤伤口出血。应首先处理的是 ()
A.清理呼吸道, 清除口鼻异物
B.人工辅助呼吸
C.清创
D.止血
E.骨折固定
- 172.患者, 女, 20 岁, 不慎落入海里, 15min 前获救, “120”医护人员发现患者剧烈咳嗽、皮肤发绀、烦躁不安、颜面肿胀、球结膜充血、双肺闻及干湿啰音。下列措施不正确的是 ()

- A.通畅呼吸道
 - B.给予高流量吸氧
 - C.碱化尿液
 - D.脑复苏
 - E.快速补充生理盐水或平衡溶液以稀释血液
- 173.患者，男，45岁，农民，因在高温闷热环境下进行劳作，近日出现全身乏力，体温高达40℃以上，同时出现谵妄、抽搐，皮肤无汗症状，入院后诊断为热射病。请问其首要的治疗措施为（ ）
- A.降温
 - B.吸氧
 - C.抗休克
 - D.治疗脑水肿
 - E.纠正水、电解质紊乱
- 174.患者，男性，55岁。车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是（ ）
- A.开放性骨折
 - B.腹部外伤后肠管脱出
 - C.外伤性大出血
 - D.颅脑外伤
 - E.膀胱破裂
- 175.患儿，女，11岁，水塘边玩耍时不慎溺水，现意识丧失，呼吸停止，护理人员到达现场急救后应立即采取的处理措施是（ ）
- A.人工呼吸
 - B.胸外心脏按压
 - C.清除口鼻腔分泌物和异物
 - D.建立静脉通路
 - E.寻求医生帮助
- 176.患者女性，45岁。因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是（ ）
- A.休克
 - B.窒息
 - C.肺部感染
 - D.肾衰竭
 - E.脱水、酸中毒

七、健康评估

单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项，选项中有一个答案是正确的，参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂，多选、少选或不选均不得分。

- 1.患者，女，20岁，就诊后叙述其腹部疼痛2h，出现发热、呕吐半小时，其主诉为（ ）
- A.腹痛2h，伴发热、呕吐30min
 - B.腹痛、发热、呕吐
 - C.发热、呕吐半小时，腹痛3h
 - D.腹痛2h，发热、呕吐
 - E.发热、呕吐及腹痛
- 2.患者，女，45岁，卵巢囊肿，新入院。护士收集资料时，询问“您是否绝经了？”这一提问属于（ ）
- A.间接提问
 - B.主动提问
 - C.开放式提问
 - D.闭合性提问
 - E.过渡性提问
- 3.患者，男，64岁，护士在与患者交谈中，当患者说道“我今天早上大便颜色特别黑”时，护士问道：“你刚才说你大便怎么了？”此护士特别运用了交谈技巧中的（ ）
- A.耐心倾听
 - B.仔细核对
 - C.详细阐释
 - D.及时鼓励
 - E.封闭式提问
- 4.患者，女，38岁。患“胃溃疡”3年，现呕血600ml，心悸气促，脉搏细速。体检：精神萎靡，皮肤干燥。T36.5℃，P108次/min，R24次/min，BP80/60mmHg。以下属于主观资料的是（ ）
- A.皮肤干燥
 - B.心悸气促
 - C.精神萎靡
 - D.血压下降

E. T36.5°C

5. 患者，男性，76岁。慢性支气管炎24年，自诉发热、咳嗽，咳黄色粘痰5天，自觉咳嗽无力，痰液粘稠不易咳出。吸烟40年，20支/天，难以戒除。体检：精神萎靡，皮肤干燥，体温38.7°C，BP 140/90mmHg，肺部听诊可闻及干、湿性啰音。以下属于主观资料的是（ ）
- A. 皮肤干燥
 - B. BP 140/90mmHg
 - C. 体温 38.7°C
 - D. 无力咳嗽
 - E. 肺部干、湿性啰音
6. 某患者听诊发现肺部呼吸音呈柔和吹风样性质，吸气较强，音调较高，呼气较吸气持续时间长，应判断为（ ）
- A. 正常肺泡呼吸音
 - B. 正常支气管呼吸音
 - C. 支气管肺泡呼吸音
 - D. 肺泡呼吸音，呼气时间延长
 - E. 肺泡呼吸音，吸气时间延长
7. 患者，男，56岁。气促，诊断为右侧大量胸腔积液。该患者多采用何种体位？（ ）
- A. 左侧卧位
 - B. 被动体位
 - C. 强迫坐位
 - D. 右侧卧位
 - E. 主动侧卧位
8. 患者，女，35岁。面色晦暗，双颊紫红，口唇轻度发绀，该患者为何种面容？（ ）
- A. 病危面容
 - B. 肝病面容
 - C. 肾病面容
 - D. 二尖瓣面容
 - E. 急性面容
9. 患者，男，31岁。淋雨后出现高热、畏寒、咳嗽、咳铁锈色痰、胸痛5天。查体：急性病容，右肺呼吸动度减弱，语颤增强，右下肺可闻及支气管呼吸音及胸膜摩擦音，可能的诊断为（ ）
- A. 大叶性肺炎
 - B. 支气管炎并胸腔积液
 - C. 大叶性肺炎并胸膜炎
 - D. 胸膜炎
 - E. 肺结核
10. 患者，男，20岁。搬重物后出现右胸剧烈疼痛并进行性呼吸困难3小时，查体：瘦长体型，口唇发绀，气管左偏，右侧胸廓饱满及叩鼓音，右侧呼吸音消失。可能的诊断为（ ）
- A. 胸腔积液
 - B. 大叶性肺炎
 - C. 干性胸膜炎
 - D. 气胸
 - E. 肺气肿
11. 患者，男，41岁。在进行健康体检时发现该患者为矮胖体型，叩诊其肺下界在锁骨中线、腋中线、肩胛下角线分别为第5、7、9肋间隙，最可能的原因是（ ）
- A. 双侧胸腔积液
 - B. 双下肺支气管肺炎
 - C. 正常情况
 - D. 肺气肿
 - E. 肠胀气
12. 患者，男，32岁。发热一周伴胸闷、心悸、气急3日入院。吸气时脉搏显著减弱或消失，提示（ ）
- A. 心包积液
 - B. 气胸
 - C. 主动脉瓣关闭不全
 - D. 右心衰竭
 - E. 心房颤动
13. 患者，女，8岁。玩耍时突发严重呼吸困难、发绀8分钟而送来医院急诊。体检：呈吸气性呼吸困难，并有“三凹征”，应首先考虑（ ）
- A. 气管内异物
 - B. 支气管哮喘
 - C. 气胸
 - D. 慢性支气管炎
 - E. 急性胸膜炎

- 14.患者,女,38岁。身体评估发现心尖搏动位于左侧第6肋间锁骨中线外3厘米处,呈抬举感,提示()
- 左心室扩大
 - 右心室肥大
 - 心包积液
 - 左心房扩大
 - 左心室肥大
- 15.患者,女,33岁。心脏叩诊左侧第3肋间浊界扩大,心界呈梨形,应考虑为()
- 主动脉瓣关闭不全
 - 二尖瓣狭窄
 - 心包积液
 - 高血压性心脏病
 - 二尖瓣关闭不全
- 16.患者,女,36岁。昨日后半夜至今晨上腹部饱胀不适,疼痛伴恶心。身体评估查及上腹部胃形和蠕动波。最可能的病情是()
- 幽门梗阻
 - 麻痹性肠梗阻
 - 急性腹膜炎
 - 大量腹腔积液
 - 气腹
- 17.患者,女,40岁。因急性上腹痛8小时入院,身体评估查及脐与右髂前上棘连线的外、中1/3交界处有压痛。首先应考虑()
- 结石病
 - 急性阑尾炎
 - 右侧卵巢囊肿
 - 十二指肠溃疡穿孔
 - 右侧输尿管结石
- 18.患者,女,50岁。因食欲不振,腹胀,双下肢浮肿2周入院。身体评估结果:双下肢水肿,腹部膨隆,移动性浊音阳性,肝右肋下2cm,质地II度,表面有结节。最可能的病情是()
- 肝硬化
 - 急性腹膜炎
 - 心源性水肿
 - 肾性水肿
 - 营养不良
- 19.患者,女,45岁。颜面浮肿、目光呆滞,反应迟钝,眉毛、头发稀疏,体温36°C,血压96/66mmHg。应考虑()
- 甲状腺功能减退
 - 感染
 - 恶性肿瘤
 - 内出血
 - 抗原抗体反应
- 20.患者,女,50岁。因右上腹隐痛2周来医院就诊,护士在对其进行身体评估时发现:肝肋下2cm,质软有压痛,肝颈静脉回流征阳性。最可能为()
- 急性肝炎
 - 慢性肝炎
 - 肝硬化
 - 肝淤血
 - 原发性肝癌
- 21.患者,女,37岁。因胃穿孔引起急性腹膜炎,下列哪项是其最主要的体征()
- 腹式呼吸减弱
 - 腹膜刺激征
 - 移动性浊音阳性
 - 肠鸣音消失
 - 腹部可见肠型
- 22.患者,男,32岁。呼吸深大,22次/min,既往糖尿病病史20余年。首先应考虑()
- 发热
 - 颅内压增高
 - 休克
 - 糖尿病酮症酸中毒
 - 甲状腺功能亢进
- 23.患者,男,58岁,护士在为其进行身体评估时发现,该患者左锁骨上有1个鸡蛋大小的无痛性淋巴结肿大,质地坚硬。以下哪项为可能的诊断()
- 乳癌

- B.肺癌
C.胃癌
D.鼻咽癌
E.骨肉瘤
- 24.某患者因上腹部胀痛不适，清晨未进食来院就诊，检查发现上腹部有振水音。该患者最可能是（ ）
A. 正常情况
B. 胃内大量液体潴留
C. 腹腔内有大量液体
D. 胃内有大量气体
E. 腹腔内有气体
- 25.患者，男，70岁。胸部体检示胸廓前后径明显增宽，肋间隙饱满，腹上角增大。此胸廓形态为（ ）
A. 漏斗胸
B. 扁平胸
C. 桶状胸
D. 鸡胸
E. 正常
- 26.患者，男，28岁。车祸外伤后处于沉睡状态，不易被唤醒，仅在护士给其静脉输液扎针时苏醒片刻，但答非所问，很快又入睡。意识状态应评估为（ ）
A.意识模糊
B.谵妄
C.昏睡
D.嗜睡
E.浅昏迷
- 27.患者，男，38岁。消化性溃疡多年。今日行大便隐血试验检查，结果为阳性，提示该患者24小时消化道出血量至少（ ）
A.5mL 以上
B.10mL 以上
C.30mL 以上
D.50mL 以上
E.70mL 以上
- 28.男，68岁，昏迷，皮肤粘膜呈樱红色，应首先考虑（ ）
A.中暑
B.一氧化碳中毒
C.亚硝酸盐中毒
D.有机磷中毒
E.猩红热
- 29.患者，女，56岁，于静脉输液后出现两肺布满湿啰音，患者可能发生了（ ）
A.支气管哮喘
B.支气管扩张
C.胸腔积液
D.急性肺水肿
E.肺气肿
- 30.王女士，35岁，末端指节增宽、增厚，指甲从根部到末端呈拱形隆起，应考虑（ ）
A.缺铁性贫血
B.发绀型先天性心脏病
C.肢端肥大症
D.指关节变形
E.关节畸形
- 31.患者，男，52岁。单位体检时乙肝五项检查结果如下表所示，对结果的解释正确的是（ ）
检验项目结果参考值：
1 乙肝表面抗原(-)
2 乙肝表面抗体(+)
3 乙肝 e 抗原(-)
4 乙肝 e 抗体(-)
5 乙肝核心抗体(-)
A.为乙肝患者，并具有交叉传染性
B.为慢性乙肝患者
C.患者预防接种过乙肝疫苗
D.为乙肝患者，但病情稳定，传染性弱
E.为急性乙肝患者
- 32.患者男性，56岁。自诉心慌，心电图：提前出现 P'波，其形态与窦性 P 波不同，QRS

形态正常，其后有不完全代偿间歇。该患者的心电图诊断为（ ）

- A.房性期前收缩
- B.室性期前收缩
- C.心房扑动 D.心房颤动
- E.房室传导阻滞

33.患者女性，67岁。因“脑梗死”入院。为其进行身体评估时发现：患者随意运动消失，对声、光等刺激毫无反应，但给予强刺激时患者有痛苦表情、呻吟等反应。该患者的意识障碍处于（ ）

- A.嗜睡
- B.昏睡
- C.意识模糊
- D.浅昏迷
- E.深昏迷

34.患者，女，59岁。患有慢性胃溃疡，近日感到胃部疼痛，发现大便颜色发黑，医生告诉患者准备做隐血试验。下列哪种食物不能吃（ ）

- A.大米稀饭
- B.面包
- C.油条
- D.瘦肉
- E.豆腐

35.患者，女，18岁。淋雨后寒战、高热3日。白细胞计数 $14 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.90。最可能是（ ）

- A.化脓菌感染
- B.革兰阴性杆菌感染
- C.病毒感染
- D.厌氧菌感染
- E.粒细胞白血病

36.患者，女，58岁。护士在进行体格检查时发现，该女士胸骨左缘第二肋间可触及收缩期震颤，可见于（ ）

- A.室间隔缺损
- B.二尖瓣狭窄
- C.肺动脉瓣狭窄
- D.主动脉瓣狭窄
- E.动脉导管未闭

37.患者，男，48岁。在健康体检时，发现其心电图 R-R 间隔平均为 0.75 秒，其心率为（ ）

- A.60 次/分
- B.70 次/分
- C.80 次/分
- D.90 次/分
- E.100 次/分

38.患者，男，45岁，患有冠心病，护士在给他做心电图时，其中，探查电极置于左锁骨中线第五肋间的导联是（ ）

- A.V1
- B.V2
- C.V3
- D.V4
- E.V5

39.患者，女性，28岁，已婚。因反复月经过多、经期过长致头昏、疲乏无力入院。护理体检：慢性面容，睑结膜苍白，皮肤干燥、无光泽，心率 102 次/分。红细胞 $2.9 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 60g/L，白细胞和血小板正常。诊断贫血最可靠的指标是（ ）

- A.红细胞计数
- B.网织红细胞计数
- C.血红蛋白测定
- D.红细胞比容
- E.睑结膜苍白

40.患者，男性，56岁。为该患者进行心脏叩诊时发现，该患者心浊音界呈梨形，请问梨形心脏的特点是（ ）

- A.心腰部呈钝角
- B.心腰部呈尖角
- C.心腰部呈直角
- D.心腰部呈圆角
- E.心腰饱满或膨出

41.病人越某，男，47岁，平日身体健康，但爱饮酒、吸烟，有心脏病家族史。近日因工作压力大，上下

级关系不协调,开始出现失眠、食欲不振、急躁易怒,血压 164/92mmHg。评估病人时注意目前下列哪项不是他的主要压力。()

- A.工作紧张
- B.上下级关系
- C.失眠
- D.食欲不振
- E.心脏病家族史

42. 病人王某,82岁,在家突然昏倒,即送医院,诊断为脑血管意外。经抢救王先生意识恢复,但左侧肢体不能自主活动,出现偏瘫。王太太十分焦急,询问责任护士王先生的恢复情况,下列回答正确的是:()

- A.“很难说,但多数病人至少需要一年以上才能痊愈。”
- B.“你好象对是否能恢复你们过去的生活方式很焦虑。”
- C.“担心是否能痊愈是很正常的。康复需要时间,我们共同努力。”
- D.“你有些焦虑是正常的,但是没办法估计你丈夫的恢复情况。”
- E.“不要急,王先生很快就会恢复正常。”

43. 病人李某,男,60岁,丧偶,家庭经济状况一般。诊断:慢性肾功能不全。李某入院后稍有不满意就会发脾气,愤怒地指责别人,有时还拒绝治疗护理。针对李某目前的状况应选择哪项护理措施()

- A.通知医生,对其病情解释
- B.允许陪客,使其有安全感
- C.注射镇痛剂,稳定情绪
- D.让期独处,不予理睬
- E.耐心听取病人倾诉,给予解释和安慰

44. 护士在与一位病人交谈时,病人说:“我感觉今天天气很闷热,心脏不舒服”。护士问道:“您刚才说您心脏不舒服吗?”此时护士主要运用了交谈技巧中的()

- A.倾听
- B.核实
- C.阐释
- D.鼓励
- E.提问

45. 李某,女性,28岁。住院期间得知自己患了不治之症,情绪低落,时常哭泣。对其最适宜的护理措施是()

- A.通知主管医生
- B.主动找病人交谈
- C.注射镇静剂
- D.鼓励病人倾诉
- E.置之不理

46. 张先生,67岁。以“慢性阻塞性肺气肿”收住院。护士评估后认为该病人存在下列护理问题,其中首要护理问题是()

- A.清理呼吸道无效
- B.焦虑
- C.知识缺乏
- D.个人应对无效
- E.营养失调

47. 孙先生,68岁。因“心绞痛”急诊入院。病人情绪紧张,主诉乏力,食欲不振。护士评估病人存在以下护理问题,需要首先解决的是()

- A.活动无耐力
- B.有便秘的危险
- C.疲乏
- D.疼痛
- E.焦虑

48. 田女士,25岁。“急性有机磷中毒”入院,护士查体时发现其呼出的气体有大蒜味。护士收集料的方法属于

- A.视觉观察法
- B.触觉观察法
- C.听觉观察法
- D.嗅觉观察法
- E.味觉观察法

八、护理伦理及其他

单项选择题。每题含 A、B、C、D、E 五个选项,选项中有一个答案是正确的,参赛选手应将正确的选项选择出来并按要求在答题卡相应位置填涂,多选、少选或不选均不得分。

1. 患护士小张，某三甲医院注册护士。执行医嘱时错误的将 10%氯化钾 10ml 静脉推注，导致病人推注中途死亡。此事件属于 ()
 - A. 护理事故
 - B. 侵权行为
 - C. 护理风险
 - D. 护理差错
 - E. 护理预防
2. 患者，男性，32 岁，车祸重伤被送去医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续，当病人家属拿钱来时，已经错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案违背了病人的 ()
 - A. 享有自主权
 - B. 享有知情同意权
 - C. 享有保密和隐私权
 - D. 享有基本的医疗权
 - E. 享有参与治疗权
3. 患者，女性，30 岁，因左侧乳腺癌住院行根治术。术中同时为右侧乳房一个不明显硬节也作了常规冰冻病理切片，结果提示：右侧乳房小肿块部分癌变，此时，医生的最佳伦理选择是 ()
 - A. 以人道原则，行右乳大部分切除术
 - B. 依救死扶伤原则，行右乳大部分切除术
 - C. 依有利原则，行右乳根治术
 - D. 依知情同意原则，不再行右乳癌切除术
 - E. 依知情同意原则，行右乳大部分切除术
4. 患者，男性，73 岁，肝癌病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，寄希望于治疗，病情进展和疼痛发作时，多次要求医生给予明确说法和治疗措施。此时医生最佳的理论选择是 ()
 - A. 正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
 - B. 恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病逝
 - C. 遵循病人自主原则，全面满足病人要求
 - D. 根据知情同意原则，应该告知病人所有信息
 - E. 依据有利原则，劝导病人使用一些民间土方
5. 患者，男性，65 岁，足部患有严重溃疡的糖尿病人，经治疗病情未减轻，且有发生败血症的危险，此时为保证病人的生命而需要对病人截肢。这里包含的冲突是 ()
 - A. 行善原则与公正原则的冲突
 - B. 行善原则与尊重原则的冲突
 - C. 不伤害原则与行善原则的冲突
 - D. 不伤害原则与公正原则的冲突
 - E. 不伤害原则与尊重原则的冲突
6. 患者，男性，3 岁。患急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，即将出院。其父母觉得小儿虚弱，需要输液，医生同意了可护士为了快点交接班，提议给予静脉推注输液。当时婴儿哭闹，医护齐动手给他输液过程中，婴儿突发心脏骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是 ()
 - A. 无知，无原则，违背了有利病人的原则
 - B. 无知，无原则，违背了人道主义原则
 - C. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了不伤害病人的原则
 - D. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了人道主义原则
 - E. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了有利原则
7. 患者，男性，68 岁，因心肌炎入院。护士遵医嘱给病人服药，服药后该护士才想起给病人服错了药，就站在走廊一头对另一头的护士大声说：“5 床吃错药了”此话被病人听到后，急忙自己寻来肥皂水喝下打算把“错药”呕吐出来，结果引发了严重呕吐加上心力衰竭当场死亡。事后经查，吃错的药是维生素 B6，对此案下列说法正确的是 ()
 - A. 维生素 B6 是有益身体健康的，吃错了无妨
 - B. 病人喝肥皂水致死，这是他自己的责任，不关医护人员的事
 - C. 医护人员的语言和行为都要从利于病人和不伤害病人的角度出发
 - D. 病人缺乏相应的医学知识，而造成了这样的恶果
 - E. 护士不应该把真相说出来
8. 患者，女性，23 岁，因子宫出血过多住院。患者诉子宫出血与她的月经有关。医生则按其主诉治疗。一位正在妇科实习的护士和患者很谈得来，成为无话不谈的好朋友，在一次聊天中谈及病情时，患者说是因为自己服用了流产药物而造成的出血不止，并要求这位护士替她保密。根据上述描述，实习护士应该 ()
 - A. 遵守保密原则，不将患者真情告诉医生
 - B. 因为不会威胁到患者生命，所以应该保密
 - C. 拒绝为她保密的要求
 - D. 为了患者的治疗，应该说服患者将其真实情况告诉医生，但一定要为患者保密

- E.了解病因，病史是医生的事，与护士无关，所以应该尊重患者的决定
- 9.张女士，女，56岁。因结肠癌住院手术治疗，术前护士为病人导尿，错误地使用70%乙醇进行外阴消毒。此行为属于（ ）
- 护理安全
 - 护理差错
 - 护理事故
 - 过失犯罪
 - 医疗事故
- 10.患者，女性，58岁，阑尾炎入院。护士将为患者做术前备皮准备，告知患者“把衣服解开，把肚子露出来，我要给你备皮。”患者不明白其意，问护士，“你想给我干什么？”“备皮，备皮，快点吧，我还有2个患者等着呢”护士不耐烦的回答。在这次护患交流中存在的主要问题是（ ）
- 护士没有运用礼貌性的语言
 - 护士应该尽量少用专业性语言
 - 护士应该尽量多用解释性语言
 - 护士应该尽量多用安慰性语言
 - 以上都不对
- 11.患儿，男，1岁半，进食花生时不慎误吸，出现呛咳，呼吸困难。入院时面色发绀，神志不清，经抢救转危为安。为了防止今后再发生异物误吸，护士对患儿家长进行有关知识的健康教育，双方关系模式为（ ）
- 患儿家长主动配合护理活动
 - 向护士提供有关的疾病信息
 - 患儿家长只有服从护士决定
 - 强调护士对患儿家长单方面的作用
 - 体现双方之间平等合作的双向作用
- 12.患者，男性，65岁，胃大部切除术后，护士为其进行护理，在护理中的道德要求不包括（ ）
- 团结协作
 - 体贴入微
 - 严密观察
 - 加速康复
 - 听之任之
- 13.患者，男性，42岁，因剧烈腹泻来诊，根据临床症状和查体结果，疑为霍乱。此时，对该患者的正确处置方法是（ ）
- 在指定场所单独隔离
 - 在留下联系电话后要求其回家等通知
 - 在医院门诊等待结果
 - 收住入本院消化科病房
 - 要求患者尽快自行前往市疾控中心确诊
- 14.患者，男性，45岁，因剧烈腹泻来诊，根据临床症状和查体结果，确诊为霍乱，予以隔离治疗。护士应告知其家属，患者的隔离期限是（ ）
- 以临床症状消失为准
 - 根据医学检查结果确定
 - 由当地人民政府决定
 - 由隔离场所的负责人确定
 - 由公安机关决定
- 15.患者，女性，62岁，因剧烈腹泻来诊，根据临床症状和查体结果，确诊为霍乱，该患者治疗无效不幸死亡，应将其尸体立即进行卫生处理并（ ）
- 由患者家属自行处理
 - 送回患者家乡火化
 - 按规定深埋
 - 石灰池掩埋
 - 就近火化
- 16.患者，女性，78岁。由于脑血栓入院，病情稳定，医嘱二级护理。次日患者坠床，造成颅内出血，造成该事件的主要原因是（ ）
- 病房环境过于昏暗
 - 护士没有升起床档
 - 护士没有进行健康教育
 - 没有安排家属陪护
 - 没有安排专人24小时照护
- 17.患者，女性，89岁。由于脑栓塞入院，病情稳定，二级护理。次日患者坠床，造成颅内出血，终因伤势过重死亡，根据对患者造成的伤害程度，该事故属于（ ）
- 医嘱差错
 - 一级医疗事故

- C.二级医疗事故
D.三级医疗事故
E.护理差错
- 18.患者，女性，78岁。由于脑血栓入院，病情稳定，医嘱二级护理。次日患者坠床，造成颅内出血，终因伤势过重死亡，患者不能复印的病历资料是（ ）
- A.体温单
B.化验单
C.门诊病例
D.会诊记录
E.医学影像检查资料
- 19.患者，男性，32岁，气胸入院。值班护士在23:00行药物治疗时，由于患者已入睡，未叫醒患者，错将该患者药物用于另一名患者，导致另一名患者出现皮肤过敏反应。此事件中，该护士承担（ ）
- A.一半责任
B.减轻责任
C.次要责任
D.无责任
E.主要责任
- 20.患者，女性，45岁。行阑尾切除术后，给予青霉素治疗，护士未做青霉素过敏试验，给患者输入青霉素后致过敏性休克死亡。该事件属于（ ）
- A.医疗事故
B.护理质量缺陷
C.责任心不强
D.护理差错
E.医疗纠纷
- 21.患者，女性，45岁。行阑尾切除术后，给予青霉素治疗，护士未做青霉素过敏试验，给患者输入青霉素后致过敏性休克死亡。下列不属于医疗事故预防措施的是（ ）
- A.设立医疗质量监控部门或成员
B.加强风险管理
C.严格控制探视
D.提高护理人员的技术水平
E.持续质量改进
- 22.患者，男性，30岁，车祸致大量失血，入院时已昏迷，需立即手术治疗，但短期内无法联系到患者家属。此时，合理的处理措施是（ ）
- A.请示上级卫生主管部门
B.联系患者单位
C.转诊其他医疗机构
D.继续尝试联系家属
E.由医院负责人决定
- 23.患者，男性，38岁，曾有吸毒史，患者要求护士保密。护士可以向谁提及此事（ ）
- A.护理部干事
B.医务处处长
C.患者的主治医师
D.患者的上级领导
E.患者的配偶和女儿
- 24.患者，女性，33岁，子宫肌瘤择期手术。根据我国《献血法》规定，为保障临床急救用血需要，对择期手术患者，应提倡采用的用血方式是（ ）
- A.互助献血
B.同型献血
C.自身储血
D.自愿献血
E.输成分血
- 25.患者，女性，33岁，车祸外伤需输血。关于医疗机构临床用血的规定，正确的是（ ）
- A.可自行采集
B.可将临床多余用血出售给血液制品单位
C.必须进行配型检查
D.必须先行缴费后使用
E.主要动员家庭，亲友为患者鲜血
- 26.患者，女性，25岁。孕17周，诊断淋病入院。护士向其解释淋病对妊娠、胎儿和新生儿的影响后，孕妇出现下列哪一项表述时，表明护士仍需要对其进行健康教育（ ）
- A.淋病会导致胎儿窘迫
B.淋病会导致新生儿肺炎
C.我不想让我丈夫知道这事

- D.我会因此发生盆腔感染
E.孕晚期我要注意胎膜早破的症状
- 27.患者，男性，56岁，尿毒症入院。医生建议肾脏移植手术。关于人体器官移植的叙述，正确的是（ ）
- 捐献器官是公民的义务
 - 人体器官移植包括心、肺、肾、骨髓等移植
 - 活体器官的捐献和接受需经过伦理委员会审查
 - 公民生前表示不同意捐献器官的，该公民死后，其配偶可以以书面形式表示同意捐献
 - 任何组织和个人不得摘取未满20周岁公民的活体器官用于移植
- 28.产妇，26岁，剖宫产后要求出院，医生同意其出院但未开具出院医嘱。家属表示先带产妇及孩子回家，明天来医院结账。护士没有同意家属的要求，借口为孩子洗浴把孩子抱走了。产妇知情后大哭。该护士的行为违反了（ ）
- 自主原则
 - 不伤害原则
 - 公正原则
 - 行善原则
 - 公平原则
- 29.产妇剖宫产后要求出院，医生同意其出院但未开具出院医嘱。家属表示先带产妇及孩子回家，明天来医院结账。护士没有同意家属的要求，但家属不听护士的劝阻并准备离开。该家属的行为没有履行（ ）
- 积极配合医疗护理的义务
 - 自觉遵守医院规章制度的义务
 - 自觉维护医院秩序的义务
 - 保持和恢复健康的义务
 - 公民的义务
- 30.患者，男性，78岁。胃癌入院。该患者患病后，认为有权选择愿意接受或拒绝医生制定的诊治方案，这种权利是（ ）
- 自主原则的体现
 - 有利原则的体现
 - 尊重原则的体现
 - 公正原则的体现
 - 不伤害原则的体现
- 31.患者，女性，37岁，因肠粘连并肠梗阻行手术治疗。患者的丈夫、父母、哥哥及10岁的儿子都到了医院。医务人员介绍完手术的重要性及风险后，要求签订手术协议书，签订人应首选（ ）
- 患者本人
 - 患者的父母
 - 患者的丈夫
 - 患者的哥哥
 - 患者的儿子
- 32.患者，男性，63岁，阑尾炎术前备皮。患者对护士所实施的护理行为有质疑时，护士必须详细介绍，在病人同意后才能继续进行，这属于病人的（ ）
- 平等医疗权
 - 疾病认知权
 - 知情同意权
 - 社会责任权
 - 保护隐私权
- 33.患者女，36岁，左上腹痛伴进行性血压下降6小时，因诊断不明需做破腹探查，患者担心“白挨一刀”，此时护士进行心理疏导，其目的应除外（ ）
- 消除患者顾虑
 - 提高手术成功率
 - 增加人性化服务
 - 增加医患间沟通
 - 增加患者合作度
- 34.患者，男性，56岁，在检查过程中被发现患有艾滋病，对此患者的护理中违反伦理要求的是（ ）
- 像对待其他患者一样，一视同仁
 - 尊重患者，注重心理护理
 - 认真观察患者病情
 - 以该患者为例大力宣传艾滋病的知识
 - 主动接近患者，鼓励患者积极配合治疗
- 35.患者，男性，66岁，将接受手术治疗，其知情权不包括（ ）
- 有权自主选择

- B.有同意的合法权利
C.有明确决定的理解力
D.有家属代为决定的权利
E.有做出决定的认知力
- 36.患者，男性，60岁。因急性心肌梗死来医院急诊就诊，在救治过程中突然发生心脏骤停。护士为抢救患者生命实施必要的紧急措施，应该做到以下几点，但不包括的是（ ）
A.立即通知医师
B.必须有医师在场指导
C.避免对患者造成伤害
D.依照抢救诊疗技术规范抢救
E.根据患者实际情况和自身能力水平进行力所能及的抢救
- 37.患者，男性，62岁，糖尿病并发症入院。慢性病患者与护士间适用的关系模式是（ ）
A.主动-指导型模式
B.主动-合作型模式
C.指导-命令型模式
D.共同参与型模式
E.被动参与型模式
- 38.患者，男性，66岁，糖尿病入院。患者足部患有严重溃疡，经治疗病情未减轻，且有发生败血症的危险，此时为保证病人的生命而需要对病人截肢。这里包含的冲突是（ ）
A.行善原则与公正原则的冲突
B.行善原则与尊重原则的冲突
C.不伤害原则与行善原则的冲突
D.不伤害原则与公正原则的冲突
E.不伤害原则与尊重原则的冲突
- 39.患者，男性，57岁，结肠癌刚入院。护士与患者交谈时，提倡使用如下审慎用语，除了（ ）
A.刺激性用语
B.保护性用语
C.解释性语言
D.鼓励性语言
E.暗示性语言
- 40.患儿，女性，10岁。剑突下突发阵发性“钻顶样”剧烈腹痛3小时，呕出一条蛔虫，患儿立即全身发抖，双目紧闭，面色苍白，查体不配合。患儿主要心理反应为（ ）
A.焦虑
B.自卑
C.孤独
D.恐惧
E.绝望
- 41.患者，女性，45岁。反复不规则发热6个月，半个月前出现左下肢酸痛、行走困难，伴胸闷、心悸，被诊断为“亚急性感染性心内膜炎”，二尖瓣脱垂伴关闭不全，建议手术治疗。患者对手术非常担心。适宜的护理措施是（ ）
A.建议患者转院
B.告知患者手术已经安排，无法更改
C.向患者介绍手术成功的例子
D.告诉患者手术很简单
E.建议患者签字放弃治疗
- 42.患者，男性，65岁，因慢性肾衰竭接受了肾移植手术，术后恢复良好，心怀感激，多次向责任护士打听捐肾者家庭住址，想登门致谢。面对患者的请求责任护士正确的做法是（ ）
A.建议电话致谢
B.说明国家捐献器官政策
C.建议给予经济补偿
D.宣传捐献者事迹
E.与患者一道登门道谢
- 43.患者，男性，33岁，车祸致昏迷，脑部CT提示颅内大量出血，需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴，也无证实其身份和联系人的信息。依据《侵权责任法》的规定，术前正确的做法是（ ）
A.通知手术室准备手术
B.报告派出所寻找家属
C.报告科室负责人获批
D.报告医院负责人获批
E.报告卫生行政部门负责人获批
- 44.患者，男性，65岁，急性心肌梗死冠脉支架后半，在家休养，心情低落，少与人交流，对周围事物不感兴趣。其最可能的心理问题是（ ）

- A. 谵妄
- B. 抑郁
- C. 焦虑
- D. 恐惧
- E. 愤怒

45. 患儿，男，3岁。奔跑时摔倒，诊断为颅底凹陷性骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止，护士提供正确的心理护理措施是（ ）

- A. 安慰，解释治疗的重要性
- B. 嘱患儿妈妈进入留观室陪伴
- C. 让患儿听舒缓的音乐
- D. 询问患儿需求，给予满足
- E. 请主治医师与患儿交谈

46. 患儿，女性，3岁，为某知名女星女儿。在儿科的实习护士下班后在电梯中与外科护士说“告诉你，……大明星的女儿今天入住我们的病房，你想不想知道是啥原因？”外科护士的正确回答是（ ）

- A. “我们去病房说吧，这里是公众场所，不适合讨论病情。”
- B. “你简单跟我说说病情好了，我不能去看她。”
- C. “请不要跟我说这些，你不能透露这些消息。”
- D. “如果是外科的疾病就告诉我，我也许能帮助你。”
- E. “告诉我床号，明天我自己去看她。”

47. 患者，男性，67岁，昏迷。某护士值夜班觉得很困乏，未按时给患者翻身，认为少翻一次身不会就这么巧出现压疮的，这种做法违反了（ ）

- A. 舒适感
- B. 安全感
- C. 奉献精神
- D. 自强精神
- E. 慎独精神

48. 患者，男性，36岁，因“腹痛6小时”被家属送来急诊。患者意识模糊、面色苍白、脉搏细弱，诊断为急性胰腺炎伴休克收入重症监护室。家属急切地向重症监护室护士询问“他怎么样了？”“他能活过来吗？”护士最恰当的回答是（ ）

- A. “我们现在正在忙着抢救别的病人，完事以后医生会跟您交代情况。”
- B. “您必须签知情同意书，办完入院手续我们才能开始治疗。”
- C. “医生正在积极治疗您的家人，请配合我们，谢谢。”
- D. “我们处理过很多这样的患者，病情不算重，放心。”
- E. “你们家属送来这么晚，我们没法保证结果。”

49. 刘女士，80岁，因心肌梗死入院治疗。在输液过程中，擅自调快输液滴数，导致急性肺水肿的发生。该事件中护士的主要责任是（ ）

- A. 病人知识缺乏
- B. 护患沟通不畅
- C. 病房管理欠缺
- D. 忽视病人告知
- E. 病人过于任性

50. 患者，女性，44岁。敏感多疑，怀疑单位同事有意和她作对，故意给其工作和生活设置障碍。近期经常听到耳边有人说话，对其进行评论。护士对其心理护理中，正确的是（ ）

- A. 经常与患者讨论单位同事对她的评价
- B. 明确告诉患者没有人陷害她
- C. 与患者争辩其说话的对象不存在
- D. 耐心倾听患者诉说，尽量满足患者合理要求
- E. 在患者面前应低声交谈，以免引起患者猜疑

51. 患者，女性，37岁。因剧烈腹痛，独自到急诊科就诊，经检查确诊为宫外孕大出血。因其无监护人签字且没带够手术费用，值班医生未及时进行手术，而是让其在急诊科输液留观。当患者家属接到消息赶到医院付款时，错过了最佳手术时机。本案例侵犯了病人的（ ）

- A. 自主权
- B. 知情同意权
- C. 参与治疗权
- D. 基本医疗权
- E. 保密和隐私权

52. 患者，男性，19岁。尿道损伤后出现排尿困难。护士遵医嘱为其置尿管。患者表情紧张问：“会不会很疼呀？”下列回答较妥当的是（ ）

- A. 放心，一点儿也不疼！
- B. 当然会疼，谁让你受伤了呢！
- C. 不太清楚。
- D. 为了治病，疼也得忍着！

- E.会有一些疼痛，我会尽量帮你减轻痛苦。
- 53.某护士为一患儿进行输液治疗，输液 30 分钟后患儿出现严重的不良反应并休克，经抢救病情好转并转入 ICU 继续治疗。对此，患儿家长反应强烈，质疑护士输液有误。护士应首先进行的重要工作是（ ）
- 向护士长汇报抢救经过
 - 与医生一起分析患儿病情
 - 继续与患儿家属沟通，做好解释
 - 帮助患儿家长完成抢救用药的缴费
 - 按照规定封存未输完的液体
- 54.患者，女性，56 岁。卵巢癌术后，拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。为患者提供的护理措施中，护其自尊的是（ ）
- 教育其养成良好的排尿习惯
 - 耐心解释并提供隐蔽的排尿环境
 - 调整体位以协助排尿
 - 按摩其下腹部，使尿液排出
 - 温水冲洗会阴以诱导排尿
- 55.患者，男性，68 岁。48 小时前心梗入院，现其病情稳定，家属强烈要求探视，但未到探视时间，此时护士应首先（ ）
- 请护士长出面调解
 - 请主管大夫出面调解
 - 向家属耐心解释取得家属理解
 - 悄悄让家属进入病房
 - 不予理睬
- 56.患者，女性，28 岁。因宫外孕急诊入院手术。术后宜采用的护患关系模式是（ ）
- 主动型模式
 - 主动-被动型模式
 - 指导-合作型模式
 - 共同参与型模式
 - 被动-被动型模式
- 57.患者，男性，30 岁。半小时前因汽车撞伤头部入院，入院时处于意识模糊状态，对此患者应采取的护患关系模式是（ ）
- 主动-主动型模式
 - 主动-被动型模式
 - 被动-被动型模式
 - 共同参与型模式
 - 指导-合作型模式
- 58.足月产新生儿，患吸入性肺炎如重症监护病房一周，患儿家属急切询问患儿情况，病房护士恰当的处理是（ ）
- 让其问其他护士
 - 让其问值班医生
 - 告知其完全正常
 - 客观介绍患儿情况
 - 保密患儿病情
- 59.患者，女性，28 岁。因“婚后两年，未避孕，未孕”诊断为“不孕症”而住院，在进行妇科检查时，发现患者伴有尖锐湿疣。护士便将此信息告知了科室的其他护士，并告知了同病房的其他病人。该护士的行为属于（ ）
- 渎职行为
 - 侵犯病人的隐私权
 - 侵犯病人的同意权
 - 侵犯病人的生命健康权
 - 侵犯病人的知情权
- 60.病人，男，62 岁，心脏手术后病情稳定，从重症监护室转到普通病房，述求病区嘈杂，无法休息，情绪烦躁不安。影响病人角色适应的主要因素是
- 疾病因素
 - 医院环境
 - 病人特征
 - 生活习惯
 - 文化程度
- 61.医生由于笔误而开出“西地兰 0.4g 加入 5% 葡萄糖 20 毫升静脉注射”的错误医嘱，护士应采取的做法是（ D ）
- 严格按照医嘱执行
 - 按正确剂量执行
 - 不予执行
 - 报告护士长后执行

- E.及时与医生沟通，改正后执行
- 62.患者，男性，65岁，呼吸道感染入院。医嘱使用青霉素静脉滴注，护士没有询问患者有无青霉素过敏史即为患者做青霉素皮试，造成患者休克死亡。护士的行为应付的责任是（ ）
- 完全责任
 - 主要责任
 - 同等责任
 - 次要责任
 - 轻微责任
- 63.患者，男性，65岁，入院检查曾有艾滋病。根据《艾滋病防治条例》规定，艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应当将其感染或者发病的事实如实告知（ ）
- 朋友
 - 同事
 - 亲属
 - 同学
 - 与其有性关系者
- 64.患者，男性，28岁，健康。清晨空腹到血站要求献血。血站护士应向其说明，每次献血量最多不超过（ ）
- 200ml
 - 250ml
 - 300ml
 - 350ml
 - 400ml
- 65.患者，男性，28岁，健康。清晨空腹到血站要求献血。献血结束，护士告知其下次献血的间隔时间不得少于（ ）
- 2个月
 - 4个月
 - 6个月
 - 8个月
 - 12个月
- 66.患者，男性，34岁，车祸急需新鲜血浆 O 型血液，在下列配型合格的献血者中最合适的是（ ）
- 男性，16岁，在校学生
 - 男性，36岁，教师，因高血压长期服药控制，血压维持在 110~130/70~80mmHg
 - 男性，26岁，退役军人，在 3 个月前献血 400ml
 - 女性，50岁，机关公务员
 - 女性，40岁，医生。因甲状腺切除终身服药替代治疗，现甲功正常
- 67.某医院组织全院职工参加义务献血活动。急诊科年轻护士甲、乙、丙均报名参加献血，献血前错误的准备是（ ）
- 适当休息
 - 不能服药
 - 不能饮酒
 - 保证充足睡眠
 - 适量高脂食物
- 68.某医院组织全院职工参加义务献血活动。外科 5 位年轻护士报名参加献血，顺利完成自愿献血后的正确做法是（ ）
- 献血完毕按住止血棉球 1 分钟以免皮下血肿
 - 绝对卧床休息一周
 - 采血侧肢体可以抬举重物
 - 保护穿刺部位，至少 8 小时内勿用水浸湿
 - 可以正常工作和适量运动，避免通宵娱乐
- 69.某大学组织二年级学生参加义务献血活动，全体学生均参加献血。《献血法》规定，负责组织献血工作的机构是（ ）
- 地方各级人民政府
 - 县级以上人民政府
 - 地方各级卫生行政部门
 - 地方各级采供血机构
 - 行业协会
- 70.患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，承担赔偿责任的是（ ）
- 医务人员
 - 医疗机构
 - 医疗机构负责人
 - 医务人员和医疗机构
 - 医务人员及其家属
- 71.某值班护士在 23:00 行药物治疗时，由于患者已入睡，护士未叫醒患者，错将患者甲的药物输注给患

者乙，导致患者乙出现皮肤过敏反应。此事件中，该护士承担（ ）

- A.一半责任
- B.减轻责任
- C.次要责任
- D.无责任
- E.主要责任

72.内科医生王某，在春节回家的火车上遇到一位产妇临产，因车上无其他医务人员吗，王某遂协助产妇分娩。在分娩过程中，因牵拉过度，导致新生儿左上肢臂丛神经损伤，王某行为的性质是（ ）

- A.属于违规操作，构成医疗事故
- B.属于非法行医，不属于医疗事故
- C.属于超范围执业，构成医疗事故
- D.属于见义勇为，不构成医疗事故
- E.虽造成不良后果，但不属医疗事故

73.某医院组织全院职工参加义务献血活动。全院年轻护士均报名参加献血，我国在《献血法》实施以后实行的献血制度是（ ）

- A.个体供血制度
- B.义务献血制度
- C.无偿献血制度
- D.自愿献血制度
- E.有偿献血制度

74.某医院组织全院职工参加义务献血活动。急诊科年轻护士均报名参加献血，《献血法》规定，健康公民自愿献血献血的年龄段是（ ）

- A.18~55 周岁
- B.18~60 周岁
- C.18~65 周岁
- D.16~55 周岁
- E.16~60 周岁

75.《献血法》规定，对无偿献血者国家要发给无偿献血证书，负责制作无偿献血证书的部门是（ ）

- A.各省、自治区、直辖市卫计委
- B.血液中心
- C.国务院卫生行政部门
- D.各省输血协会
- E.行业机关单位

76.护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制 4 年护理专业课程学习，拟申请护士执业注册。以下不能申请护士执业注册的是（ ）

- A.5 年制大学本科
- B.3 年制大学专科
- C.3 年制中专
- D.两年制中专
- E.2 年制研究生

77.护士发现医师医嘱可能存在错误，但仍然执行错误医嘱，对患者造成严重后果，该后果的法律责任承担者是（ ）

- A.开些医嘱的医师
- B.执行医嘱的护士
- C.科室主任
- D.护士长
- E.医师和护士

78.患者，男性，57 岁，结肠癌晚期，护士对其临终关怀最主要的目的是（ ）

- A.为临终患者进行死亡教育
- B.为临终患者止痛
- C.延长临终患者的寿命
- D.提高临终患者的生命质量
- E.为家属提供心理支持

79.患者，男性，57 岁，结肠癌晚期，护士对其临终关怀，也应尊重其知情权。下列做法不正确的是（ ）

- A.当临终患者要求获悉病情真相时，医护人员必须保持一致的态度
- B.一定不能告诉临终患者实情
- C.如果患者没有主动获悉病情的意愿，则不可主动告知
- D.应考虑临终患者个体差异
- E.允许临终患者参与治疗与护理方案的制定

80.患者，男性，59 岁，胃癌晚期，护士对其临终关怀。临终患者将面对死亡问题，可能有情绪和行为上的过激行为，此时护士应具有的职业精神不包括（ ）

- A.真诚
- B.宽容
- C.忍让
- D.满足要求
- E.回避

81.患者，男性，28岁，脑外伤抢救无效死亡。现代脑死亡标准不包括（ ）

- A.不可逆的深度昏迷
- B.自主呼吸消失
- C.心跳停止
- D.脑干反射消失
- E.脑电波消失

82.苗某，男，62岁，患糖尿病4年，未按医嘱规则服药，病情不稳定，昨日突发神志不清，经抢救治疗，于一周后病情好转、稳定。饮食如厕自理，经指导能配合医生护士进行治疗和护理。苗某神志不清时，护士给予护理的护患关系模式特征是

- A.“告诉病人做什么”
- B.“我为病人做什么”
- C.“护士教会病人做什么”
- D.“和病人商量做什么”
- E.“护士告诉病人应该做什么”

83.患者，54岁，癌症死亡后，护理人员应对死者尸体进行料理，下列关于尸体料理的描述不正确的是（ ）

- A.保持尸体五官安详，肢体舒展
- B.是临终关怀结束以后的内容
- C.体现了对死者的尊重
- D.给予家属心灵的安慰
- E.体现了人道主义精神和崇高的职业道德

84.护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制4年护理专业课程学习，拟申请护士执业注册。不属于申请护士执业注册的条件是（ ）

- A.年龄18周岁以上
- B.护士专业学历证书
- C.健康证明
- D.护士职业资格考试成绩合格证明
- E.户籍证明

85.护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制4年护理专业课程学习，拟申请护士执业注册。从事护理活动唯一合法的凭证是（ ）

- A.在校成绩单
- B.实习证明
- C.护理专业学历证书
- D.护士执业资格考试成绩合格证明
- E.护士执业资格证书

86.患者，女性，21岁。在校大学生。因急性腹痛就诊，诊断为异位妊娠破裂出血，拟急诊手术。术前护理人员向患者介绍病情及预后，体现了护理人员的（ ）

- A.保证患者权益的义务
- B.及时救治患者的义务
- C.维护患者治疗安全的义务
- D.保护患者隐私义务
- E.认真执行医嘱的义务

87.患者，女性，21岁。在校大学生。因急性腹痛就诊，诊断为异位妊娠破裂出血，拟急诊手术。患者要求医护人员不要将真实情况告知同学，体现了患者的（ ）

- A.知情权
- B.回避权
- C.服务选择权
- D.隐私权
- E.公平权

88.患者，女性，21岁。在校大学生。因急性腹痛就诊，诊断为异位妊娠破裂出血，拟急诊手术。术前护理人员向患者介绍病情及预后，患者在了解病情后签字同意手术治疗，体现了伦理学的（ ）

- A.自主原则
- B.不伤害原则
- C.公平原则
- D.行善原则
- E.有利原则

89.患者，男性，66岁，肝癌入院，病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，

- 寄希望于治疗，病情进展和疼痛发作时，多次要求医生告知病情和治疗效果。此时医生最佳的理论选择是()
- 正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
 - 恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病逝
 - 遵循病人自主原则，全面满足病人要求
 - 根据知情同意原则，应该告知病人所有信息
 - 依据有利原则，劝导病人使用一些民间土方
- 90.患者，男性，49岁。因急性阑尾炎住院治疗，手术后，主管医生给患者使用了一种比较贵的新型抗生素，但没有同患者商量。患者出院时，发现自己需付上千元的药费，认为医护人员没有告诉自己而擅自做主，自己不应该负担这笔钱。在这个案例中，医护人员损害了患者的哪项权利()
- 疾病认知权
 - 平等医疗权
 - 保护隐私权
 - 知情同意权
 - 病人参与权
- 91.患者，女性，40岁。卵巢癌术后，拔出尿管后7小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音，有压痛，考虑尿潴留。为患者提供的护理措施中，护其自尊的是()
- 教育其养成良好的排尿习惯
 - 耐心解释并提供隐蔽的排尿环境
 - 调整体位以协助排尿
 - 按摩其下腹部，使尿液排出
 - 温水冲洗会阴以诱导排尿
- 92.护士赵某，在执业过程中被患者感染，导致职业病，应享受以下权利，但除外()
- 依法享受国家规定的职业病待遇
 - 诊疗、康复费用，按照国家有关工伤保险的规定执行
 - 被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗的生活保障由用人单位承担
 - 用人单位除负责患职业病护士的生活保障外，不负责其他经济损失，护士不得向用人单位提出赔偿要求
 - 明确职业病诊断，可由工伤保险给付
- 93.“120”接诊了一名车祸致昏迷的患者，脑部CT提示颅内大量出血，需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴，也无证实其身份和联系人的信息。依据《侵权责任法》的规定，术前正确的做法是()
- 通知手术室准备手术
 - 报告派出所寻找家属
 - 报告科室负责人获批
 - 报告医院负责人获批
 - 报告卫生行政部门负责人获批
- 94.患者，男性，70岁。48小时前心梗入院，现其病情稳定，家属强烈要求探视，但未到探视时间，此时护士应首先()
- 请护士长出面调解
 - 请主管大夫出面调解
 - 向家属耐心解释取得家属理解
 - 悄悄让家属进入病房
 - 不予理睬
- 95.患者，男性，68岁，糖尿病入院，因病情未见缓解，患者家属与护士发生了肢体冲突。对于医疗机构中发生的殴打护士的情形，进行行政处罚的机关是()
- 医疗卫生机构保卫部门
 - 卫生管理机构
 - 医疗卫生机构
 - 公安机关
 - 劳动保障机构
- 96.患者，男性，78岁，家属以患者年老体弱病情严重为借口，强行插进长长的候诊队伍，引起其他候诊患者不满，眼看即将引发纠纷，门诊护士的最佳做法是()
- 耐心劝说老人家属，要求其遵守就诊秩序
 - 以静制动，根据现场情况采取具体措施：如果其他患者默认了老人患者的插队，就不做处置；如果其他患者不同意，则出面维持秩序，令老人家属排队等候。
 - 护士请示坐诊医生，请医生决定如何处置
 - 护士查看老人病情，然后对候诊患者做解释说服工作，当安排老人优先就诊
 - 请院领导决定
- 97.患者钱某，肺癌晚期，临终前想立下遗嘱，希望王护士能作个见证。护士在做病人的遗嘱见证人时必须明确以下程序，除外()
- 应用2~3个见证人参与
 - 见证人必须听到或看到并记录病人的遗嘱
 - 必须有病人的家属在场

D. 见证人当场签名，证实遗嘱是该病人的

E. 遗嘱应该有公证机关公证

98. 患者，男性，42岁，因剧烈腹泻来诊，根据临床症状和查体结果，高度怀疑为霍乱。正在等待实验室检查结果以确诊诊断。《传染病防治法》规定，各级各类医疗机构在传染病防治方面的职责是()

A. 对传染病防治工作实行统一监督管理

B. 发生传染病疫情时，对疫点疫区进行调查分析

C. 确定专人承担传染病疫情报告、本单位内传染病预防和控制工作

D. 领导所管辖区域传染病防治工作

E. 负责所管辖区内传染病预防、控制、监督工作的日常经费

99. 护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制4年护理专业课程学习，拟申请护士执业注册。申请护士执业注册时，不影响申请者申报的情况是()

A. 双耳听力障碍

B. 色盲

C. 色弱

D. 近视

E. 精神病史

100. 护士小张，在执行医嘱时，发现王医生为10床病人开的医嘱有明显的错误，小张向王医生提出异议，但王医生执意要求小张执行医嘱，此时小张护士应()

A. 让医生签字后执行

B. 向病人及家属说明情况

C. 执行医嘱

D. 报告护士长或上级主管部门

E. 询问科室其他人员