

# 2024年河南省高等职业教育技能大赛

## 急救技能赛项理论模块第四套

### 一. 单选题（共计 60 题，每题 1 分）

1. 大脑缺血缺氧多久即可出现不可逆的损伤（     ）

- A. 4-6 分钟
- B. 7-8 分钟
- C. 9-10 分钟
- D. 10-15 分钟
- E. 1-3 分钟

2. 以下哪项不是脑死亡的临床特征（     ）

- A. 无自主呼吸、运动
- B. 无心跳
- C. 脑干反射消失
- D. 肌肉无张力
- E. 不可逆的深昏迷

3. 家用低频交流电较高频电流危险（     ）

- A. 1 倍
- B. 3~4 倍
- C. 30 倍
- D. 0.5 倍

E. 0.1 倍

4. 决定淹溺预后最重要的因素为（ ）

A. 现场复苏是否有效

B. 缺氧时间和程度

C. 是否存在神志丧失

D. 是否出现心律失常、心室颤动、心力衰竭等

E. 是否出现脑水肿

5. 患者，女，55岁。1h前骑电动车与货车相撞，当时车速较快，患者被甩出6m远。伤后当时浅昏迷，GCS评分5分，呼吸急促(38次/min)，口严重发绀，颌面部严重畸形，脉搏细速，手足发冷，院前“120”途中血压75/37mmHg，脉搏143次/min，呼吸38次/min，血氧饱和度95%，入抢救室时口腔可见呕吐物。针对该患者，首先实施的抢救措施是（ ）

A. 立即进行创伤严重度评分

B. 立即开通静脉通路

C. 立即清除气道内分泌物、颈托固定

D. 立即给予液体复苏

E. 立即给予吸氧

6. 病人，女性，25岁。因车祸后导致右大腿开放性骨折，大量出血，半小时后病人出现面色苍白，呼之不应。应首先采取的措施是（ ）

A. 止血

B. 骨折复位

C. 判断呼吸心跳情况

D. 包扎

E. 送往抢救室

7. 病人，女性，25 岁。因车祸后导致右大腿开放性骨折，大量出血，半小时后病人出现面色苍白，呼之不应。心肺复苏后最重要的措施是（ ）

A. 应用抗生素

B. 纠正酸中毒

C. 强心利尿

D. 持续心电监护

E. 防治脑缺氧及脑水肿

8. 患者，男，42 岁，化工实验室研究员，因操作不当吸入某种烟雾毒气。该患者受到直接损伤可能不包括（ ）

A. 热力作用

B. 刺激作用

C. 化学性损伤

D. 缺氧

E. 有毒物质

9. 患者，男性，75 岁，晨起在公园习惯性活动时，突然倒地，呼之不应，意识丧失，颈动脉未触及搏动。现场人员紧急呼叫“120”，

几分钟后患者被 120 救护车急速转送至医院。心肺复苏的首选药为 ( )

- A. 利多卡因
- B. 肾上腺素
- C. 去甲肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 洛贝林

10. 处理 MODS 的首要治疗措施是( )

- A. 病因治疗
- B. 对抗炎症介质
- C. 营养支持和器官功能支持
- D. 中和毒素
- E. 补充血容量

11. 患者，男性，50 岁，因车祸致头、胸、腹、肢体外伤 40 分钟后救护人员到达现场，患者当时浅昏迷，呼吸急促(38 次/分)伴口唇严重发绀，脉搏摸不到，手足发冷，血压测不到，左上胸有一气体漏出的伤口，右大腿有骨外露伴出血。该患者属于 ( )

- A. 多处伤
- B. 多发伤
- C. 复合伤
- D. 放射复合伤

E. 闭合性创伤

12. 成人胸外心脏按压的操作，下列不正确的是( )

A. 病人仰卧位，背部垫硬板

B. 按压部位在病人心尖部

C. 使胸骨下半段及其相邻的软骨下降 5~6cm

D. 按压要有规律，每分钟 100~120 次

E. 尽量减少按压中断

13. 病人，女性，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。采用中国九分法估计该病人的烧伤面积约为 ( )

A. 18%

B. 21%

C. 24%

D. 27%

E. 54%

14. 患者，男，48 岁。既往高血压病史，突起左胸撕裂性剧痛，晕厥，左桡动脉搏动消失。考虑诊断最可能是 ( )

A. 急性心肌梗死

B. 脑出血

C. 主动脉夹层

D. 肺栓塞

E. 高血压危象

15. 病人，女性，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。

查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。根据病人烧伤部位的特点，护士应重点观察（ ）

A. 呼吸功能

B. 上肢血液循环

C. 意识

D. 疼痛程度

E. 血压

16. 病人，女性，16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。

查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。不正确的补液方案是（ ）

A. 尽早开始

B. 见尿补钾

C. 先晶后胶

D. 先糖后盐

E. 先快后慢

17. 病人入院第 5 天出现发热。体温 39.2℃，创面有黄绿色分泌物伴恶臭味，引起感染的细菌考虑为（ ）

A. 溶血性链球菌

B. 大肠杆菌

C. 金黄色葡萄球菌

D. 铜绿假单胞菌

E. 梭形芽胞杆菌

18. 某病人，男性，67岁，冠心病史20余年，在全麻、低温体外循环下行冠脉搭桥术，术中置入动脉压监测管，术后转入ICU监护治疗。有创动脉测压首选测压途径是（ ）

A. 桡动脉

B. 足背动脉

C. 肱动脉

D. 尺动脉

E. 股动脉

19. 某病人，男性，67岁，冠心病史20余年，在全麻、低温体外循环下行冠脉搭桥术，术中置入动脉压监测管，术后转入ICU监护治疗。此病人进行动脉监测，最大的优点是（ ）

A. 在手术过程中，仍能监测每一心动周期的血压变化

B. 重复性好，能反复监测血压变化

C. 并发症少

D. 能设置血压的报警界线

E. 操作简单，易掌握

20. 下列哪一项描述，有创血压监测可以实现，无创血压监测无法做到（ ）

A. 无创伤性，重复性好

- B. 自动测压，省时省力，易掌握
- C. 能间接判断是否有心律失常
- D. 自动检测血压袖带的大小，测量平均动脉压准确
- E. 可引起肢体神经缺血、麻木等并发症

21. 女性，23岁，胸闷、气促、紫绀，鼻导管吸氧6L/min，R36次/分，BP100/60mmHg，动脉血气分析示：pH7.35，PaCO<sub>2</sub>40mmHg，PaO<sub>2</sub>46mmHg，拟“ARDS”收入ICU。下面对该病人呼吸状态描述错误的是（ ）

- A. 该病人存在1型呼吸衰竭
- B. 该病人存在2型呼吸衰竭
- C. 普通氧疗无法缓解其呼吸困难症状
- D. 需进一步明确病因
- E. 需要立即机械通气治疗

22. 下列关于急性冠脉综合征的说法错误的是( )

- A. 安静卧床休息
- B. 给予氧气吸入
- C. 遵医嘱给予阿司匹林、硝酸甘油等药物治疗
- D. 未明确诊断前不可给予镇痛剂
- E. 描记12或18导联心电图

23. 有关肺栓塞的护理不准确的是( )

- A. 镇静，绝对卧床休息、保持安静，以防其他栓子脱落



B.注意观察胸痛部位、诱发因素、严重程度，必要时遵医嘱应用止痛药物

C.溶栓治疗时密切观察患者有无出血倾向(牙龈、皮肤黏膜、穿刺部位)

D.遵医嘱复查血凝、动脉血气、描记心电图，判断溶栓效果

E.溶栓治疗期间，减少静脉穿刺，拔针时常规压迫止血

24. 多发伤的临床特点不包括( )

A.伤情外露明显、易于观察处理

B.休克发生率高

C.低氧血症发生率高

D.并发症发生率高

E.感染发生率高

25. 患者，女，32岁。夏天高温季节，在闷热车间劳动后出现头痛、恶心、呕吐， $T41^{\circ}\text{C}$ ，HR130次/min，BP100/50mmHg，初步诊断为中暑。与中暑的病死率直接相关的为( )

A.体温升高程度和持续时间

B.是否昏迷

C.严重凝血功能障碍或DIC

D.肝肾功能损害

E.血乳酸浓度

26. 患者，男，45 岁。突发全腹持续性剧痛，全腹压痛、肌紧张、反跳痛，肠鸣音减弱。腹部X线平片见多个气液平面，首先应考虑( )

- A. 原发性腹膜炎
- B. 急性弥漫性腹膜炎
- C. 急性机械性肠梗阻
- D. 阑尾炎合并穿孔
- E. 急性胆囊炎

27. 患者女性，26 岁，于 2011 年 4 月 20 日因“宫外孕、出血性休克”急诊手术。入手术室时，神志清，T37.2℃，P92 次/分，BP99/60mmHg，硬膜外麻醉成功后，突然出现意识丧失，面色苍白，口唇四肢末梢严重发绀，脉搏、心音、血压均测不出，血氧饱和度迅速下降至 20%。该患者可能发生的情况是 ( )

- A. 心脏骤停
- B. 出血性休克
- C. 呼吸衰竭
- D. 心源性休克
- E. 窒息

28. 以下哪项不是呼吸容量监测指标( )

- A.潮气量
- B.呼吸频率
- C.分钟通气量

D.生理无效腔容积

E.肺泡通气量

29. 患者，女，40岁，因误食含喷洒有机磷农药的蔬菜而致中毒，患者出现肌束颤动、牙关紧闭，抽搐、全身紧束压迫感，而后发生肌力减退和瘫痪，呼吸肌麻痹引起周围性呼吸衰竭，请问此种情况属于( )症状。

A.毒蕈碱样症状

B.烟碱样症状

C.中枢神经系统

D.中间型综合征

E.中毒后“反跳”现象

30. 女性，55岁，因车祸4小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS评分5分，呼吸急促(38次/分)伴口唇严重紫绀，颌面部严重畸形，脉搏摸不到，手足发冷，血压50/30mmHg。假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是( )

A.立即建立静脉通路、抗休克治疗

B.进行创伤严重度评分

C.立即送往医院

D.气管插管、给氧

E.仔细检查，明确诊断

31. 感染性休克患者早期(3小时内)处理不正确的是( )

- A.液体复苏
- B.使用抗生素前留取病原学标本
- C.1 小时内使用抗生素抗感染
- D.为了快速补液必须建立中心静脉置管
- E.监测血乳酸

32. 患者，男，12 岁。海边游玩时不慎溺水，被人救起。体格检查：呼吸急促，肺部可闻及干湿啰音，HR118 次/min，偶有早搏 2~3 次/min，皮肤发绀，近乎“淹溺”。海水淹溺时，下列项目中一般不会发生的是（ ）

- A. 心律失常
- B. 溶血
- C. 低氧血症
- D. 肺水肿
- E. 脑水肿

33. 灾害现场伤病员检伤分类的原则，正确的是（ ）

- A. 优先救治病情危重的伤病员
- B. 对每个伤病员分类时间不要过长
- C. 分类时不需做急救处理
- D. 不放弃每一个伤病员
- E. 不要浪费时间反复评估和分类

34. 女性，55 岁，因车祸 4 小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS 评分 5 分，呼吸急促(38 次/分)伴口唇严重紫绀，颌面部严重畸形，脉搏摸不到，手足发冷，血压 50/30mmHg。经过以上急救措施后，呼吸困难稍有改善，血压略升高，综合其他表现，诊断为:1 多发伤，创伤性休克;2 颅脑损伤，颅内血肿伴左侧脑疝;3 右侧张力性气胸伴血胸;4 腹部闭合伤，肠穿孔伴腹膜炎;5 颌面部外伤，下颌骨骨折。此时，你认为最为合理的处理顺序是（ ）

- A. 继续保持呼吸道通畅、抗休克治疗→胸腔闭式引流→开颅手术→处理颌面部外伤→剖腹手术
- B. 继续保持呼吸道通畅、抗休克治疗→开颅手术→胸腔闭式引流→剖腹手术→处理颌面部外伤
- C. 处理颌面部外伤→开颅手术→胸腔闭式引流→处理骨折→剖腹手术
- D. 继续保持呼吸道通畅. 抗休克治疗→胸腔闭式引流→开颅手术→剖腹手术→处理颌面部外伤
- E. 胸腔闭式引流→开颅手术→剖腹手术→处理颌面部外伤

35. 某化工厂工人有毒气体中毒。应首先采取的救治措施是（ ）

- A. 洗胃
- B. 迅速脱离有毒环境
- C. 清洁皮肤
- D. 利尿
- E. 输液

36. 某高速公路上两辆汽车相撞致 25 人受伤，“120”调度中心接到报警电话后派出急救团队到现场急救。现场有一名外伤伤员，呼之不应，无呼吸、未触及颈动脉搏动。根据 START 分类法，该患者应悬挂的分类标志是（ ）

- A. 黑色
- B. 红色
- C. 黄色
- D. 绿色
- E. 灰色

37. 预防 ICU 院内感染的探视管理中，下列说法不正确的是( )

- A.探视人疑似呼吸道感染，禁止进入 ICU 探视
- B.探视者进入 ICU 前穿隔离衣
- C.探视期间尽量避免触摸患者及周围物体表面
- D.探视时间不超过 2 个小时
- E.进入病室前后洗手

38. 男性，55 岁，肝硬化病史 10 年，因反复发生上消化道出血而行门静脉阻断术。术后患者烦躁、幻视，进而昏迷。该患者意识障碍出现最可能的原因是（ ）

- A. 脑供血不足
- B. 肝性脑病
- C. 麻醉意外

D. 中枢神经系统感染

E. 脑卒中

39. 重症患者代谢变化的主要改变不包括( )

A. 能量消耗增加

B. 糖代谢紊乱

C. 蛋白质分解代谢加强

D. 脂肪氧化率下降

E. 糖类物质氧化率下降

40. 男性，28 岁，因地震后被埋入废墟 6 天，右下肢挤压伤而收入院，查体：T 38.9℃，R 30 次/分，P 136 次/分，BP 77/53mmHg。肉眼血尿，24 小时尿量为 150ml，中心静脉置管后测 CVP 1cmH<sub>2</sub>O。动脉血气分析示：pH 7.28，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 19mmol/L，PaCO<sub>2</sub> 31mmHg。动脉血压及 CVP 监测提示存在（ ）

A. 急性心功能不全

B. 血容量不足

C. 急性肾功能不全

D. 容量血管过度收缩

E. 容量血管过度扩张

41. 全胃肠道外营养的护理要点哪项不正确( )

A. 配制必须严格无菌操作

B. 营养液应 24h 内匀速滴入

C.可存放 48h 以上

D.不可在营养液静脉通道采血、给药等

E.每隔 24h 在无菌操作下更换与静脉导管相接的输液管及输液瓶一次

42. 急诊患者救治过程中第一个重要环节是( )

A.急诊分诊

B.开放气道

C.维持循环

D.转运至抢救室

E.测量生命体征

43. 女性，58 岁，胃癌术后出现吻合口瘘，给予全肠外营养支持 3 周，突发寒战、高热。检查：腹腔引流通畅，双肺呼吸音粗，白细胞计数明显增高。该患者发热的原因，首先应考虑（ ）

A. 与营养素产热有关

B. 高分解代谢状态

C. 高渗性脱水

D. 导管相关感染

E. 高渗性非酮症昏迷

44. 气管切开患者描述不准确的是( )

A.易于固定

B.病人多能耐受

C.易于口腔护理



D.影响病人进食

E.导管短，管腔大，易于吸痰

45. 男性，56 岁，急起头痛、意识障碍 1 小时以“脑出血”入院。患者舌后坠出现鼾式呼吸，此时解除舌后坠堵塞呼吸道的最简易方式是（ ）

A. 环甲膜穿刺

B. 口咽通气道置入

C. 喉罩置入

D. 经口腔气管插管术

E. 气管切开术

46. 心脏骤停早期诊断的最佳指标是( )

A.面色苍白

B.瞳孔散大

C.心音、脉搏消失

D.意识丧失，颈动脉搏动不能摸到

E.呼吸停止

47. 有机磷农药中毒患者可闻到（ ）

A. 杏仁味

B. 苯酚味

C. 酒味

D. 大蒜味

E. 烂苹果味

48. 患者，男性，75岁，晨起在公园习惯性活动时，突然倒地，呼之不应，意识丧失，颈动脉未触及搏动。现场人员紧急呼叫“120”，几分钟后患者被120救护车急速转送至医院。心肺复苏时首选的给药途径是（ ）

A. 中心静脉给药

B. 气管内注射

C. 外周静脉给药

D. 骨髓腔给药

E. 心内注射

49. 患儿，男，8岁，玩耍时不慎溺水，出现意识丧失，呼吸暂停。医院内救护时不用（ ）

A. 给予高流量吸氧

B. 患者恢复心跳后监测血压，维持循环功能，注意输液的量和速度

C. 防止低体温，一定要将患者体温复温到36℃以上

D. 纠正低血容量、水电解质和酸碱平衡

E. 对症处理，积极防止并发症的发生

50. 急诊室来一心前区闷痛6h的男性50岁患者，表现为烦躁、出冷汗，口含硝酸甘油片后不见缓解，医生拟诊急性心肌梗死，为准备协助医师诊断，您认为应选择最有价值的血液学检查项目是（ ）

A. 外周血白细胞计数

B. 红细胞沉降率

C. 血肌红蛋白

D. 肌酸磷酸激酶 (CPK)

E. 乳酸脱氢酶

51. 某患者口服敌敌畏约 7 小时昏迷入院，衣服上呕吐物散发出浓烈酒味及大蒜味。清除毒物的护理措施不包括（ ）

A. 洗胃

B. 催吐

C. 清洁皮肤

D. 脱去污染衣物

E. 硫酸钠导泻

52. 男性，60 岁，因“胸痛 2 小时、呼之不应 10 分钟”入院。查体：无意识，瞳孔散大，对光反射(-)，未扪及颈动脉搏动，未闻及心音及呼吸音。成人心肺复苏胸外心脏按压的正确位置是（ ）

A. 心尖区

B. 胸骨中下 1/3 处

C. 胸骨上段

D. 胸骨左侧

E. 胸骨右侧

53. 男性, 65 岁, 以“化脓性胆管炎”急诊入院。入院查体: T 39.8℃, P 126 次/分, R 34 次/分, BP 76/50mmHg。血常规示: 白细胞 $>16 \times 10^9/L$ , 血气分析示 PaO<sub>2</sub> 63mmHg。该患者最常见的并发症是 ( )

A. ARDS

B. septic shock

C. MODS

D. AKI

E. AFR

54. 病人男性, 48 岁, 以重症肺炎收入 ICU, 病人进入时处于嗜睡状, 口唇发绀, 呼吸困难, 呼吸频率 38 次/min。动脉血气分析显示 PaO<sub>2</sub> 48mmHg, PaCO<sub>2</sub> 39mmHg, 拟行机械通气治疗。可能出现正压通气相关的并发症是 ( )

A. 导管移位

B. 气管黏膜出血

C. 气道梗阻

D. 吞咽困难

E. 气胸

55. 病人男性, 48 岁, 以重症肺炎收入 ICU, 病人进入时处于嗜睡状, 口唇发绀, 呼吸困难, 呼吸频率 38 次/min。动脉血气分析显示 PaO<sub>2</sub> 48mmHg, PaCO<sub>2</sub> 39mmHg, 拟行机械通气治疗。医生为病人建立人工气道, 首选 ( )

A. 气管插管

- B. 气管切开
- C. 安置口咽管
- D. 安置喉罩
- E. 环甲膜穿刺

56. 呼吸衰竭常用动脉血气分析来定义, 即  $\text{PaO}_2$ ( )60mmHg, 伴或不伴有  $\text{PaCO}_2$ ( )50mmHg。

- A. >, <
- B. >, >
- C. <, <
- D. <, >
- E. 以上均不对

57. 氰化物中毒选用的解毒药为( )

- A. 亚硝酸铁
- B. 亚硝酸镁
- C. 亚硝酸钠
- D. 硝酸钠
- E. 活性炭

58. 口服强酸类物质中毒的救护措施, 下列选项中正确的是 ( )

- A. 立即洗胃促进毒物尽快排出
- B. 遵医嘱静脉补液

C. 尽快给患者口服弱碱溶液

D. 禁忌口服碳酸氢钠

E. 呼吸困难者吸氧

59. 现代急危重症护理学最早可追溯到 ( )

A. 第二次世界大战期间

B. 19 世纪克里米亚战争期间

C. 20 世纪 50 年代北欧脊髓灰质炎大流行期间

D. 世界上第一个早产儿监护中心建立时

E. 第一次世界大战期间

60. 北欧出现世界上最早用于监护呼吸衰竭病人的监护病房的时间是 ( )

A. 20 世纪 80 年代初期

B. 20 世纪 60 年代初期

C. 20 世纪 50 年代初期

D. 19 世纪 50 年代初期

E. 20 世纪 70 年代初期

## **二、多选题（共计 20 题，每题 2 分，多选或少选均不得分）**

61. 在处理划伤或切割伤时，以下哪些做法是正确的 ( )

A. 用清水清洗伤口并消毒

B. 用创可贴或绷带包扎伤口

C. 涂抹红药水或紫药水

D. 对于较深的伤口，应尽快就医并缝合

E. 让伤口自然愈合，不做任何处理

62. 遇到癫痫发作患者时，以下哪些急救措施是必要的（ ）

A. 迅速将患者移至安全地点

B. 保护患者的头部和四肢免受伤害

C. 尝试阻止患者的抽搐动作

D. 让患者保持侧卧位，以便口腔分泌物流出

E. 迅速拨打急救电话并等待专业救援

63. 在处理冻伤时，以下哪些做法是正确的（ ）

A. 用温水缓慢复温

B. 用火烤或热水浸泡复温

C. 轻轻除去冻伤部位的衣物

D. 涂抹冻伤药膏并包扎

E. 尽快就医并告知医生伤情

64. 当遇到休克患者时，以下哪些急救措施是有效的（ ）

A. 让患者平躺，抬高双腿

B. 给予患者保暖措施

C. 迅速拨打急救电话并告知病情

D. 给予患者口服补液盐以补充水分(在医生指导下)

E. 尝试让患者自行站立行走

65. 在处理鼻出血时，以下哪些做法是正确的（ ）

A. 让患者头部前倾，以便血液流出

B. 用纸巾或棉球塞住鼻孔止血

C. 用冷毛巾敷在患者鼻部

D. 对于持续出血不止的情况，应尽快就医

E. 让患者平躺休息，避免剧烈运动

66. 遇到心绞痛患者时，以下哪些急救措施是必要的（ ）

A. 迅速让患者安静休息

B. 给予患者舌下含服硝酸甘油(在医生指导下)

C. 让患者自行按摩胸部以缓解疼痛

D. 迅速拨打急救电话并告知病情

E. 尝试让患者深呼吸以放松身心

67. 在处理眼部异物时，以下哪些做法是正确的（ ）

A. 用手直接揉搓眼睛以去除异物

B. 用清水冲洗眼睛

C. 用棉签轻轻擦去异物(如果异物易取)

D. 对于难以去除的异物，应尽快就医

E. 让患者自行用力眨眼以排出异物

68. 当遇到昏迷患者时，以下哪些急救措施是恰当的（ ）



- A. 迅速检查患者的生命体征
- B. 将患者移至安全地点并保持平躺
- C. 给予患者口服醒脑药物
- D. 迅速拨打急救电话并告知病情
- E. 尝试唤醒患者并询问其情况

69. 在处理扭伤时，以下哪些做法是正确的（ ）

- A. 立即用热毛巾敷在扭伤部位
- B. 用绷带或弹性绷带包扎扭伤部位
- C. 给予患者止痛药以减轻疼痛
- D. 对于严重的扭伤，应尽快就医并拍摄 X 光片
- E. 让患者自行活动以恢复功能

70. 遇到产后出血的产妇时，以下哪些急救措施是必要的（ ）

- A. 迅速拨打急救电话并告知病情
- B. 让产妇平躺并保持安静
- C. 给予产妇止血药物以控制出血(在医生指导下)
- D. 对于大量出血的情况，应尽快进行输血治疗
- E. 尝试让产妇自行站立行走以止血

71. 在处理动物咬伤时，以下哪些做法是正确的（ ）

- A. 用清水清洗伤口并消毒
- B. 涂抹红药水或紫药水以标记伤口

C. 对于较深的伤口，应尽快就医并缝合

D. 注射狂犬疫苗以预防狂犬病

E. 让伤口自然愈合，不做任何处理

72. 在处理创伤出血时，以下哪些做法是正确的（ ）

A. 直接用脏手按压伤口止血

B. 使用干净的纱布或绷带加压包扎

C. 将伤口暴露在空气中让其自然止血

D. 抬高受伤部位以减少出血

E. 用力撕扯伤口周围的皮肤来止血

73. 关于创伤后的初步评估，以下哪些内容是需要关注的（ ）

A. 伤员意识状态

B. 伤口的大小和深度

C. 伤员是否穿着名牌服装

D. 是否有骨折或脱臼的迹象

E. 伤员的家庭背景

74. 在搬运创伤伤员时，应遵循哪些原则（ ）

A. 随意拖动伤员，尽快转移

B. 动作轻柔，避免造成二次伤害

C. 让伤员自己行走至安全地点

D. 使用担架或其他合适的搬运工具

E. 忽视伤员的疼痛和呼喊

75. 关于创伤后的清创处理，以下哪些步骤是正确的（ ）

A. 用脏布擦拭伤口周围的污物

B. 使用消毒液清洗伤口

C. 清除伤口内的异物和坏死组织

D. 用力挤压伤口以排出更多血液

E. 让伤口自然愈合，不进行任何处理

76. 在处理开放性骨折时，以下哪些措施是必要的（ ）

A. 试图将骨折部位复位

B. 用夹板或支具固定骨折部位

C. 将骨折部位暴露在空气中

D. 止血并覆盖伤口

E. 让伤员自行活动以检验骨折是否严重

77. 关于创伤后的疼痛管理，以下哪些做法是正确的（ ）

A. 给予伤员强效止痛药以立即缓解疼痛

B. 评估疼痛程度，并给予适当的止痛措施

C. 忽视伤员的疼痛诉求

D. 使用非药物方法(如冷敷)来缓解疼痛

E. 让伤员自行忍受疼痛，不进行任何干预

78. 在创伤急救中，以下哪些物品是应具备有的（ ）

- A. 干净的纱布和绷带
- B. 消毒液或酒精
- C. 止血带或止血钳
- D. 随意找到的毛巾或纸巾
- E. 专业的医疗急救箱

79. 关于创伤后的感染预防，以下哪些措施是有效的（ ）

- A. 用脏手触摸伤口
- B. 保持伤口清洁和干燥
- C. 定期更换敷料
- D. 使用未消毒的器具处理伤口
- E. 避免让伤口接触污染物

80. 在处理头部创伤时，以下哪些做法是正确的（ ）

- A. 用力摇晃伤员以检查其是否清醒
- B. 轻轻扶稳伤员头部，避免剧烈晃动
- C. 用脏布或纸巾堵塞伤口
- D. 观察伤员是否有呕吐、昏迷等异常表现
- E. 立即给伤员喝水以缓解不适