

2024年河南省高等职业教育技能大赛

急救技能赛项理论模块第三套

一. 单选题（共计 60 题，每题 1 分）

1.某冠状动脉粥样硬化性心脏病患者因胸痛到急诊就诊，在接受检查过程中,突然发生心搏骤停,经积极有效抢救现已恢复自主循环。心电图监护示:窦性心律,心率 120 次/min,血压 90/60mmHg,呼吸 26 次/min,血氧饱和度 92%。给予下列的救治措施中，可除外()

A.维持收缩压在 90mmHg 以上

B.准备配合气管插管

C.昏迷者给予目标温度管理

D.尽快描记 12 导联心电图

E.做好急诊进行 PCI 的准备

2.多发伤的并发症中发病率最高的是()

A.颅脑损伤

B.胸腹脏器损伤

C.休克

D.感染

E.心衰

3.颅内压轻度增高，是指()

A.ICP>40mmHg

B.ICP:31~40mmHg

C.ICP:21~30mmHg

D.ICP:15~20mmHg

E.ICP<15mmHg

4.肠外营养最常见的并发症是()

A.置管操作相关的并发症

B.空气栓塞

C.导管堵塞

D.感染性并发症

E.代谢性并发症

5.肠外营养最严重的并发症是()

A.置管操作相关的并发症

B.空气栓塞

C.导管堵塞

D.感染性并发症

E.代谢性并发症

6.观察呼吸机工作是否正常，下列做法不妥的是()

A.各管道连接是否紧密

B.随时检查有无脱落

C.各参数是否与病情符合

D.发现异常情况停止使用

E.及时检查有无漏气

7.下列关于气管内插管叙述不正确的是()

A.临床急救中最常用的是经口明视插管术

B.成人经口气管插管深度为距门齿 $22\pm 2\text{cm}$

C.成人经鼻气管插管深度为 $27\pm 2\text{cm}$

D.成人经鼻气管插管深度为 $22\pm 2\text{cm}$

E.气管插管套囊压力需保持在 $25\sim 30\text{cmH}_2\text{O}$

8.下列哪项不是机械通气常用设置参数()

A.潮气量

B.呼吸频率

C.触发灵敏度

D.吸呼比

E.呼气末正压

9.某患者血气结果如下: $\text{pH}7.45$, $\text{HCO}_3^-15\text{mmol/L}$, $\text{PaCO}_260\text{mmHg}$,
该患者可能发生()

A.呼吸性酸中毒

B.呼吸性碱中毒

C.代谢性酸中毒

D.代谢性碱中毒

E.混合型酸碱失衡

10.患者，男性，75岁，晨起在公园习惯性活动时，突然倒地，呼之不应，意识丧失，颈动脉未触及搏动。现场人员紧急呼叫“120”，几分钟后患者被120救护车急速转送至医院。肾上腺素用于心脏骤停的主要药理作用为（ ）

A.增加心肌收缩力

B.扩张外周血管

C.减慢心率

D.抗心律失常

E.纠正酸碱失衡

11.什么情况下病人会因开通气道而恢复呼吸心跳?()

A.呼吸道梗阻

B.心肌梗死的猝死

C.多发伤

D.休克

E.电击

12.引起心搏骤停的“5H”病因中不包括()

A.低钠血症

B.低血容量

C.低氧血症

D.酸中毒

E.低体温

13.神志清的 MODS 病人，心理障碍干预措施不包括()

A.与病人沟通

B.尊重病人人格

C.家属的支持

D.精神抚慰

E.注意监测参数变化

14.常见的水电解质紊乱类型不包括()

A.等渗性失水

B.低渗性失水

C.高渗性失水

D.高钾血症

E.低蛋白血症

15.影响颅内压的因素不包括()

A.PaCO₂

B.PaO₂

C.HR

D.血压

E.CVP

16.患者行有创机械通气时，以下哪项不是反映气道压力的监测指标()

- A.支持压力
- B.气道峰压
- C.平均气道压
- D.平台压
- E.呼气末正压

17.以下哪项不是心脏骤停时的心电图表现()

- A.室颤
- B.无脉性室速
- C.电-机械分离
- D.心室静止
- E.室上性心动过速

18.患者，男性，55岁，因脑外伤，在全麻下行开颅探查术。术后气管插管,请问气管导管气囊隔几小时放松一次()

- A.1 小时
- B.2 小时
- C.3 小时
- D.4 小时
- E.5 小时

19.在抢救心搏骤停患者时,医生已完成气管插管,气囊充气并确认插管位置正确,胸外按压持续进行中。在接下来的通气操作中,下列描述正确的是()

- A.避免高浓度给氧
- B.每次通气可见胸廓隆起,通气频率越快越好
- C.每次通气可见胸廓隆起,通气频率越慢越好
- D.30次胸外按压后,给予2次通气
- E.每6s给予一次通气,胸外按压不停歇

20.急性发热伴结膜充血,可考虑()

- A.细菌性肺炎
- B.流行性出血热
- C.疟疾
- D.猩红热
- E.结缔组织病

21.心室颤动患者的脉搏特征是()

- A.快而规则
- B.慢而规则
- C.快而不规则
- D.慢而不规则
- E.摸不到

22.关于无创血压监测,下列不正确的是()

- A.无创伤性，重复性好
- B.自动测压，省时省力，易掌握
- C.能间接判断是否有心律失常
- D.自动检测血压袖带的大小，测量平均动脉压准确
- E.可引起肢体神经缺血、麻木等并发症

23.有创动脉测压首选测压途径是()

- A.桡动脉
- B.足背动脉
- C.肱动脉
- D.尺动脉
- E.股动脉

24.女性，23岁，胸闷、气促、紫绀，鼻导管吸氧6L/min，R36次/分，BP100/60mmHg，动脉血气分析示：pH7.35，PaCO₂40mmHg，PaO₂46mmHg，拟“ARDS”收入ICU。医生予该患者气管插管接呼吸机辅助呼吸，以下哪一项不是机械通气常用设置参数()

- A.潮气量
- B.呼吸频率
- C.触发灵敏度
- D.同步间歇指令性通气
- E.吸呼比

25.关于中心静脉压的临床意义，表述不正确的是()

- A.CVP $<5\text{cmH}_2\text{O}$, 表示血容量不足时, 应迅速补充血容量
- B.CVP 在 $15\sim 20\text{cmH}_2\text{O}$ 时, 常见于右心衰、三尖瓣关闭不全、心包填塞或补液过快过多
- C.CVP $<5\text{cmH}_2\text{O}$, 必须立即迅速补充血容量
- D.CVP $>20\text{cmH}_2\text{O}$ 时, 应暂停输液或严格控制输液速度, 并给予强心、利尿等处理
- E.临床中应结合血压变化综合分析判断 CVP 的临床意义

26.急诊医学发展最快的国家是()

- A.德国
- B.日本
- C.美国
- D.芬兰
- E.加拿大

27.反映急救速度的主要客观指标是()

- A.急救中心的面积
- B.服务区域
- C.平均反应时间
- D.基本设施
- E.基本设备

28.主动脉夹层患者的典型临床表现是()

- A.胸部和背部持续烧灼样疼痛

B.突发胸部前后移行的撕裂样疼痛，伴全身冷汗、血压升高

C.劳力后左胸部剧烈疼痛，休息后缓解

D.心前区针刺样疼痛

E.左胸部疼痛

29.怀疑有颈椎或脊椎损伤的病人，在搬运时下列哪项错误()

A.尽可能用颈托固定颈部

B.搬运时应固定头部，避免摇摆

C.可用海绵垫抬动

D.保持脊椎的轴线稳定

E.将病人固定在硬板担架上搬运

30.下列哪项不属于“生命链”的环节()

A.早期通路

B.早期心肺复苏

C.早期转送

D.早期心脏除颤

E.早期高级生命支持

31.在现场救护时，下列哪项对病人采取的体位不正确()

A.现场需心肺复苏者应置于复苏体位

B.毒蛇咬伤时应放低患肢

C.昏迷病人仰卧位

D.咯血者向患侧卧位

E.脚扭伤应抬高患肢

32.现场救护人员判断伤者有无意识，正确的方法是()

A.轻拍伤病员的两侧肩部，大声呼唤

B.摇晃伤病员身体，大声呼唤

C.看伤病员瞳孔

D.测伤病员脉搏

E.测血压

33.患者，男，62岁。重症胰腺炎发病后第2d出现烦躁、进行性呼吸困难，呼吸频率38次/min,发绀,听诊肺部可闻及少许湿啰音。给予氧疗7Lmin后无缓解,该患者可能出现了()

A.心力衰竭

B.急性呼吸窘迫综合征

C.哮喘

D.败血症

E.上呼吸道感染

34.患者，男，18岁。参加5000m长跑过程中，突然出现左侧胸痛，并伴随呼吸疼痛，呼吸憋气，胸闷，不能平卧。查体:T36.1℃，P89次/min，听诊胸部呼吸音减弱，此患者初步判断为()

A.肺栓塞

B.哮喘持续发作

C.自发性气胸

D.急性呼吸窘迫综合征

E.慢性阻塞性肺疾病急性发作

35.灾害医学救援队伍中医护人员一般应具备的工作经历是()

A.5 年以上

B.10 年以上

C.3 年以上

D.2 年以上

E.1 年以上

36.关于转运工具的特点，下列描述不妥的是()

A.担架转运较舒适平稳，但速度慢、人力消耗大

B.汽车转运速度快，但在不平的路上行驶，颠簸较严重

C.轮船转运平稳，但遇风浪颠簸厉害，极易引起是船

D.飞机转运速度快、效率高，适用于转运任何急症患者

E.汽艇运送速度快，一般用于洪涝灾害时的运输工具

37.下列属于完整和最适宜的初级评估内容的是()

A.气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、有无家属陪同

B.气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、体温、脉搏

C.循环功能、气道及颈椎、血氧饱和度、全身体检

D.气道及颈椎、呼吸功能、循环功能、神志状况、暴露患者

E.气道及颈椎、呼吸、循环、神志状况、暴露患者、有无家属陪同

38.烧冲复合伤的治疗原则不包括()

A.处理烧伤复合伤时，必须权衡利弊，服从主要矛盾

B.必要时，在患者病情允许的情况下可采取辅助检查措施

C.复合伤威胁伤员生命时，应在烧伤复苏的同时优先进行紧急处理

D.预防性注射破伤风抗毒素或者破伤风免疫球蛋白

E.避免早期应用抗生素

39.担架搬运时()

A.伤员头部在前，足部在后

B.伤员头部在后，足部在前

C.伤员俯卧，足部在前

D.伤员仰卧，足部在前

E.以上都可以

40.患者，女，55岁，因告诉车祸4h入院，伤后当时浅昏迷，GCS评分5分，呼吸急促(38次/min)伴口唇严重发绀，颌面部严重畸形，脉摸不到，手足发冷，血压50/30mmHg。假如对该患者进行院前评分，按照修正的创伤记分，该伤员的RTS为()

A.6分，属于轻伤

B.8分，属于重伤

C.4分，属于重伤

D.6分，属于重伤

E.12 分，属于轻伤

41. 婴儿发生气道梗阻时，采用的急救方法正确的是()

A. 背部叩击、胸部冲击法

B. 立位腹部冲击法

C. 卧位腹部冲击法

D. 立位胸部冲击法

E. 卧位胸部冲击法

42. 气管插管时间不宜超过()

A. 6h

B. 12h

C. 24h

D. 36h

E. 72h

43. 患者，女，50 岁。冬天在家用煤炉烤火时出现浅昏迷症状，心率 130 次/分，皮肤多汗，面色潮红，120 送至医院。初步考虑为一氧化碳中毒。请问此时患者最容易遭受损害的脏器为()

A. 肺和脑

B. 脑和心

C. 肾

D. 胰腺

E. 肾和肺

44.患者，男，50岁，农药厂工人，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷农药中毒，使用阿托品治疗时出现瞳孔扩大，颜面潮红，口干，皮肤干燥，肺部湿啰音消失，心率加快现象，阿托品用法正确的是()

- A.立即停药
- B.逐渐减量直到症状消失后停药
- C.继续原剂量治疗直到症状消失后停药
- D.逐渐减量直到症状消失后 24h 停药
- E.继续原剂量治 24h 后停药

45.急性有机磷中毒的患者，医嘱给予阿托品静脉注射，在给药后患者最可能出现()

- A.口干
- B.血压下降
- C.心率减慢
- D.出汗增多
- E.呼吸加快

46.李先生，42岁。山体滑坡掩埋现场救出，呼吸微弱。查体：意识淡漠，面色发绀，口鼻有泥土，右小腿变形，皮肤伤口出血。应首先处理的是()

- A.清理呼吸道，清除口鼻异物
- B.人工辅助呼吸

C.清创

D.止血

E.骨折固定

47.患者，女，20岁，不慎落入海里，15min前获救，“120”医护人员发现患者剧烈咳嗽、皮肤发绀、烦躁不安、颜面肿胀、球结膜充血、双肺闻及干湿啰音。下列措施不正确的是()

A.通畅呼吸道

B.给予高流量吸氧

C.碱化尿液

D.脑复苏

E.快速补充生理盐水或平衡溶液以稀释血液

48.患者，男，45岁，农民，因在高温闷热环境下进行劳作，近日出现全身乏力，体温高达40℃以上，同时出现谵妄、抽搐，皮肤无汗症状，入院后诊断为热射病。请问其首要的治疗措施为()

A.降温

B.吸氧

C.抗休克

D.治疗脑水肿

E.纠正水、电解质紊乱

49.患者，男性，55岁。车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是()

- A.开放性骨折
- B.腹部疼痛
- C.外伤性大出血
- D.颅脑外伤
- E.发热 39℃

50.患儿，女，11岁，水塘边玩耍时不慎溺水，现意识丧失，呼吸停止，护理人员达到现场急救后应立即采取的处理措施是()

- A.人工呼吸
- B.胸外心脏按压
- C.清除口鼻腔分泌物和异物
- D.建立静脉通路
- E.寻求医生帮助

51.患者女性，45岁。因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是()

- A.休克
- B.窒息
- C.肺部感染
- D.肾衰竭
- E.脱水、酸中毒

52.医院分诊处设置的人员基本组合是()

- A.急诊医生与护士

- B.急诊护士与护理辅助人员
- C.急诊护士、护理辅助人员、职员
- D.急诊护士、护理辅助人员、职员和保安人员
- E.急诊医生与护士、护理辅助人员、职员和保安人员

53.大部分国家和地区采用的急诊分诊系统为()

- A.三级分诊系统
- B.四级分诊系统
- C.五级分诊系统
- D.危重程度分诊系统
- E.四级五类分诊系统

54.分诊程序应及时而简洁，一般要求在多长时间内完成()

- A.1-2 分钟
- B.3-5 分钟
- C.5-8 分钟
- D.8-10 分钟
- E.10-15 分钟

55.急诊分诊程序包括()

- A.问诊、测量生命体征
- B.问诊、测量生命体征、身体评估、分诊分流、分诊护理和分诊记录
- C.急诊分诊、分科、测量生命体征

D.急诊问诊、测量生命体征、身体评估

E.急诊问诊、测量生命体征、分诊护理和分诊记录

56.患者，男性，49岁，既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后16天出院，突发高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者行气道评估时，患者突然面色青紫。根据预检分诊标准流程，该患者预检分级为()

A.I级

B.II级

C.III级

D.IV级

E.V级

57.某高速路上发生一起货车追尾车祸伤。伤员，男，32岁，神志清楚，呼吸困难，受伤5min后呼“120”出诊，急救人员现场初步诊断为连枷胸。肇事司机要求将患者送到另一家医院(距离15km)，急救人员的做法及理由正确的是()

A.签署120院前转送知情同意后转送

B.向“120”中心报告

C.患者病情危重，有生命危险，拒绝转送到另一家较远的医院

D.急救人员不选择另一家不熟悉的医院

E.询问患者意见

58.阿托品中毒可引起()

A.瞳孔扩大

B.瞳孔缩小

C.流涎

D.失明

E.脸色苍白

59.心搏骤停典型的“三联征”为()

A.意识丧失、大动脉搏动消失、呼吸停止

B.短暂抽搐、意识丧失、呼吸停止

C.意识丧失、瞳孔散大、面色苍白

D.呼吸停止、血压下降、大动脉搏动消失

E.大小便失禁、意识丧失、全身青紫

60.引起成人心脏骤停的最常见心源性病因因为()

A.心室停顿

B.肥厚性心脏病

C.心律失常型心脏病

D.病毒性心肌炎

E.冠心病

二、多选题（共计 20 题，每题 2 分，多选或少选均不得分）

61.在处理划伤或切割伤时，以下哪些做法是正确的()

A.用清水清洗伤口并消毒

- B.用创可贴或绷带包扎伤口
- C.涂抹红药水或紫药水
- D.对于较深的伤口，应尽快就医并缝合
- E.让伤口自然愈合，不做任何处理

62.遇到癫痫发作患者时，以下哪些急救措施是必要的()

- A.迅速将患者移至安全地点
- B.保护患者的头部和四肢免受伤害
- C.尝试阻止患者的抽搐动作
- D.让患者保持侧卧位，以便口腔分泌物流出
- E.迅速拨打急救电话并等待专业救援

63.在处理冻伤时，以下哪些做法是正确的()

- A.用温水缓慢复温
- B.用火烤或热水浸泡复温
- C.轻轻除去冻伤部位的衣物
- D.涂抹冻伤药膏并包扎
- E.尽快就医并告知医生伤情

64.当遇到休克患者时，以下哪些急救措施是有效的()

- A.让患者平躺，抬高双腿
- B.给予患者保暖措施
- C.迅速拨打急救电话并告知病情

D.给予患者口服补液盐以补充水分(在医生指导下)

E.尝试让患者自行站立行走

65.在处理鼻出血时，以下哪些做法是正确的()

A.让患者头部前倾，以便血液流出

B.用纸巾或棉球塞住鼻孔止血

C.用冷毛巾敷在患者鼻部

D.对于持续出血不止的情况，应尽快就医

E.让患者平躺休息，避免剧烈运动

66.遇到心绞痛患者时，以下哪些急救措施是必要的()

A.迅速让患者安静休息

B.给予患者舌下含服硝酸甘油(在医生指导下)

C.让患者自行按摩胸部以缓解疼痛

D.迅速拨打急救电话并告知病情

E.尝试让患者深呼吸以放松身心

67.在处理眼部异物时，以下哪些做法是正确的()

A.用手直接揉搓眼睛以去除异物

B.用清水冲洗眼睛

C.用棉签轻轻擦去异物(如果异物易取)

D.对于难以去除的异物，应尽快就医

E.让患者自行用力眨眼以排出异物

68.当遇到昏迷患者时，以下哪些急救措施是恰当的()

- A.迅速检查患者的生命体征
- B.将患者移至安全地点并保持平躺
- C.给予患者口服醒脑药物
- D.迅速拨打急救电话并告知病情
- E.尝试唤醒患者并询问其情况

69.在处理扭伤时，以下哪些做法是正确的()

- A.立即用热毛巾敷在扭伤部位
- B.用绷带或弹性绷带包扎扭伤部位
- C.给予患者止痛药以减轻疼痛
- D.对于严重的扭伤，应尽快就医并拍摄 X 光片
- E.让患者自行活动以恢复功能

70.遇到产后出血的产妇时，以下哪些急救措施是必要的()

- A.迅速拨打急救电话并告知病情
- B.让产妇平躺并保持安静
- C.给予产妇止血药物以控制出血(在医生指导下)
- D.对于大量出血的情况，应尽快进行输血治疗
- E.尝试让产妇自行站立行走以止血

71.在处理动物咬伤时，以下哪些做法是正确的()

- A.用清水清洗伤口并消毒

- B.涂抹红药水或紫药水以标记伤口
- C.对于较深的伤口，应尽快就医并缝合
- D.注射狂犬疫苗以预防狂犬病
- E.让伤口自然愈合，不做任何处理

72.在处理创伤出血时，以下哪些做法是正确的()

- A.直接用脏手按压伤口止血
- B.使用干净的纱布或绷带加压包扎
- C.将伤口暴露在空气中让其自然止血
- D.抬高受伤部位以减少出血
- E.用力撕扯伤口周围的皮肤来止血

73.关于创伤后的初步评估，以下哪些内容是需要关注的()

- A.伤员意识状态
- B.伤口的大小和深度
- C.伤员是否穿着名牌服装
- D.是否有骨折或脱臼的迹象
- E.伤员的家庭背景

74.在搬运创伤伤员时，应遵循哪些原则()

- A.随意拖动伤员，尽快转移
- B.动作轻柔，避免造成二次伤害
- C.让伤员自己行走至安全地点

D.使用担架或其他合适的搬运工具

E.忽视伤员的疼痛和呼喊

75.关于创伤后的清创处理，以下哪些步骤是正确的()

A.用脏布擦拭伤口周围的污物

B.使用消毒液清洗伤口

C.清除伤口内的异物和坏死组织

D.用力挤压伤口以排出更多血液

E.让伤口自然愈合，不进行任何处理

76.在处理开放性骨折时，以下哪些措施是必要的()

A.试图将骨折部位复位

B.用夹板或支具固定骨折部位

C.将骨折部位暴露在空气中

D.止血并覆盖伤口

E.让伤员自行活动以检验骨折是否严重

77.关于创伤后的疼痛管理，以下哪些做法是正确的()

A.给予伤员强效止痛药以立即缓解疼痛

B.评估疼痛程度，并给予适当的止痛措施

C.忽视伤员的疼痛诉求

D.使用非药物方法(如冷敷)来缓解疼痛

E.让伤员自行忍受疼痛，不进行任何干预

78.在创伤急救中，以下哪些物品是应备有的()

- A.干净的纱布和绷带
- B.消毒液或酒精
- C.止血带或止血钳
- D.随意找到的毛巾或纸巾
- E.专业的医疗急救箱

79.关于创伤后的感染预防，以下哪些措施是有效的()

- A.用脏手触摸伤口
- B.保持伤口清洁和干燥
- C.定期更换敷料
- D.使用未消毒的器具处理伤口
- E.避免让伤口接触污染物

80.在处理头部创伤时，以下哪些做法是正确的()

- A.用力摇晃伤员以检查其是否清醒
- B.轻轻扶稳伤员头部，避免剧烈晃动
- C.用脏布或纸巾堵塞伤口
- D.观察伤员是否有呕吐、昏迷等异常表现
- E.立即给伤员喝水以缓解不适