

2024年河南省高等职业教育技能大赛

急救技能赛项理论模块第五套

一、单选题（共计 60 题，每题 1 分）

1.我国开始建立正式的急救医疗服务体系的时间是()

A.1965 年

B.1973 年

C.1976 年

D.1980 年

E.1986 年

2.急性心力衰竭较为常见的是()

A.急性肺水肿

B.心源性休克

C.急性左心衰

D.急性右心衰

E.呼吸困难

3.遇到开放性气胸的患者应该立即()

A.清创处理后包扎

B.止痛

C.氧气吸入

D.在伤侧第二肋间穿刺放气

E.封闭伤口

4.患者，女，45岁，胸部外伤致开放性气胸，出现呼吸困难和紫绀。给予立即封闭胸壁伤口，行闭式胸膜腔引流术。引流管不慎脱出，应该首先()

A.给患者吸氧

B.嘱患者屏住呼吸

C.把脱出的引流管重新插入

D.用手捏紧引流口周围的皮肤

E.报告医生

5.20世纪50年代初期北欧脊髓灰质炎大流行期间，下列哪种仪器首次被用于患者救治()

A.人工呼吸机

B.血液透析机

C.心电监护仪

D.除颤仪

E.输液泵

6.患者女，20岁，因“上腹及脐周外伤后全腹剧烈疼痛2h”来诊。查体：P100次/min，BP90/70mmHg；意识清楚。面色苍白；全腹有腹膜刺激征。最先考虑的诊断是()

A.肝、脾破裂

B.胆囊破裂

C.小肠破裂

D.腹壁血肿

E.胃破裂

7.急救医疗服务体系不包括()

A.院前救护

B.到达急诊科后的处理

C.普通病房的护理

D.重症监护病房（ICU）的护理

E.转运途中的监护

8.男性患者，48岁，开胸术后2天呼吸快，有呼吸窘迫感，之后出现发绀，吸氧无好转。肺部未闻啰音，X线胸片见异常，动脉血氧分压下降，当前病人发生了()

A.呼吸窘迫综合征

B.肺部感染

C.急性心衰

D.肺不张

E.胸膜炎

9.某患者，因车祸致骨盆骨折大出血，误输异型血后无尿5天，无休克。最有效的治疗措施为()

A.输注呋塞米(速尿)

B.输注甘露醇

C.血液透析

D.输注碳酸氢钠

E.输注地塞米松

10.患者，男性，38岁，矿工。因在坑道工作时塌方，被埋10小时后救出，双大腿及臀部明显肿胀血钾 5.5mmol/L ，诊断为挤压综合征。

为观察肾脏并发症，以下最有意义的是()

A.血压、脉搏

B.中心静脉压

C.神志、瞳孔

D.出血、感染

E.尿量、尿钠

11.关于院前急救的原则，下列哪种说法不妥()

A.先施救后排险，先重伤后轻伤

B.急救与呼救并重

C.先施救后运送

D.转送与监护急救相结合

E.紧密衔接，前后一致

12.我国城区急救半径应()

A. $\leq 3\text{km}$

B. $\leq 4\text{km}$

C. $\leq 5\text{km}$

D.≤6km

E.≤8km

13.在急救工作中，目前我国最常用的运输工具是()

A.担架

B.救护车

C.飞机

D.火车

E.轿车

14.某人原有慢性阻塞性肺疾病，有呼吸困难、发绀，近日咳嗽加剧，突然发生右侧胸痛，约 30 分钟后呼吸困难突然加剧，患侧胸壁叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失。该变化是()

A.膈下脓肿

B.腹水

C.自发性气胸

D.肋骨骨折

E.肋间神经痛

15.夜班护士发现一支气管扩张症病人咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，首先要做的是()

A.应用呼吸兴奋剂

B.清除呼吸道积血

C.立即行气管插管

D.立即通知医生

E.给予氧气吸入

16.现场快速评估患者病情时，应首先判断()

A.意识

B.气道

C.呼吸

D.体温

E.血压

17.男，32岁，不慎从3米高坠落。当即昏迷约3小时。醒后出现头痛、呕吐，右耳道流血性液体、口向左歪。诊断应该考虑()

A.脑挫伤、颅前窝骨折

B.脑震荡、颅后窝骨折

C.脑震荡、颅前窝骨折

D.脑挫伤、颅中窝骨折

E.脑震荡、颅中窝骨折

18.男性患者，74岁，在全麻下手术后出现呼吸困难并有鼾声，首先采取的措施是()

A.气管插管

B.气管切开

C.环甲膜穿刺

D.托起下颌

E.吸痰

19.现场救护过程中，在检伤与分类中必须采取的原则是()

A.先对患者进行分类，再抢救危重患者

B.先观察患者生命体征

C.边检伤、边分类、边抢救，同时并举

D.先将患者移至平地，再进行检伤

E.先抢救危重患者，再进行分类

20.下列哪项不属于“生命链”的环节()

A.早期通路

B.早期心肺复苏

C.早期转送

D.早期心脏除颤

E.早期高级生命支持

21.有机磷农药中毒烟碱样症状是()

A.流涎

B.肌肉抽搐

C.血压升高

D.肌纤维颤动

E.呼吸机麻痹

22.某市三甲医院成立急诊科，下列哪项不属于急诊科的设置
()

- A.预检分诊处
- B.急诊诊查室
- C.急诊抢救室
- D.急诊换药室
- E.急诊观察室

23.患者，男性，71岁。因晚餐时情绪激动。饭后自感咽部及下额有“紧缩性发闷”，并放射至颈部，来院急诊前自含硝酸甘油后憋闷感逐渐缓解。应考虑为()

- A.脑供血不足
- B.颈椎病
- C.咽喉炎
- D.心绞痛
- E.心功能不全

24.急救医疗服务体系的主要作用不包括()

- A.及时有效的院前救治
- B.科学管理急诊科，组织急救技能训练
- C.对突发性的重大事故，及时组织抢救
- D.战地救护
- E.门诊随访

25.一氧化碳重度中毒患者最佳酌氧疗方式是()

- A.持续高流量给氧
- B.持续低流量给氧
- C.50%乙醇湿化后给氧
- D.高压氧治疗
- E.间歇高流量给氧

26.下面关于食管胃底静脉曲张破裂出血病人的饮食护理中不妥的是()

- A.止血后即可渐进高热量、高蛋白饮食
- B.应细嚼慢咽
- C.避免刺激性食物
- D.避免粗糙、坚硬食物
- E.出血期间应禁食

27.急诊抢救室对抢救药品及设备有严格的管理制度，下列制度哪项是错误的()

- A.定人管理
- B.定品种、数量
- C.定期检查
- D.定位放置
- E.外借时一定要登记

28.新建一所三甲综合性医院，按急危重症医学要求，抢救室必备的急救药品除外下列哪类药物()

- A. 升压药
- B. 呼吸兴奋剂
- C. 解毒药
- D. 镇静药
- E. 抗生素

29.患者男性，76岁，有胃溃疡病史8年，突然呕血2000ml，血压50/20mmHg，心率200次/分，此时首先应采取的措施为()

- A. 嘱病人严格卧床休息，采取平卧位、头偏向一侧
- B. 准备急查B超
- C. 准备给予止血药物
- D. 立即开放静脉补充血容量
- E. 嘱病人禁食

30.患者，男，28岁，暴饮暴食后出现上腹部绞痛，向肩背部放射，送到医院急诊，此时最具诊断意义的实验室检查是()

- A. 血清脂肪酶测定
- B. 血清淀粉酶测定
- C. 尿淀粉酶测定
- D. 血糖测定
- E. 血钙测定

31.ICU 是院内感染的高发区，下列关于原因分析错误的说法是()

- A.患者病情危重，病种复杂
- B.患者机体抵抗力低下
- C.各种侵入性治疗、护理操作较多
- D.危重患者相对集中
- E.进出 ICU 工作人员多

32.下列哪种血气分析变化属于 I 型呼吸衰竭()

- A. PaO_2 55mmHg, PaCO_2 40mmHg
- B. PaO_2 65mmHg, PaCO_2 40mmHg
- C. PaO_2 75mmHg, PaCO_2 30mmHg
- D. PaO_2 50mmHg, PaCO_2 60mmHg
- E. PaO_2 85mmHg, PaCO_2 55mmHg

33.口服有机磷农药中毒，一般出现症状的时间为()

- A.10min--2 小时
- B.2--6 小时
- C.5--7 小时
- D.8--12 小时
- E.12--24 小时

34.遇到癫痫发作患者时，以下哪个急救措施是非必要的()

- A.迅速将患者移至安全地点
- B.保护患者的头部和四肢免受伤害
- C.尝试阻止患者的抽搐动作
- D.让患者保持侧卧位，以便口腔分泌物流出
- E.迅速拨打急救电话并等待专业救援

35.在处理冻伤时，以下哪个做法是错误的()

- A.用温水缓慢复温
- B.用火烤或热水浸泡复温
- C.轻轻除去冻伤部位的衣物
- D.涂抹冻伤药膏并包扎
- E.尽快就医并告知医生伤情

36.在交通事故中抢救患者最主要的是让患者入院，下列不属于院前急救运转模式的是()

- A.独立型
- B.指挥型
- C.轮转型
- D.院前型
- E.依托型

37.当遇到休克患者时，以下哪个急救措施是无效的()

- A.让患者平躺，抬高双腿

B.给予患者保暖措施

C.迅速拨打急救电话并告知病情

D.给予患者口服补液盐以补充水分(在医生指导下)

E.尝试让患者自行站立行走

38.现场对危重患者进行病情评估，如果桡动脉触摸不清，则说明收缩压()

A.<80mmHg

B.<70mmHg

C.<60mmHg

D.<50mmHg

E.<40mmHg

39.患者，男性，28岁。在海中游泳时不慎溺水，被送到急诊室。体格检查：心率45次/分，血压90/60mmHg;神志不清，口流海水，呼吸微弱。如医生不在场，护士的下列处理中正确的是()

A.立即呼叫医生，等待医嘱

B.立即将病人头偏向一侧，吸出口腔异物，给予吸氧

C.立即心外按压

D.立即心电监护

E.先测生命体征

40.抢救心肺复苏患者时，下列哪项不是团队成员核心技能()

A.互相支持

B.领导力

C.情境监管

D.独立行动

E.沟通

41.院前急救时，首先抢救下列哪种患者并送进医院 ICU()

A.急性心肌梗死

B.晚期肺癌

C.流行性出血热

D.脑外伤后植物状态

E.股骨骨折

42.医生对急危重症患者进行现场快速评估，下列叙述中哪项不正确()

A.对婴儿可轻拍面颊观察有无哭泣反应以判断意识

B.一看、二听、三触，判断患者有无自主呼吸

C.触摸脉搏，了解患者的血液循环

D.观察气道是否畅通、有无梗阻

E.触摸肢体皮肤，了解有无发热

43.某综合医院急诊科接到卫生主管部门通知，某工地有 20 名工人因午饭后集体出现腹痛、呕吐、腹泻，需启动突发公共卫生事件应急预案。该项任务属于医院急诊科的下列哪项主要任务()

A.急救、急诊医疗

B.普及急救知识

C.科研

D.教学培训

E.接受上级部门指派的临时救治任务

44.成批中毒、神志不清患者被送进某医院急诊科，急诊科的护士应用的正确诊疗识别手段是()

A.应用腕带作为诊疗识别手段

B.应用患者真实姓名

C.应用患者的年龄和性别

D.应用患者的单位

E.在患者手上写上编号

45.某化工厂工人有毒气体中毒。应首先采取的救治措施是()

A.洗胃

B.迅速脱离有毒环境

C.清洁皮肤

D.利尿

E.输液

46.患者，女性，16岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。根据患者烧伤部位的特点，护士应重点观察()

A.呼吸功能

B. 上肢血液循环

C. 意识

D. 疼痛程度

E. 血压

47. 患者，男性，75 岁，晨起在公园习惯性活动时，突然倒地，呼之不应，意识丧失，颈动脉未触及搏动。现场人员紧急呼叫“120”，几分钟后患者被 120 救护车急速转送至医院。心肺复苏的首选药为 ()

A. 利多卡因

B. 肾上腺素

C. 去甲肾上腺素

D. 阿托品

E. 洛贝林

48. 患者，男性，49 岁，既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后 16 天出院，突发高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者行气道评估时，患者突然面色青紫。医生诊察后判定患者气道部分阻塞，昏迷患者最常见气道阻塞的原因是 ()

A. 口腔内异物

B. 呕吐物

C. 出血快

D. 咽喉部肿胀

E.舌根后坠

49.患者，女性，53岁。因右手腕桡骨下段骨折，医生给患者复位时，护士的正确做法是()

A.帮助医生用力复位

B.让患者大声喊叫发泄痛苦

C.与患者交谈分散注意力

D.陪同患者一起哭泣

E.告知注意事项

50.患者，男性，48岁。因昏迷被家属送急诊科就诊。为提高患者身份识别的准确性，下列做法中哪项是错误的()

A.各种处置和治疗前同时使用2种患者身份识别方法

B.使用腕带作为身份识别的标识制度

C.让家属说出患者姓名

D.实行双人核对制度

E.核对床号、药名、治疗途径

51.患者，女性，72岁。邻居发现其意识不清。送入医院急诊科。据邻居说患者患有糖尿病多年，一直在用药治疗，看到过其注射胰岛素。体格检查：呼吸22次/分，脉搏70次/分，血压110/80mmHg；意识模糊；心、肺和腹部无阳性体征。救治急危重症患者时应遵循下列哪项原则()

A.以患者安全为主要目标的无伤害原则

B.利益最大化原则

C.节约资源原则

D.公平无私原则

E.患者自主原则

52.患者，男性，28岁。在海中游泳时不慎溺水，被送到急诊室。体格检查：心率45次/分，血压90/60mmHg；神志不清，口流海水，呼吸微弱。如医生不在场，护士的下列处理中正确的是()

A.立即呼叫医生，等待医嘱

B.立即将患者头偏向一侧，吸出口腔异物，给予吸氧

C.立即心外按压

D.立即心电监护

E.先测生命体征

53.患者，男性，37岁。交通事故后被送往急诊室。体格检查：意识丧失，左下肢闭合性骨折，呼吸20次/分，心率62次/分，血压96/62mmHg。患者身上无任何证件。护士下列的处理中不正确的是()

A.协助医生处理骨折

B.处置的同时通知保卫部

C.等待家属办理手续后再处理

D.先处理后再等家属补办手续

E.处置同时通知医务部

54.当而对灾害急救，且资源严重短缺时，灾害现场分诊的最大作用是()

- A.让最大数量的人能够获得及时的救治，使更多的人存活
- B.给每个来诊患者进行详细的登记、挂号
- C.给予适时的安慰和健康教育，与急诊科其他人员有效沟通，迅速与患者建立起和谐的护患关系
- D.应用计算机对患者登记或挂号，对录入的信息进行整理、统计和分析
- E.给予外伤患者简单处置，如出血部位给予无菌纱布覆盖，压迫止血等

55.PQRST 公式中的 Q 指的是()

- A.疼痛的诱因
- B.疼痛的性质
- C.疼痛放射情况
- D.疼痛的程度
- E.疼痛持续的时间

56.问诊时同时测量生命体征，如果发现生命体征不稳定或不正常，应及时()

- A.呼叫医生来分诊处
- B.将患者送往 MICU
- C.将患者送往 CCU
- D.将患者送往抢救室
- E.给予心电监护

57.某工厂突发火灾，数十名伤员被转运到急诊科。此时分诊护士的首要任务是()

- A.迅速检伤，根据病情危重程度分类
- B.做好常规来诊患者的解释工作
- C.发现危重患者立即投入抢救中
- D.配合治疗区护士共同参与抢救
- E.准备与来诊家属沟通

58.患者女性，45岁。因足底被锈钉刺伤后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，诊断为破伤风。易导致患者死亡的常见原因是()

- A.休克
- B.窒息
- C.肺部感染
- D.肾衰竭
- E.脱水、酸中毒

59.患者，男，45岁，农民，因在高温闷热环境下进行劳作，近日出现全身乏力，体温高达40℃以上，同时出现谵妄、抽搐，皮肤无汗症状，入院后诊断为热射病。请问其首要的治疗措施为()

- A.降温
- B.吸氧
- C.抗休克
- D.治疗脑水肿

E.纠正水、电解质紊乱

60.急性有机磷中毒的患者，医嘱给予阿托品静脉注射，在给药后患者最可能出现()

A.口干

B.血压下降

C.心率减慢

D.出汗增多

E.呼吸加快

二、多选题（共计 20 题，每题 2 分，多选或少选均不得分）

61.院前急救时根据出血性质采用不同的止血措施，下列说法正确的有()

A.加压包扎止血法一般用于弥漫创口的出血

B.指压止血法是主要用于动脉出血的一种应急止血措施

C.头颈部出血采用指压止血法绝对禁止同时压迫双侧颈总动脉

D.止血带应扎在伤口的近心端，并尽量靠近伤口

E.止血带止血法适用于四肢较大动脉的出血

62.患者女性，67 岁，有 5 年冠心病病史，上午十时因家庭纠纷争吵出现胸闷、气促、上腹疼痛、意识突然不清，紧急呼叫 120 现场抢救，心电图显示室颤。立即给患者行自动体外除颤，下列操作正确的有()

A.打开电源

B.安放电极

C.分析心律

D.选择非同步除颤方式

E.电击除颤

63.地震中，急救员常用平抬或平抱搬运法搬运伤员，但此法适用于()

A.腹部内脏脱出的伤员

B.昏迷伤员

C.骨盆损伤的伤员

D.脊柱损伤者

E.大出血的伤员

64.绷带包扎的基本方法包括()

A.蛇形包扎法

B.圆形包扎法

C.螺旋反折包扎法

D.回返式包扎

E.8 字形包扎

65.急性病容表现包括以下()

A.面颊潮红

B.呼吸急促

C.鼻翼扇动

D.表情痛苦

E.面肌消瘦

66.脑复苏中施行低温疗法的作用应为()

A.降低脑组织耗氧量

B.减轻脑水肿，降低颅内压

C.终止脑组织缺氧性病变的发展

D.避免发热

E.制止寒战和抽搐

67.对脑震荡的处理，以下哪项是正确的()

A.吗啡镇痛

B.观察生命体征

C.做好心理治疗

D.对症治疗

E.休息 1~2 周

68.评估患者中毒情况包括有()

A.中毒地点

B.毒物性质

C.中毒时间

D.服毒量

E.中毒途径

69.心搏骤停的临床表现()

A.意识丧失

B.心音消失.脉搏摸不到.血压测不出

C.呼吸断续呈叹息样或短促痉挛性呼吸，随后呼吸停止

D.面色苍白或发绀

E.瞳孔散大固定

70.2020 年美国心脏协会心血管急救成人生产链包括的环节()

A.立即识别心搏骤停并启动急救反应系统

B.尽早进行心肺复苏，着重于胸外按压

C.快速除颤

D.有效的高级生命支持

E.综合的心搏骤停后治疗

71.分诊程序包括 ()

A.分诊问诊

B.测量生命征

C.分诊分流

D.分诊护理

E.分诊记录

72.灾难检伤分类的原则包括()

- A. 优先救治病情危重但有存活希望的伤病员
- B. 分类时不要在单个伤病员身上停留时间过长
- C. 分类时只做简单可稳定伤情但不过多消耗人力的急救处理
- D. 对没有存活希望的伤病员放弃治疗
- E. 有明显感染征象的伤病员要及时隔离

73. 当发现有人突然倒地，意识不清时，以下哪些措施是正确的()

- A. 立即检查呼吸和心跳
- B. 迅速拨打急救电话
- C. 尝试摇晃患者以唤醒
- D. 给患者喂食或喂水
- E. 进行心肺复苏（如果患者没有呼吸和心跳）

74. 在处理烧伤时，以下哪些做法是正确的()

- A. 立即用冷水冲洗伤口
- B. 涂抹牙膏或酱油
- C. 轻轻脱去衣物
- D. 用冰块直接冷敷
- E. 覆盖伤口，避免感染

75. 遇到异物导致窒息患者时，以下哪些急救措施是恰当的()

- A. 迅速拨打急救电话

B.使用海姆立克急救法

C.给予患者大量饮水

D.让患者平躺，保持呼吸道通畅

E.尝试用手指抠出异物（如果异物可见且易取）

76.在处理骨折时，以下哪些做法是正确的()

A.立即移动患者至安全地点（如果需要）

B.用夹板或绷带固定骨折部位

C.给予患者止痛药以减轻疼痛（在医生指导下）

D.尝试自行复位骨折

E.尽快就医并告知医生伤情

77.当遇到中暑患者时，以下哪些急救措施是有效的()

A.将患者移至阴凉通风处

B.给予患者冷饮以降温

C.用湿毛巾敷在患者额头上

D.让患者平躺，抬高双腿

E.迅速拨打急救电话并送医治疗（如果症状严重）

78.在处理烫伤时，以下哪些做法是正确的()

A.用冷水冲洗伤口以降低温度

B.涂抹香油或蜂蜜

C.轻轻用剪刀剪开伤口上的衣物

D.用酒精消毒伤口

E.尽快就医并涂抹专业烫伤药膏

79.遇到溺水患者时，以下哪些急救措施是必要的()

A.迅速将患者救出水面

B.清除患者口鼻内的异物

C.给予患者人工呼吸和胸外按压（如果需要）

D.让患者自行咳水（避免强行倒水）

E.尽快送医治疗

80.在处理触电事故时，以下哪些做法是正确的()

A.立即切断电源

B.用手直接拉触电者

C.使用绝缘物体将触电者与电源分离

D.对触电者进行心肺复苏（如果必要）

E.迅速拨打急救电话并等待专业救援